© Typotex Kiadó

ANALÍZIS FELADATGYŰJTEMÉNY I



www.interkonyv.hu

© Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

Jegyzetek és példatárak a matematika egyetemi oktatásához sorozat

Algoritmuselmélet
Algoritmusok bonyolultsága
Analitikus módszerek a pénzügyben és a közgazdaságtanban
Analízis feladatgyűjtemény I
Analízis feladatgyűjtemény II
Bevezetés az analízisbe
Complexity of Algorithms
Differential Geometry
Diszkrét matematikai feladatok
Diszkrét optimalizálás
Geometria
Igazságos elosztások
Introductory Course in Analysis
Mathematical Analysis – Exercises I
Mathematical Analysis – Problems and Exercises II
Mértékelmélet és dinamikus programozás
Numerikus funkcionálanalízis
Operációkutatás
Operációkutatási példatár
Parciális differenciálegyenletek
Példatár az analízishez
Pénzügyi matematika
Szimmetrikus struktúrák
Többváltozós adatelemzés
Variációszámítás és optimális irányítás

www.interkonyv.hu
© Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

ANALÍZIS FELADATGYŰJTEMÉNY I



Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar

Typotex

2014

www.interkonyv.hu

© Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

© 2014–2019, Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán,
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar

Szerkesztők: Kós Géza és Szentmiklóssy Zoltán

Lektorálta: Pach Péter Pál

Creative Commons NonCommercial-NoDerivs 3.0 (CC BY-NC-ND 3.0)
A szerző nevének feltüntetése mellett nem kereskedelmi céllal szabadon másolható, terjeszthető, megjelentethető és előadható, de nem módosítható.

ISBN 978 963 279 230 9
Készült a Typotex Kiadó (http://www.typotex.hu) gondozásában
Felelős vezető: Votisky Zsuzsa
Műszaki szerkesztő: Gerner József

Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0045 számú,
„Jegyzetek és példatárak a matematika egyetemi oktatásához” című projekt keretében.



KULCSSZAVAK: analízis, kalkulus, derivált, integrál, több-változó, komplex.

ÖSSZEFOGLALÁS: Ez a feladatgyűjtemény elsősorban azon egyetemi hallgatók számára készült, akik matematikát, ezen belül kalkulust és analízist tanulnak. A könyv fő feladata bevezetni az olvasót a a differenciál és integrálszámításba és ezek alkalmazásaiba.

© Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

Tartalomjegyzék

Alapfogalmak, valós számok **6**
1.1. Elemi feladatok . . . 7
1.2. Logikai alapfogalmak . . . 8
1.3. Bizonyítási módszerek . . . 13
1.4. Halmazok . . . 20
1.5. A valós számok axiómarendszere . . . 21
1.6. A számegyenes . . . 26

Számsorozatok konvergenciája **30**
2.1. Sorozatok határértéke . . . 31
2.2. A határérték tulajdonságai . . . 37
2.3. Monoton sorozatok . . . 41
2.4. A Bolzano-Weierstrass-tétel és a Cauchy-kritérium . . . 43
2.5. Sorozatok nagyságrendje . . . 44
2.6. Vegyes feladatok . . . 46

Valós függvények határértéke, folytonossága **47**
3.1. Függvények globális tulajdonságai . . . 49
3.2. A határérték . . . 62
3.3. Folytonos függvények . . . 70

A differenciálszámítás és alkalmazásai **75**
4.1. A derivált fogalma . . . 78
4.2. Deriválási szabályok . . . 80
4.3. Középértéktételek, L'Hospital szabály . . . 85
4.4. Szélsőértékkeresés . . . 87
4.5. Függvényvizsgálat . . . 89
4.6. Elemi függvények . . . 91

Az egyváltozós Riemann-integrál **97**
5.1. Határozatlan integrál . . . 101
5.2. Határozott integrál . . . 108
5.3. A határozott integrál alkalmazásai . . . 114
5.4. Improprius integrál . . . 117

Numerikus sorok **120**
6.1. Numerikus sorok konvergenciája . . . 121
6.2. Pozitív tagú sorok konvergenciakritériumai . . . 124
6.3. Feltételes és abszolút konvergencia . . . 129

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

Függvénysorozatok és sorok **131**
7.1. Pontonkénti és egyenletes konvergencia 134
7.2. Hatványsorok, Taylor-sor 137
7.3. Trigonometrikus sorok, Fourier-sor 142

Többváltozós függvények differenciálása **146**
8.1. Topológiai alapfogalmak 148
8.2. Többváltozós függvények grafikonja 151
8.3. Többváltozós határérték, folytonosság 155
8.4. Parciális és totális derivált 157
8.5. Többváltozós szélsőérték 163

Többváltozós Riemann-integrál **168**
9.1. Jordan-mérték 170
9.2. Többváltozós Riemann-integrál 173

Vonalintegrál és primitív függvény **181**
10.1. Sík és térgörbék 183
10.2. Skalár-, és vektormezők, differenciáloperátorok 186
10.3. Vonalintegrál 187

Komplex függvények **195**

Megoldások **203**

Ajánlott irodalom **337**

www.interkonyv.hu

© Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

1. fejezet
Alapfogalmak, valós számok

> Biztatásul közlöm, hogy tévesnek bizonyult a cáfolata annak a híresztelésnek, mely szerint mégsem hazugság azt tagadni, hogy lesz olyan vizsgázó, akinek egy analízis tétel bizonyítását sem kell tudnia ahhoz, hogy ne bukjon meg.
>
> (Baranyai Zsolt)

1.1. Az $A \subset \mathbb{R}$ halmazt **korlátosnak** nevezzük, ha van olyan $K \in \mathbb{R}$ valós szám, hogy minden $a \in A$ esetén $|a| \leq K$.
Az $A \subset \mathbb{R}$ halmaz **felülről korlátos**, ha van olyan $M \in \mathbb{R}$ valós szám (**felső korlát**), amelyre minden $a \in A$ esetén $a \leq M$.
Az $A \subset \mathbb{R}$ halmaz **alulról korlátos**, ha van olyan $m \in \mathbb{R}$ valós szám (**alsó korlát**), amelyre minden $a \in A$ esetén $a \geq m$.

1.2. Cantor-axióma: Egymásba skatulyázott korlátos zárt intervallumsorozat metszete nem üres.

1.3. Felső határ, szuprémum: Ha az A halmaznak van legkisebb felső korlátja és ez a szám M, akkor ezt az M számot a halmaz **felső határának** vagy **szuprémumának** nevezzük és $M = \sup A$-val jelöljük.

1.4. Teljességi tétel: Ha $A \subset \mathbb{R}$ felülről korlátos nem üres halmaz, akkor van legkisebb felső korlátja.

1.5. Bernoulli-egyenlőtlenség: Ha $n \in \mathbb{N}$ és $x > -1$, akkor

$$(1+x)^n \geq 1 + n \cdot x.$$

Egyenlőség akkor és csak akkor van, ha $n = 0$ vagy $n = 1$ vagy $x = 0$.

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

1.1. Elemi feladatok

Ábrázoljuk a számegyenesen a következő egyenlőtlenségek megoldáshalmazát!

1.1. $|x-5|<3$

1.2. $|5-x|<3$

1.3. $|x-5|<1$

1.4. $|5-x|<0.1$

Oldjuk meg az alábbi egyenlőtlenségeket!

1.5. $\dfrac{1}{5x+6}\geq -1$

1.6. $6x^2+7x-20>0$

1.7. $10x^2+17x+3\leq 0$

1.8. $-6x^2+8x-2>0$

1.9. $8x^2-30x+25\geq 0$

1.10. $-4x^2+4x-2\geq 0$

1.11. $9x^2-24x+17\geq 0$

1.12. $-16x^2+24x-11<0$

1.13. Hol a hiba?

$$\log_2\frac{1}{2}\leq\log_2\frac{1}{2}\quad\text{és}\quad 2<4$$

Összeszorozva a két egyenlőtlenséget:

$$2\log_2\frac{1}{2}<4\log_2\frac{1}{2}$$

A logaritmus azonosságait használva:

$$\log_2\left(\frac{1}{2}\right)^2<\log_2\left(\frac{1}{2}\right)^4$$

A $\log_2 x$ függvény szigorúan monoton nő, tehát:

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

$$\frac{1}{4} < \frac{1}{16}$$

Átszorozva az egyenlőtlenséget:

$16 < 4$.

Oldjuk meg a következő egyenleteket és egyenlőtlenségeket!

1.14. $|x+1| + |x-2| \leq 12$

1.15. $\sqrt{x+3} + \sqrt{x-5} = 0$

1.16. $\left|\frac{x+1}{2x+1}\right| > \frac{1}{2}$

1.17. $|2x-1| < |x-1|$

1.18. $\sqrt{x+3} + |x-2| = 0$

1.19. $\sqrt{x+3} + |x-2| \leq 0$

1.2. Logikai alapfogalmak

1.20. Minél egyszerűbben mondjuk ki az alábbi állítások tagadását:

(a) Minden egér szereti a sajtot.

(b) Aki másnak vermet ás, maga esik bele.

(c) Minden asszony életében van egy pillanat
Mikor olyat akar tenni, amit nem szabad.

(d) Van olyan a, hogy minden b-hez egyetlen x tartozik, melyre $a + x = b$

(e) 3 nem nagyobb, mint 2, vagy 5 osztója 10-nek.

(f) Nem zörög a haraszt, ha a szél nem fújja.

(g) Ha a nagynénémnek kerekei volnának, ő lenne a miskolci gyorsvonat.

1.21. Egy udvarban van 5 kecske és 20 bolha. Tudjuk, hogy van olyan kecske, amit minden bolha megcsípett. Következik-e ebből, hogy van olyan bolha, amelyik minden kecskét megcsípett?

1.22. Fogadjuk el igaznak a következő állításokat:

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

(a) Ha egy állat emlős, akkor vagy van farka, vagy van kopoltyúja.

(b) Egyik állatnak sincs farka.

(c) Minden állat vagy emlős, vagy van farka, vagy van kopoltyúja.

Következik-e ebből, hogy minden állatnak van kopoltyúja?

1.23. Balkezes Bendegúz, aki valóban balkezes, a bal kezével csak igaz állításokat tud leírni, a jobb kezével pedig csak csak hamis állításokat. Melyik kezével írhatja le a következő mondatokat?

(a) Balkezes vagyok.

(b) Jobbkezes vagyok.

(c) Balkezes vagyok és Bendegúz a nevem.

(d) Jobbkezes vagyok és Bendegúz a nevem.

(e) Balkezes vagyok vagy Bendegúz a nevem.

(f) Jobbkezes vagyok vagy Bendegúz a nevem.

(g) A 0 se nem páros, se nem páratlan.

1.24. Azt mondják, a fekete macska szerencsétlenséget hoz. Melyik mondattal tagadhatjuk ezt?

(a) A fekete macska szerencsét hoz.

(b) Nem a fekete macska hoz szerencsétlenséget.

(c) A fehér macska hoz szerencsétlenséget.

(d) A fekete macska nem hoz szerencsétlenséget.

1.25. Legyen A a pozitív egészek halmaza. Jelentse $a|b$ azt az állítást, hogy a osztója b-nek. Döntsük el, hogy mely állítások igazak az alábbiak közül:

(a) $\forall a \in A\ \exists b \in A\ a|b$ **(b)** $\forall a \in A\ \forall b \in A\ a|b$

(c) $\exists a \in A\ \forall b \in A\ a|b$ **(d)** $\exists a \in A\ \exists b \in A\ a|b$

1.26. Matematika országban a bíró csak a bizonyítékoknak hisz. Például, ha F azt állítja, hogy van fekete oroszlán, akkor állításának helyességéről meggyőzheti a bírót azzal, ha mutat neki egy fekete oroszlánt.

(a) F azt állítja, hogy minden oroszlán fekete. Elég bizonyíték-e, ha mutat a bírónak egy fekete oroszlánt?

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

(b) F azt állítja, hogy minden oroszlán fekete, G pedig azt állítja, hogy F téved. Hogyan bizonyíthatná G az állítását?

(c) F azt állítja, hogy minden 2-re végződő négyzetszám osztható 3-mal. G szerint F téved. Hogyan bizonyíthatná G az állítását? F-nek vagy G-nek van igaza?

(d) F azt állítja, hogy ha egy derékszögű háromszög befogói a és b, átfogója c, akkor $a^2 + b^2 = c^2$. Hogyan bizonyíthatná F az állítását?

(e) F azt állítja, hogy egy másodfokú egyenletnek lehetnek negatív gyökei. Hogyan bizonyíthatná F az állítását?

(f) F azt állítja, hogy egy másodfokú egyenletnek lehet 3 gyöke. G szerint F téved. Hogyan bizonyíthatná G az állítását?

1.27. :-) „Minden mohikán hazudik”, mondta az utolsó mohikán. Igazat mondott?

1.28. :-)

1) A 3 prímszám.
2) 4 osztható 3-mal.
3) Ebben a keretben pontosan 1 igaz állítás van.

Hány igaz állítás van a keretben?

1.29. Egy 13 jegyű kódszámban bármely 3 szomszédos számjegy összege 11. A kód második jegye 6, a tizenkettedik jegy pedig 4. Mi a 13-adik jegy?

1.30. Fogadjuk el igaznak, hogy ki korán kel, aranyat lel. Melyik állítás igazsága következik ebből?

(a) Aki későn kel, nem lel aranyat.

(b) Aki aranyat lelt, az korán kelt.

(c) Aki nem lelt aranyat, az későn kelt.

1.31. Ha kedd van, akkor Belgiumban vagyunk. Melyik állítás következik ebből?

(a) Ha szerda van, akkor nem Belgiumban vagyunk.

(b) Ha Belgiumban vagyunk, akkor kedd van.

(c) Ha nem Belgiumban vagyunk, akkor nincs kedd.

Mi a logikai kapcsolat az állítások között? (Melyikből következik a másik?)

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

1.32. **A**: $x > 5$ **B**: $x^2 > 25$

1.33. **A**: $\sqrt{x^2-5} < 3$ **B**: $x^2 - 5 < 9$

1.34. **A**: $\sqrt{x^2-5} > -4$ **B**: $x^2 - 5 > 16$

1.35. **A**: $x^2 - x - 6 = 0$ **B**: $x = 2$

1.36. **A**: $x^2 - x - 6 > 0$ **B**: $x > 2$

1.37. **A**: $7 = 8$ **B**: $3 = 3$

1.38. **A**: $7 = 8$ **B**: $3 = 4$

1.39. **A**: $x < 7$ és $y < 3$ **B**: $x - y < 4$

1.40. **A**: $|x-5| < 0,1$ és $|y-5| < 0,1$ **B**: $|x-y| < 0,2$

Tagadjuk a következő állításokat! Döntsük el, hogy igaz-e az állítás! Igaz-e a tagadása?

1.41. $\forall n \in \mathbb{N}^+ \; 2|n$

1.42. $\exists k \in \mathbb{N}^+ \; 2|k$

1.43. $\forall n \in \mathbb{N}^+ \; \exists k \in \mathbb{N}^+ \; n|k$

1.44. $\exists k \in \mathbb{N}^+ \; \forall n \in \mathbb{N}^+ \; n|k$

1.45. Pistike azt mondta reggel az anyukájának, hogy ha a hó miatt nem jár a busz, nem megy iskolába. A busz járt, Pistike mégsem ment iskolába. Hazudott-e reggel Pistike, amikor a már említett mondatot mondta?

Hány olyan részhalmaza van a $H = \{1, 2, 3, \ldots, 100\}$ halmaznak, amelyre igaz, és hány olyan, amelyre nem igaz, hogy

1.46. az 1 benne van a részhalmazban;

1.47. az 1 és a 2 benne van a részhalmazban;

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

1.48. az 1 vagy a 2 benne van a részhalmazban;

1.49. az 1 benne van a részhalmazban vagy a 2 nincs benne a részhalmazban;

1.50. ha az 1 benne van a részhalmazban, akkor a 2 benne van a részhalmazban?

Hány olyan H részhalmaza van az $A_n = \{1, 2, \ldots, n\}$ halmaznak, amelyre teljesül, hogy

1.51. $\forall x < n \; (x \in H \implies x + 1$

1.52. $\forall x \; (x \in H \implies x + 1 \notin H)$

1.53. $\forall x \; (x \in H \wedge x + 1 \in H \implies x + 2 \in H)$

Írjuk le logikai jelekkel az alábbi állításokat!

1.54. Nem igaz, hogy P vagy Q.

1.55. Sem Q, sem P.

1.56. Nem P, ha nem Q.

1.57. P pedig nem is Q.

1.58. Csak akkor P, ha Q.

1.59. Sem P, sem Q.

1.60. Q, feltéve, hogy P.

1.61. Nem P, mégis Q.

1.62. P vagy Q, de nem mindkettő.

1.63. Nem igaz, hogy ha P, akkor egyúttal Q is.

1.64. Írjuk fel logikai kvantorokkal a következő mondatot:

„Minden tengerész ismer olyan kikötőt, ahol van olyan kocsma, ahol még nem járt.”

Írjuk fel a mondat tagadását szöveggel és logikai kvantorokkal is!

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

1.65. Van egy zacskó cukorka és a tanulócsoport hallgatói. Melyik állításból következik a másik?

(a) A csoport minden hallgatója szopogatott cukorkát (a zacskóból).

(b) Van olyan cukorka (a zacskóból), amit minden hallgató szopogatott.

(c) Van olyan hallgató, aki minden cukorkát szopogatott (a zacskóból).

(d) Minden cukorkát (a zacskóból) szopogatta valamelyik hallgató.

1.3. Bizonyítási módszerek

Bizonyítsuk be, hogy

1.66. $\sqrt{3}$ irracionális;

1.67. $\dfrac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$ irracionális;

1.68. $\dfrac{\dfrac{\sqrt{2}+1}{2}+3}{4}+5$ irracionális!

1.69. Tudjuk, hogy x és y racionális számok. Bizonyítsuk be, hogy

(a) $x+y$ **(b)** $x-y$

(c) xy **(d)** $y \neq 0$ esetén $\dfrac{x}{y}$

is racionális!

1.70. Tudjuk, hogy x racionális szám, y pedig irracionális.

(a) Lehet-e $x+y$ racionális? **(b)** Lehet-e $x-y$ racionális?

(c) Lehet-e xy racionális? **(d)** Lehet-e $\dfrac{x}{y}$ racionális?

1.71. Tudjuk, hogy x és y irracionális.

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

(a) Lehet-e $x + y$ racionális? **(b)** Lehet-e xy racionális?

1.72. Igaz-e, hogy ha

(a) a és b racionális számok, akkor $a + b$ is racionális?

(b) a és b irracionális számok, akkor $a + b$ is irracionális?

(c) a racionális szám, b pedig irracionális, akkor $a + b$ racionális?

(d) a racionális szám, b pedig irracionális, akkor $a + b$ irracionális?

1.73. Ádámnak 2 füle volt. Ha egy apának 2 füle van, akkor a fiának is 2 füle van.

(a) Következik-e a fenti két állításból, hogy minden ma élő embernek 2 füle van?

(b) Kikről tudjuk biztosan állítani a fenti két állítás alapján, hogy 2 fülük van?

(c) Mire következtethetünk, ha a két állításból az elsőt elhagyjuk, és csak a másodikat használjuk fel?

(d) Mire következtethetünk, ha a két állításból a másodikat elhagyjuk, és csak az elsőt használjuk fel?

1.74. **Tétel:** Az 1 a legnagyobb szám.

Bizonyítás: indirekt módszerrel. Tegyük fel, hogy nem 1 a legnagyobb szám, hanem A. Ekkor $A > 1$. Mivel $A > 1$, ezért $A > 0$ is teljesül, tehát ha az $A > 1$ egyenlőtlenséget megszorozzuk A-val, az $A^2 > A$ egyenlőtlenséget kapjuk. Ez az egyenlőtlenség viszont ellentmond annak, hogy A a legnagyobb szám. Tehát az 1 a legnagyobb szám.

Jó ez a bizonyítás? Ha nem, akkor hol a hiba?

1.75. Legyen $A_1, A_2, \ldots$ állítások egy sorozata. Mi következik az alábbiakból?

(a) A_1 igaz. Ha $A_1, A_2, \ldots, A_n$ mind igaz, akkor A_{n+1} is igaz.

(b) A_1 igaz. Ha A_n és A_{n+1} igaz, akkor A_{n+2} is igaz.

(c) Ha A_n igaz, akkor A_{n+1} is igaz. A_{2^n} hamis minden n-re.

(d) A_{100} igaz. Ha A_n igaz, akkor A_{n+1} is igaz.

(e) A_{100} igaz. Ha A_n hamis, akkor A_{n+1} is hamis.

(f) A_1 hamis. Ha A_n igaz, akkor A_{n+1} is igaz.

(g) A_1 igaz. Ha A_n hamis, akkor A_{n-1} is hamis.

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

1.76. Bizonyítsuk be, hogy tetszőleges $n \in \mathbb{N}$ esetén $16|5^{n+1} - 4n - 5$.

1.77. Bizonyítsuk be, hogy $\operatorname{tg} 1^\circ$ irracionális.

1.78. Bizonyítsuk be, hogy ha $n \in \mathbb{N}^+$, akkor $n! \leq \left(\frac{n+1}{2}\right)^n$.

1.79. Legyen $a_1 = 0,9$, $a_{n+1} = a_n - a_n^2$. Igaz-e, hogy van olyan n, amelyre $a_n < 10^{-6}$?

1.80. Írjuk fel a következő kifejezéseket $n = 1, 2, 3, 6, 7, k$ és $k+1$ esetén

(a) $\sqrt{n}$

(b) $\sqrt{1} + \sqrt{2} + \sqrt{3} + \cdots + \sqrt{n}$

(c) $1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + n^2$

(d) $\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \cdots + \frac{1}{(n-1) \cdot n}$

(e) $1 \cdot 4 + 2 \cdot 7 + 3 \cdot 10 + \cdots + n(3n+1)$

(f) $1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 4 + \cdots + n(n+1)$

1.81. Az első néhány tag kiszámítása után sejtsük meg, milyen egyszerűbb kifejezéssel egyenlő az alábbi összeg, majd a sejtést bizonyítsuk be teljes indukcióval!

(a) $\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \cdots + \frac{1}{(n-1) \cdot n}$

(b) $1 + 3 + \ldots + (2n-1)$

Bizonyítsuk be, hogy minden *n* pozitív egész számra igazak a következő azonosságok:

1.82. $a^n - b^n = (a-b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + \cdots + ab^{n-2} + b^{n-1})$

1.83. $1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$

1.84. $1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

1.85. $1^3 + 2^3 + \cdots + n^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$

1.86. $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \cdots - \frac{1}{2n} = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n}$

Fejezzük ki egyszerűbb alakban a következő kifejezéseket:

1.87. $\frac{1}{1\cdot 2} + \frac{1}{2\cdot 3} + \cdots + \frac{1}{(n-1)\cdot n}$

1.88. $\frac{1}{1\cdot 2\cdot 3} + \frac{1}{2\cdot 3\cdot 4} + \cdots + \frac{1}{n\cdot(n+1)\cdot(n+2)}$

1.89. $1\cdot 2 + 2\cdot 3 + \cdots + n\cdot(n+1)$

1.90. $1\cdot 2\cdot 3 + 2\cdot 3\cdot 4 + \cdots + n\cdot(n+1)\cdot(n+2)$

1.91. Egy gazdának van egy pár nyula. Minden nyúlpár 2 hónapos korától minden hónapban egy újabb párnak ad életet. Hány pár nyúl lesz a 2., 3., 4., 5. és 6. hónapban?

Legyen (u_n) a Fibonacci-sorozat, azaz $u_0 = 0$, $u_1 = 1$ és $n > 1$ esetén $u_{n+1} = u_n + u_{n-1}$.

1.92. Bizonyítsuk be, hogy u_n és u_{n+1} relatív prím számok.

1.93. Bizonyítsuk be, hogy $\frac{1,6^n}{3} < u_n < 1,7^n \quad (n > 0)$.

1.94. Bizonyítsuk be a következő azonosságokat:

(a) $u_1 + u_2 + \cdots + u_n = u_{n+2} - 1$ **(b)** $u_n^2 - u_{n-1}u_{n+1} = (-1)^{n+1}$

(c) $u_1^2 + u_2^2 + \cdots + u_n^2 = u_n u_{n+1}$

1.95. Hozzuk egyszerűbb alakra a következő kifejezéseket:

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

(a) $s_n = u_0 + u_2 + \cdots + u_{2n}$ **(b)** $s_n = u_1 + u_3 + \cdots + u_{2n+1}$

(c) $s_n = u_0 + u_3 + \cdots + u_{3n}$ **(d)** $s_n = u_1u_2 + u_2u_3 + \cdots + u_{2n-1}u_{2n}$

1.96. **Tétel:** Minden ló egyszínű.

Bizonyítás: Teljes indukcióval belátjuk, hogy bármely n ló egyszínű. $n = 1$-re az állítás nyilvánvaló. Tegyük fel, hogy igaz n-re, és ebből fogjuk $n+1$-re belátni: adott $n+1$ ló közül az indukciós feltevés miatt az $1., 2., \ldots, n.$ is egyszínű és a $2., \ldots, n., (n+1).$ is egyszínű, tehát mind az $n+1$ egyszínű.

Jó ez a bizonyítás? Ha nem, akkor hol a hiba?

1.97. **Tétel:** Nincs józan tengerész.

Bizonyítás: Teljes indukcióval. Tegyük fel, hogy az állítás igaz n tengerészre, és ebből fogjuk $n+1$ tengerészre belátni. Adott $n+1$ tengerész közül az indukciós feltevés miatt az $1., 2., \ldots, n.$ tengerész nem józan, és a $2., \ldots, n., (n+1).$ tengerész sem józan, tehát mind az $n+1$ részeg.

Jó ez a bizonyítás? Ha nem, akkor hol a hiba?

1.98. Bizonyítsuk be a számtani-mértani közép közötti egyenlőtlenséget az $n = 2$ speciális esetben!

1.99. Bizonyítsuk be, hogy az $a_1, a_2, \ldots a_n$ pozitív számok számtani, mértani és harmonikus közepe a számok legkisebbike és legnagyobbika közé esik!

Tudjuk, hogy $a, b, c > 0$ és $a+b+c = 18$. Határozzuk meg a, b és c értékét úgy, hogy a következő kifejezések értéke maximális legyen:

1.100. abc

1.101. a^2bc

1.102. a^3b^2c

1.103. $\dfrac{abc}{ab+bc+ac}$

Tudjuk, hogy $a, b, c > 0$ és $abc = 18$. Határozzuk meg a, b és c értékét úgy, hogy a következő kifejezések értéke minimális legyen:

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

1.104. $a+b+c$

1.105. $2a+b+c$

1.106. $3a+2b+c$

1.107. $a^2+b^2+c^2$

1.108. Tudjuk, hogy három pozitív szám szorzata 1.

(a) Legalább mennyi lehet az összegük?

(b) Legfeljebb mennyi lehet az összegük?

(c) Legalább mennyi lehet a reciprokösszegük?

(d) Legfeljebb mennyi lehet a reciprokösszegük?

1.109. Bizonyítsuk be, hogy ha $a>0$, akkor $a+\dfrac{1}{a}\geq 2$.

1.110. Bizonyítsuk be, hogy ha a, b és c pozitív számok, akkor $\dfrac{a}{b}+\dfrac{b}{c}+\dfrac{c}{a}\geq 3$.

1.111. Bizonyítsuk be, hogy minden pozitív egész n-re $\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^{2n}\geq 4$.

1.112. Egy motorcsónak motorja a csónakot állóvízben v sebességgel hajtja. A csónak az u sebességű folyóban s utat tesz meg a folyás irányában, majd visszamegy a kiindulási helyéhez. Mennyi lesz az átlagsebessége a teljes úton v-hez képest: v-vel egyenlő, v-nél nagyobb vagy v-nél kisebb?

1.113. Egy kereskedőnek nem pontos a kétkarú mérlege, mert a karok hossza nem egyenlő. Miután tudja ezt, minden vásárlónál az áru egyik felét a mérleg egyik serpenyőjében, a másik felét a mérleg másik serpenyőjében méri, gondolván, hogy ezzel kiküszöböli a mérleg pontatlanságát. Valóban ez a helyzet?

1.114. Határozzuk meg az $f(x)=x(1-x)$ függvény legnagyobb értékét a $[0,1]$ zárt intervallumon!

Hol van és mennyi a minimuma az alábbi függvényeknek, ha $x>0$?

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

1.115. $f(x) = x + \dfrac{4}{x}$ **1.116.** $g(x) = \dfrac{x^2 - 3x + 5}{x}$

1.117. Határozzuk meg az $x^2(1-x)$ függvény legnagyobb értékét a $[0,1]$ zárt intervallumon.

1.118. Mennyi a maximuma a $g(x) = x(1-x)^3$ függvénynek a $[0,1]$ intervallumon?

1.119. Mennyi a minimuma az $f(x) = 2x^2 + \dfrac{3}{x^2+1} + 5$ függvénynek?

1.120. Az $y = \dfrac{1}{4}x^2$ parabola melyik pontja van a legközelebb a $(0,5)$ ponthoz?

1.121. Melyik az egységkörbe írható maximális területű téglalap?

1.122. Melyik az egyenes körkúpba írható maximális térfogatú henger?

1.123. Melyik az egységgömbbe írható maximális térfogatú egyenes körhenger?

1.124. Legyen egy téglalap két éle a és b, átlója pedig c. Ekkor a téglalap területe $T = ab$, és a téglalap kerülete $K = 2(a+b)$.

Tehát: $$\frac{T}{\frac{K}{2}} = \frac{ab}{\frac{2(a+b)}{2}}$$

Így: $$\frac{2T}{K} - \frac{c}{\sqrt{2}} = \frac{ab}{a+b} - \frac{c}{\sqrt{2}}$$

Mivel $0 < a < c$, ezért: $$a\left(\frac{2T}{K} - \frac{c}{\sqrt{2}}\right) < c\left(\frac{ab}{a+b} - \frac{c}{\sqrt{2}}\right)$$

Beszorzás után: $$\frac{2Ta}{K} - \frac{ac}{\sqrt{2}} < \frac{abc}{a+b} - \frac{c^2}{\sqrt{2}}$$

T és K helyébe írjunk ab-t és $2(a+b)$-t: $$\frac{2a^2b}{2(a+b)} - \frac{ac}{\sqrt{2}} < \frac{abc}{a+b} - \frac{c^2}{\sqrt{2}}$$

Rendezés után: $$\frac{2a^2b}{2(a+b)} - \frac{abc}{a+b} < \frac{ac}{\sqrt{2}} - \frac{c^2}{\sqrt{2}}$$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

Kiemelés után: $\dfrac{ab}{a+b}(a-c) < \dfrac{c}{\sqrt{2}}(a-c)$

Osztunk $(a-c)$-vel, de $a-c<0$: $\dfrac{ab}{a+b} > \dfrac{c}{\sqrt{2}}$

Négyzet esetén $b=a$ és $c=a\sqrt{2}$: $\dfrac{a^2}{2a} > \dfrac{a\sqrt{2}}{\sqrt{2}}$

Egyszerűsítés és rendezés után: $1>2$

Hol a hiba?

1.4. Halmazok

1.125. Melyik állítás **nem** igaz?

(a) $A \setminus B = \{x : x \in A \vee x \notin B\}$ **(b)** $A \setminus B = A \cap \overline{B}$

(c) $A \setminus B = (A \cup B) \setminus B$ **(d)** $A \setminus B = A \setminus (A \cap B)$

1.126. Melyik halmazzal egyenlő $\overline{A \cup B}$?

(a) $\{x : x \notin A \vee x \notin B\}$ **(b)** $\{x : x \notin A \wedge x \notin B\}$

(c) $\{x : x \in A \vee x \in B\}$ **(d)** $\{x : x \in A \wedge x \in B\}$

1.127. Melyik halmazzal egyenlő $A \cap (B \cup C)$?

(a) $A \cup (B \cap C)$ **(b)** $(A \cap B) \cup C$

(c) $(A \cup B) \cap C$ **(d)** $(A \cap B) \cup (A \cap C)$

Állapítsuk meg, hogy az alábbi állítások közül melyek igazak és melyek hamisak. Ha egy állítás igaz, bizonyítsuk be, ha hamis, adjunk ellenpéldát!

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

1.128. $A \setminus B = A \cap \overline{B}$

1.129. $(A \cup B) \setminus B = A$

1.130. $(A \setminus B) \cup (A \cap B) = A$

1.131. $\overline{A} \setminus B = A \setminus \overline{B}$?

1.132. $(A \cup B) \setminus A = B$

1.133. $(A \cup B) \setminus C = A \cup (B \setminus C)$

1.134. $(A \setminus B) \cap C = (A \cap C) \setminus B$

1.135. $A \setminus B = A \setminus (A \cap B)$

Legyenek A, B, C halmazok. Írjuk fel A, B, C és a halmazműveletek segítségével, azaz olyan jellegű formulával, mint például $(A \setminus B) \cup C$, az alábbi halmazokat!

1.136. Azon elemek halmaza, amelyek A-ban benne vannak, de B-ben és C-ben nincsenek benne.

1.137. Azon elemek halmaza, amelyek A, B és C közül pontosan egyben vannak benne.

1.138. Azon elemek halmaza, amelyek A, B és C közül pontosan kettőben vannak benne.

1.139. Azon elemek halmaza, amelyek A, B és C közül pontosan háromban vannak benne.

1.140. Bizonyítsuk be, hogy tetszőleges A, B halmazokra $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$.

1.141. Bizonyítsuk be a De Morgan azonosságokat:

$$\overline{\bigcup_{i=1}^{n} A_i} = \bigcap_{i=1}^{n} \overline{A_i} \qquad \text{és} \qquad \overline{\bigcap_{i=1}^{n} A_i} = \bigcup_{i=1}^{n} \overline{A_i}$$

1.5. A valós számok axiómarendszere

1.142. Bizonyítsuk be, hogy tetszőleges a, b valós számokra

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

(a) $|a| + |b| \geq |a + b|$ **(b)** $|a| - |b| \leq |a - b| \leq |a| + |b|$

1.143. Bizonyítsuk be, hogy tetszőleges $a_1, a_2, \ldots, a_n$ valós számokra igaz, hogy

$$|a_1| + |a_2| + \cdots + |a_n| \geq |a_1 + a_2 + \cdots + a_n| .$$

1.144. Igaz-e, hogy ha

(a) $x < A$, akkor $|x| < |A|$ **(b)** $|x| < A$, akkor $|x^2| < A^2$

1.145. Igaz-e minden $a_1, a_2, \ldots a_n$ valós számra, hogy

(a) $|a_1 + a_2 + \cdots + a_n| \leq |a_1| + |a_2| + \cdots + |a_n|$
(b) $|a_1 + a_2 + \cdots + a_n| \geq |a_1| + |a_2| + \cdots + |a_n|$
(c) $|a_1 + a_2 + \cdots + a_n| < |a_1| + |a_2| + \cdots + |a_n|$
(d) $|a_1 + a_2 + \cdots + a_n| > |a_1| + |a_2| + \cdots + |a_n|$

1.146. Igaz-e minden a, b valós számra, hogy

(a) $|a + b| \geq |a| - |b|$ **(b)** $|a + b| \leq |a| - |b|$

(c) $|a - b| < ||a| - |b||$ **(d)** $|a - b| \leq |a| - |b|$

1.147. Legyen H a valós számok egy nem üres részhalmaza. Mit jelentenek a következő állítások?

(a) $\forall x \in H\ \exists y \in H\ (y < x)$ **(b)** $\forall y \in H\ \exists x \in H\ (y < x)$

(c) $\exists x \in H\ \forall y \in H\ (y \leq x)$ **(d)** $\exists y \in H\ \forall x \in H\ (y \leq x)$

1.148. Legyen $H_1 = \{h \in \mathbb{R} : -3 < h \leq 1\}$ és $H_2 = \{h \in \mathbb{R} : -3 \leq h < 1\}$. Melyik állítás igaz, ha $H = H_1$ vagy $H = H_2$?

(a) $\forall x \in H\ \exists y \in H\ (y < x)$ **(b)** $\forall y \in H\ \exists x \in H\ (y < x)$

(c) $\exists x \in H\ \forall y \in H\ (y \leq x)$ **(d)** $\exists y \in H\ \forall x \in H\ (y \leq x)$

1.149. Legyen $A = \{a \in \mathbb{R} : -3 < a \leq 1\}$ és $B = \{b \in \mathbb{R} : -3 < b < 1\}$. Melyik állítás igaz?

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

(a) $\forall a \in A\ \exists b \in B\ b < a$ **(b)** $\exists b \in B\ \forall a \in A\ b < a$

(c) $\forall b \in B\ \exists a \in A\ b < a$ **(d)** $\exists a \in A\ \forall b \in B\ b < a$

Legyen $H \subset \mathbb{R}$. Írjuk fel az alábbi állításokat logikai formulákkal, írjuk föl a tagadásukat, továbbá adjunk példát (ha van) olyan H-ra amelyikre teljesül, és olyanra is amelyikre nem!

1.150. H-nak van legkisebb eleme.

1.151. H bármely két (különböző) eleme között van (mindkettőtől különböző) H-beli elem.

Határozzuk meg a következő számhalmaz-sorozatok metszetét!

1.152. $A_n = \{a \in \mathbb{Q} : -\frac{1}{n} < a < \frac{1}{n}\}$

1.153. $B_n = \{b \in \mathbb{R}\backslash\mathbb{Q} : -\frac{1}{n} < b < \frac{1}{n}\}$

1.154. $C_n = \{c \in \mathbb{Q} : \sqrt{2} - \frac{1}{n} < c < \sqrt{2} + \frac{1}{n}\}$

1.155. $D_n = \{d \in \mathbb{N} : -n < d < n\}$

1.156. $E_n = \{e \in \mathbb{R} : -n < e < n\}$

1.157. Legyen $H \subset \mathbb{R}$. Írjuk fel a következő állítás tagadását:

$$\forall x \in H\ \exists y \in H\ (x > 2 \Longrightarrow y < x^2)$$

Határozzuk meg a következő intervallumsorozatok metszetét! (Például rajz segítségével sejtsük meg a metszetet! Ha a sejtés szerint a metszet M, akkor bizonyítsuk be, hogy $\forall x \in M$ esetén teljesül, hogy $\forall n\ x \in I_n$, továbbá ha $y \notin M$ akkor $\exists k\ y \notin I_k$. (Itt k és n pozitív egész számok.)

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

1.158. $I_n = [-1/n, 1/n]$

1.159. $I_n = (-1/n, 1/n)$

1.160. $I_n = [2 - 1/n, 3 + 1/n]$

1.161. $I_n = (2 - 1/n, 3 + 1/n)$

1.162. $I_n = [0, 1/n]$

1.163. $I_n = (0, 1/n)$

1.164. $I_n = [0, 1/n)$

1.165. $I_n = (0, 1/n]$

1.166. Melyik állítás igaz? (A választ mindig indokoljuk!)

(a) Ha egy egymásba skatulyázott intervallumsorozat metszete nem üres, akkor az intervallumok zártak.

(b) Ha egy egymásba skatulyázott intervallumsorozat metszete üres, akkor az intervallumok nyíltak.

(c) Egy egymásba skatulyázott, zárt intervallumsorozat metszete egyetlen pont.

(d) Ha egy egymásba skatulyázott intervallumsorozat metszete üres, akkor van az intervallumok között nyílt.

(e) Ha egy egymásba skatulyázott intervallumsorozat metszete üres, akkor van az intervallumok között nem zárt.

(f) Ha egy zárt intervallumsorozat metszete nem üres, akkor az intervallumok egymásba vannak skatulyázva.

A következő feladatokban is indokoljuk meg a válaszokat!

1.167. Lehet-e egy egymásba skatulyázott intervallumsorozat metszete üres?

1.168. Lehet-e egy egymásba skatulyázott, zárt intervallumsorozat metszete üres?

1.169. Lehet-e egy egymásba skatulyázott, zárt intervallumsorozat metszete egyetlen pont?

1.170. Lehet-e egy egymásba skatulyázott, nyílt intervallumsorozat metszete nem üres?

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

1.171. Lehet-e egy egymásba skatulyázott, nyílt intervallumsorozat metszete üres?

1.172. Lehet-e egy egymásba skatulyázott, zárt intervallumsorozat metszete valódi intervallum (nem csak egy pont)?

1.173. Lehet-e egy egymásba skatulyázott, nyílt intervallumsorozat metszete valódi intervallum?

1.174. Lehet-e egy egymásba skatulyázott, zárt intervallumsorozat metszete valódi nyílt intervallum?

1.175. Lehet-e egy egymásba skatulyázott, nyílt intervallumsorozat metszete valódi nyílt intervallum?

1.176. A valós számok axiómái közül melyek teljesülnek és melyek nem a racionális számok halmazára (a szokásos műveletekkel és rendezéssel)?

1.177. Bizonyítsuk be az Archimédeszi axiómából, hogy $(\forall b, c < 0)\ (\exists n \in \mathbb{N})\ nb < c$!

1.178. Bizonyítsuk be, hogy bármely két valós szám között van véges tizedes tört!

1.179. Bizonyítsuk be, hogy bármely két valós szám között van racionális szám!

1.180. Mi a kapcsolat a véges tizedestört alakban felírható számok halmaza és a racionális számok halmaza között?

1.181. Bizonyítsuk be, hogy egy valós szám tizedestört-alakja akkor és csak akkor periodikus, ha a szám racionális.

1.182. Fordítsuk le a végtelen tizedestörtekről tanultakat kettes számrendszerre, azaz definiáljuk a véges és végtelen bináris (kettedes) törteket és mondjuk ki a tételeink megfelelőit!

1.183. Ellenőrizzük, hogy a Cantor-axióma állítása nem marad igaz, ha bármelyik feltételét elhagyjuk.

1.184. Igazoljuk a testaxiómák segítségével a következő azonosságokat:

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

(a) $-a = (-1) \cdot a$

(b) $(a - b) - c = a - (b + c)$

(c) $(-a) \cdot b = -(a \cdot b)$

(d) $\dfrac{1}{a/b} = \dfrac{b}{a}$

(e) $\dfrac{a}{b} \cdot \dfrac{c}{d} = \dfrac{a \cdot c}{b \cdot d}$

1.6. A számegyenes

Szemléltessük a következő számhalmazokat számegyenesen! Döntsük el, hogy melyik intervallum, és melyik nem az! Az intervallumok esetében döntsük el, hogy melyik zárt, melyik nyílt, és melyik se nem zárt, se nem nyílt!

1.185. $A = \{1, 2, 3\}$

1.186. $B = \{2.6\}$

1.187. $C = \{x \in \mathbb{R} : 2 < x < 6\}$

1.188. $D = \{x \in \mathbb{N} : 2 \leq x \leq 6\}$

1.189. $E = \{x \in \mathbb{R} : 2 \leq x \leq 6\}$

1.190. $F = \{x \in \mathbb{R} : 2 < x \leq 6\}$

1.191. $G = \{x \in \mathbb{R} : 2 \leq x < 6\}$

1.192. $H = \{x \in \mathbb{Q} : 2 \leq x \leq 6\}$

Döntsük el az alábbi halmazokról, hogy alulról korlátosak-e, felülről korlátosak-e, korlátosak-e, és hogy van-e legkisebb illetve legnagyobb elemük?

1.193. prímszámok halmaza

1.194. pozitív számok halmaza

1.195. $[-5, -2)$

1.196. $\left\{\dfrac{1}{n} : n \in \mathbb{N}^+\right\}$

1.197. $\{x \in \mathbb{R} : x \leq 73\}$

1.198. $\{x \in \mathbb{Q} : x \leq 73\}$

1.199. $\{x \in \mathbb{R} : x \leq \sqrt{2}\}$

1.200. $\{x \in \mathbb{Q} : x \leq \sqrt{2}\}$

1.201. $\{n \in \mathbb{N} : n$ prímszám $\wedge\, n + 2$ prímszám$\}$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

1.202. Mi a kapcsolat az alábbi két állítás között, azaz melyikből következik a másik?

P: Az A halmaz véges (azaz véges sok eleme van).

Q: Az A halmaz korlátos.

1.203. Van-e olyan $a_1, a_2, \ldots$ számsorozat, amelyre az $\{a_1, a_2, \ldots\}$ halmaz korlátos, de nincs se maximuma, se minimuma?

Írjuk fel logikai jelekkel az alábbi állításokat!

1.204. Az A halmaz korlátos.

1.205. Az A halmaz alulról nem korlátos.

1.206. Az A halmaznak nincs legkisebb eleme.

1.207. Egy számhalmaznak hány **maximuma**, illetve **felső korlátja** lehet?

1.208. Mi a kapcsolat az alábbi két állítás között, azaz melyikből következik a másik?

P: Az A halmaznak van legkisebb eleme.

Q: Az A halmaz alulról korlátos.

1.209. Legyen $A \cap B \neq \emptyset$. Mit tudunk mondani $\sup A, \sup B, \sup(A \cup B)$, $\sup(A \cap B)$ és $\sup(A \setminus B)$ kapcsolatáról?

1.210. Legyen $A = (0,1)$, $B = [-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$ és $C = \left\{ \frac{1}{2^n} + \frac{1}{2^m} : n, m \in \mathbb{N}^+ \right\}$. Határozzuk meg - amennyiben léteznek - a fenti halmazok szuprémumát, infimumát, maximumát és minimumát.

1.211. Legyen A egy tetszőleges számhalmaz, továbbá

$$B = \{-a : a \in A\}, C = \left\{ \frac{1}{a} : a \in A, a \neq 0 \right\}.$$

Milyen kapcsolat van a felső és alsó határok között?

Határozzuk meg a következő halmazok minimumát, maximumát, infimumát és szuprémumát, ha vannak!

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

1.212. $[1, 2]$

1.213. $(1, 2)$

1.214. $\left\{ \frac{1}{2n-1} : n \in \mathbb{N}^+ \right\}$

1.215. $\mathbb{Q}$

1.216. $\left\{ \frac{1}{n} + \frac{1}{\sqrt{n}} : n \in \mathbb{N}^+ \right\}$

1.217. $\{ \sqrt[n]{3} : n \in \mathbb{N}^+ \}$

1.218. $\{x : x \in (0, 1) \cap \mathbb{Q}\}$

1.219. $\left\{ \frac{1}{n} + \frac{1}{k} : n, k \in \mathbb{N}^+ \right\}$

1.220. $\{ \sqrt{n+1} - \sqrt{n} : n, k \in \mathbb{N}^+ \}$

1.221. $\left\{ n + \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}^+ \right\}$

1.222. $\left\{ \sqrt[n]{2} : n \in \mathbb{N}^+ \right\}$

1.223. $\{ \sqrt[n]{2^n - n} : n \in \mathbb{N} \}$

1.224. Legyen H a valós számok egy nem üres részhalmaza. Mi a következő állítások logikai kapcsolata?

(a) H alulról nem korlátos.

(b) H-nak nincs legkisebb eleme.

(c) $\forall x \in H \; \exists y \in H \; (y < x)$.

(d) $\forall y \in H \; \exists x \in H \; (y < x)$.

1.225. Tudjuk, hogy c felső korlátja H-nak. Következik-e ebből, hogy $\sup H = c$?

1.226. Tudjuk, hogy H-nak nincs c-nél kisebb felső korlátja. Következik-e ebből, hogy $\sup H = c$?

1.227. Legyenek A és B a valós számok nem üres részhalmazai. Bizonyítsuk be, hogy ha

$$\forall a \in A \; \exists b \in B (a \leq b),$$

akkor $\sup A \leq \sup B$.

1.228. Bizonyítsuk be, hogy alulról korlátos, nem üres halmaznak van alsó határa!

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

Legyenek x, y, A, B tetszőleges valós számok, ε pedig pozitív valós szám. Mi a P és Q állítások logikai kapcsolata, azaz melyikből következik a másik?

1.229. **P:** $|x - A| < \varepsilon$ **Q:** $A - \varepsilon < x < A + \varepsilon$

1.230. **P:** $|x - y| < 2\varepsilon$ **Q:** $|x - A| < \varepsilon$ és $|y - A| < \varepsilon$

1.231. **P:** $|x| < A$ és $|y| < B$ **Q:** $|x| - |y| < A - B$

1.232. **P:** $|x| < A$ és $|y| < B$ **Q:** $|x| + |y| < A + B$

1.233. **P:** $|x| < A$ és $|y| < B$ **Q:** $|x| - |y| < A + B$

1.234. Adjunk példát olyan nem üres valós számhalmazra, amelyik korlátos, de nincs legkisebb eleme!

1.235. Tegyük fel, hogy a $H \subset \mathbb{R}$ halmaz nem üres. Mi a következő állítások logikai kapcsolata, azaz melyikből következik a másik?

P: H-nak nincs minimuma. **Q:** $\forall a \in \mathbb{R}^+ \; \exists b \in H \quad b < a$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

2. fejezet
Számsorozatok konvergenciája

2.1. Az (a_n) sorozat **konvergens** és tart a $b \in \mathbb{R}$ számhoz, ha

$$\forall \varepsilon > 0 \; \exists n_0 \; \forall n \geq n_0 (|a_n - b| < \varepsilon).$$

Egy adott ε-hoz tartozó n_0 természetes számot **küszöbindexnek** nevezzük. Ha az (a_n) sorozat tart a b számhoz, ezt a következőképpen jelölhetjük:

$$\lim_{n\to\infty} a_n = b \text{ vagy } \lim a_n = b \text{ vagy } a_n \to b, \text{ ha } n \to \infty \text{ vagy } a_n \to b.$$

Ha az (a_n) sorozat nem konvergens, akkor azt mondjuk, hogy az (a_n) sorozat **divergens**.

2.2. Azt mondjuk, hogy az (a_n) sorozat **határértéke ∞**, vagy (a_n) tart végtelenhez, ha

$$\forall P \in \mathbb{R} \; \exists n_0 \; \forall n \geq n_0 (a_n > P).$$

Ennek jele

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \infty \text{ vagy } \lim a_n = \infty \text{ vagy } a_n \to \infty, \text{ ha } n \to \infty \text{ vagy } a_n \to \infty.$$

2.3. Azt mondjuk, hogy az (a_n) sorozat **határértéke -∞**, vagy (a_n) tart mínusz végtelenhez, ha

$$\forall P \in \mathbb{R} \; \exists n_0 \; \forall n \geq n_0 (a_n < P).$$

Ennek jele

$$\lim_{n\to\infty} a_n = -\infty \text{ vagy } \lim a_n = -\infty \text{ vagy } a_n \to -\infty,$$
$$\text{ha } n \to \infty \text{ vagy } a_n \to -\infty.$$

2.4. Azt mondjuk, hogy az (a_n) sorozat **oszcillálva divergens**, ha nincs sem véges, sem végtelen határértéke.

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

2.5. Rendőr-szabály. Ha valahonnan kezdve $a_n \leq b_n \leq c_n$, létezik az (a_n) és a (c_n) sorozat határértéke és

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} c_n,$$

akkor a (b_n) sorozatnak is létezik a határértéke és

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} b_n = \lim_{n\to\infty} c_n,$$

2.1. Sorozatok határértéke

Legyen az (a_n) sorozat a következőképp megadva: $a_n = 1 + \frac{1}{\sqrt{n}}$. A feladatokban szereplő n és n_0 jelek pozitív egész számokat jelölnek.

2.1. Adjunk meg olyan n_0 számot, hogy $\forall n > n_0$ esetén teljesüljön, hogy

(a) $|a_n - 1| < 0,1$ **(b)** $|a_n - 1| < 0,01$

2.2. Van-e olyan n_0 szám, hogy $\forall n > n_0$ esetén teljesül, hogy $|a_n - 2| < 0,001$?

2.3. Igaz-e, hogy

(a) $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists n_0 \quad \forall n > n_0 \quad (|a_n - 1| < \varepsilon)$
(b) $\exists n_0 \quad \forall \varepsilon > 0 \quad \forall n > n_0 \quad (|a_n - 1| < \varepsilon)$
(c) $\exists \varepsilon > 0 \quad \exists n_0 \quad \forall n > n_0 \quad (|a_n - 1| < \varepsilon)$
(d) $\exists \varepsilon > 0 \quad \exists n_0 \quad \forall n > n_0 \quad (|a_n - 1| > \varepsilon)$
(e) $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists n_0 \quad \forall n \leq n_0 \quad (|a_n - 1| < \varepsilon)$
(f) $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists n_0 \quad \forall n \leq n_0 \quad (|a_n - 1| > \varepsilon)$

Adjunk meg olyan N küszöbindexet, ahonnan kezdve az egyik sorozat nagyobb, mint a másik!

2.4. $a_n = 10n^2 + 25$ $b_n = n^3$

2.5. $a_n = 4n^5 - 3n^2 - 7$ $b_n = 10n + 30$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

2.6. $a_n = 3^n - n^2$ $b_n = 2^n + n$

2.7. $a_n = 2^n + 3^n$ $b_n = 4^n$

2.8. $a_n = 2^n$ $b_n = n!$

2.9. $a_n = n!$ $b_n = n^n$

2.10. $a_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n}$ $b_n = \frac{1}{n}$

2.11. $a_n = 2^n$ $b_n = n^3$

2.12. $a_n = 0,999^n$ $b_n = \frac{1}{n^2}$

2.13. $a_n = 10^n$ $b_n = n!$

Keressünk olyan N számot, hogy $\forall n > N$ esetén teljesüljön, hogy

2.14. $1,01^n > 1000$;

2.15. $0,9^n < \frac{1}{100}$;

2.16. $\sqrt[n]{2} < 1,01$.

2.17. $\sqrt[n]{n} < 1,0001$.

2.18. $n^2 > 6n + 15$

2.19. $n^3 > 6n^2 + 15n + 37$

2.20. $n^3 - 4n + 2 > 6n^2 - 15n + 37$

2.21. $n^5 - 4n^2 + 2 > 6n^3 - 15n + 37$

Mutassuk meg, hogy van olyan n_0 szám, amire igaz, hogy minden $n > n_0$ esetén

2.22. $\sqrt{n+1} - \sqrt{n} < 0,01$

2.23. $\sqrt{n+3} - \sqrt{n} < 0,01$

2.24. $\sqrt{n+5} - \sqrt{n+1} < 0,01$

2.25. $\sqrt{n^2+5} - n < 0,01$

Bizonyítsuk be az alábbi egyenlőtlenségeket!

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

2.26. $\forall n > 10$ esetén $2^n > n^3$; **2.27.** $\sqrt{n} \leq 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \ldots + \frac{1}{\sqrt{n}} < 2\sqrt{n}$.

2.28. Melyik állításból következik a másik?

P: Az (a_n) sorozatban van legnagyobb és legkisebb tag.

Q: Az (a_n) sorozat korlátos.

2.29. Igaz-e, hogy b pontosan akkor határértéke az (a_n) sorozatnak, ha

(a) bármely $\varepsilon > 0$-ra az a_n sorozatnak végtelen sok tagja van ε-nál közelebb b-hez?

(b) bármely $\varepsilon > 0$-ra az a_n sorozatnak csak véges sok tagja van b-től legalább ε távolságban?

(c) van olyan $\varepsilon > 0$, amelyre az a_n sorozatnak végtelen sok tagja van ε-nál közelebb b-hez?

(d) van olyan $\varepsilon > 0$, amelyre az a_n sorozatnak végtelen sok tagja van b-től legalább ε távolságban?

Mit mondhatunk a $(-a_n)$ sorozat határértékéről, ha

2.30. $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$ $(a \in \mathbb{R})$; **2.31.** $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = \infty$;

2.32. $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = -\infty$? **2.33.** a_n oszcillálva divergens?

2.34. Mi az alábbi két állítás logikai kapcsolata?

P: $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = \infty$

Q: (a_n) alulról korlátos, de felülről nem korlátos.

Határozzuk meg a következő sorozatok határértékét, és adjunk meg egy ε-tól függő küszöbindexet:

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

2.35. $\dfrac{(-1)^n}{n}$

2.36. $\dfrac{1}{\sqrt{n}}$

2.37. $\dfrac{1+\sqrt{n}}{n}$

2.38. $\dfrac{n}{n+1}$

2.39. $\dfrac{5n-1}{7n+2}$

2.40. $\dfrac{2n^6+3n^5}{7n^6-2}$

2.41. $\dfrac{n+\frac{1}{n}}{n+1}$

2.42. $\sqrt{n+1}-\sqrt{n}$

2.43. $\sqrt{n^2+1}-n$

2.44. $\dfrac{1}{n-\sqrt{n}}$

2.45. $\dfrac{1+\cdots+n}{n^2}$

2.46. $n\left(\sqrt{1+\dfrac{1}{n}}-1\right)$

2.47. $\sqrt{n^2+1}+\sqrt{n^2-1}-2n$

2.48. $\sqrt[3]{n+2}-\sqrt[3]{n-2}$

2.49. Konvergensek-e vagy divergensek-e a következő sorozatok? Határozzuk meg a határértékeket, ha vannak!

(a) $a_n=\begin{cases}3, & \text{ha } n \text{ páros}\\ 4, & \text{ha } n \text{ páratlan}\end{cases}$ **(b)** $a_n=\begin{cases}3, & \text{ha } n\le 100\\ 4, & \text{ha } n>100\end{cases}$

(c) $a_n=\begin{cases}3n, & \text{ha } n \text{ páros}\\ 4n^2, & \text{ha } n \text{ páratlan}\end{cases}$ **(d)** $a_n=\begin{cases}n, & \text{ha } n \text{ páros}\\ 0, & \text{ha } n \text{ páratlan}\end{cases}$

2.50. Bizonyítsuk be, hogy az $\dfrac{1}{n}$ sorozat nem tart 7-hez!

2.51. Bizonyítsuk be, hogy a $(-1)^n\dfrac{1}{n}$ sorozat nem tart 7-hez!

2.52. Bizonyítsuk be, hogy a $(-1)^n$ sorozat nem tart 7-hez!

2.53. Bizonyítsuk be, hogy a $(-1)^n$ sorozat divergens!

2.54. Bizonyítsuk be, hogy konvergens sorozatnak mindig van legkisebb vagy legnagyobb tagja.

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

2.55. Adjunk példát arra, hogy $a_n - b_n \to 0$ de $\frac{a_n}{b_n} \not\to 1$

2.56. Bizonyítsuk be, hogy ha (a_n) konvergens, akkor $(|a_n|)$ is. Igaz-e az állítás megfordítása ?

2.57. Abból, hogy $a_n^2 \to a^2$ következik-e, hogy $a_n \to a$?
És abból, hogy $a_n^3 \to a^3$ következik-e, hogy $a_n \to a$?

2.58. Bizonyítsuk be, hogy ha $a_n \to a > 0$, akkor $\sqrt{a_n} \to \sqrt{a}$.

Melyik állításból következik, hogy $a_n \to \infty$?

2.59. $\forall K$ esetén a (K, ∞) intervallumon kívül az a_n sorozatnak csak véges sok tagja van.

2.60. $\forall K$ eseten a (K, ∞) intervallumban az a_n sorozatnak végtelen sok tagja van.

2.61. Tegyük fel, hogy $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = \infty$. Melyik állítás igaz erre a sorozatra? Melyik állításból következik, hogy $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = \infty$?

- **(a)** Az a_n sorozatnak nincs legnagyobb tagja.
- **(b)** Az a_n sorozatnak van legkisebb tagja.
- **(c)** A $(3, \infty)$ intervallumon kívül az a_n sorozatnak csak véges sok tagja van.
- **(d)** $\forall K$ esetén a (K, ∞) intervallumon kívül az a_n sorozatnak csak véges sok tagja van.
- **(e)** A $(3, \infty)$ intervallumban az a_n sorozatnak végtelen sok tagja van.
- **(f)** $\forall K$ eseten a (K, ∞) intervallumban az a_n sorozatnak végtelen sok tagja van.

2.62. Igaz-e, hogy ha egy sorozatnak van (véges vagy végtelen) határértéke, akkor a sorozat alulról vagy felülről korlátos?

2.63. Mi az **A** és a **B** állítások logikai kapcsolata, azaz melyikből következik a másik?

P: Az (a_n) sorozat szigorúan monoton nő.

Q: Az (a_n) sorozat tart a végtelenhez.

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

Lehet-e az a_n sorozat határértéke $-\infty$, ∞ vagy egy valós szám, ha

2.64. a sorozatnak végtelen sok 3-nál nagyobb tagja van?

2.65. a sorozatnak végtelen sok 3-nál kisebb tagja van?

2.66. a sorozatnak van legnagyobb tagja?

2.67. a sorozatnak van legkisebb tagja?

2.68. a sorozatnak nincs legkisebb tagja?

2.69. a sorozatnak nincs legnagyobb tagja?

2.70. Van-e olyan oszcillálva divergens sorozat, amelyik

(a) korlátos **(b)** nem korlátos?

2.71. Egy sorozatnak végtelen sok pozitív és végtelen sok negatív tagja van. Lehet-e a sorozat konvergens?

A következő, végtelenbe tartó sorozatokhoz keressünk küszöbindexet:

2.72. $n - \sqrt{n}$

2.73. $\dfrac{1+2+\cdots+n}{n}$

2.74. $\dfrac{\sqrt{1}+\sqrt{2}+\cdots+\sqrt{n}}{n}$

2.75. $\dfrac{n^2-10n}{10n+100}$

2.76. $\dfrac{2^n}{n}$

2.77. $\dfrac{n!}{2^n}$

2.78. Tetszőleges a valós szám esetén határozzuk meg $\dfrac{n^2+1}{n+1} - an$ határértékét.

2.79. Tetszőleges a valós szám esetén határozzuk meg $\sqrt{n^2-n+1} - an$ határértékét.

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

2.80. Tetszőleges a, b valós számok esetén határozzuk meg $\sqrt{(n+a)(n+b)} - n$ határértékét.

2.81. Bizonyítsuk be, hogy ha $a_{n+1} - a_n \to c > 0$, akkor $a_n \to \infty$.

2.82. Bizonyítsuk be, hogy ha $a_n > 0$, $\dfrac{a_{n+1}}{a_n} \to c > 1$, akkor $a_n \to \infty$.

2.83. Melyek azok az x valós számok, amelyekre a tizedestört jegyeiből álló sorozat oszcillálva divergens?

2.2. A határérték tulajdonságai

Meg lehet-e mondani az adott egyenlőtlenségek alapján, hogy a b_n sorozatnak van-e határértéke, illetve meg lehet-e határozni a határértéket, ha van? Ha igen, határozzuk meg b_n határértékét!

2.84. $\dfrac{1}{n} < b_n < \dfrac{2}{n}$

2.85. $-\dfrac{1}{n} \le b_n \le \dfrac{1}{\sqrt{n}}$

2.86. $\dfrac{1}{n} < b_n < \sqrt{n}$

2.87. $n \le b_n$

2.88. $b_n < -1,01^n$

2.89. $b_n < n^2$

2.90. Bizonyítsuk be, hogy ha az (a_n) sorozatnak nincs végtelenhez tartó részsorozata, akkor a sorozat felülről korlátos.

2.91. Bizonyítsuk be, hogy ha $(a_{2n}), (a_{2n+1}), (a_{3n})$ konvergensek, akkor (a_n) is az.

2.92. Lehetséges-e, hogy az (a_n) sorozatnak nincs konvergens részsorozata, de $(|a_n|)$ konvergens?

Legyen a egy valós szám és $a_n \to a$. Bizonyítsuk be, hogy

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

2.93. ha $a > 1$, akkor $a_n^n \to \infty$. **2.94.** ha $|a| < 1$, akkor $a_n^n \to 0$.

2.95. ha $a > 0$, akkor $\sqrt[n]{a_n} \to 1$. **2.96.** ha $a < -1$, akkor a_n^n divergens.

2.97. Bizonyítsuk be, hogy ha $(a_n + b_n)$ konvergens és (b_n) divergens, akkor (a_n) divergens.

2.98. Igaz-e, hogy ha $(a_n \cdot b_n)$ konvergens és (b_n) divergens, akkor (a_n) is divergens?

2.99. Igaz-e, hogy ha (a_n/b_n) konvergens és (b_n) divergens, akkor (a_n) is divergens?

2.100. Bizonyítsuk be, hogy ha $\lim \dfrac{a_n - 1}{a_n + 1} = 0$, akkor (a_n) konvergens és $\lim a_n = 1$.

2.101. Tegyük fel, hogy az (a_n) sorozatra teljesül, hogy $\dfrac{a_n - 5}{a_n + 3} \to \dfrac{5}{13}$. Bizonyítsuk be, hogy $a_n \to 10$.

2.102. Tegyük fel, hogy az (a_n) sorozatra $\sqrt[n]{a_n} \to 0,3$. Bizonyítandó, hogy $a_n \to 0$.

2.103. Legyen $p(x)$ egy polinom. Bizonyítsuk be, hogy $\dfrac{p(n+1)}{p(n)} \to 1$.

Tegyük fel, hogy az a_n sorozatnak van határértéke. Mi a következő állítások logikai kapcsolata?

2.104. **P:** Minden elég nagy n-re $\dfrac{1}{n} < a_n$ **Q:** $\lim\limits_{n\to\infty} a_n > 0$

2.105. **P:** Minden elég nagy n-re $\dfrac{1}{n} \le a_n$ **Q:** $\lim\limits_{n\to\infty} a_n \ge 0$

2.106. **P:** Minden elég nagy n-re $\dfrac{1}{n} < a_n$ **Q:** $\lim\limits_{n\to\infty} a_n \ge 0$

2.107. **P:** Minden elég nagy n-re $\dfrac{1}{n} \le a_n$ **Q:** $\lim\limits_{n\to\infty} a_n > 0$

Tegyük fel, hogy az a_n és b_n sorozatnak van határértéke. Mi a következő állítások logikai kapcsolata?

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

2.108. **P:** Minden elég nagy n-re $a_n < b_n$ **Q:** $\lim_{n\to\infty} a_n < \lim_{n\to\infty} b_n$

2.109. **P:** Minden elég nagy n-re $a_n \leq b_n$ **Q:** $\lim_{n\to\infty} a_n \leq \lim_{n\to\infty} b_n$

Melyik állításokból következik, hogy az a_n sorozatnak van határértéke? Melyik állításokból következik, hogy a_n konvergens? Melyik állításokból következik, hogy a_n divergens?

2.110. b_n konvergens és $a_n > b_n$ minden elég nagy n-re.

2.111. $\lim_{n\to\infty} b_n = \infty$ és $a_n > b_n$ minden elég nagy n-re.

2.112. $\lim_{n\to\infty} b_n = -\infty$ és $a_n > b_n$ minden elég nagy n-re.

2.113. b_n és c_n konvergens és $b_n \leq a_n \leq c_n$ minden elég nagy n-re.

2.114. $\lim_{n\to\infty} b_n = \infty$ és $a_n < b_n$ minden elég nagy n-re.

Korlátosak-e felülről a következő sorozatok? Határozzuk meg a határértékeket, ha vannak!

2.115. $\dfrac{1+2+\cdots+n}{n}$

2.116. $\dfrac{1+2+\cdots+n}{n^2}$

2.117. $\dfrac{\sqrt{1}+\sqrt{2}+\cdots+\sqrt{n}}{n}$

2.118. $\dfrac{\sqrt{1}+\sqrt{2}+\cdots+\sqrt{n}}{n^2}$

Konvergensek-e vagy divergensek-e a következő sorozatok? Határozzuk meg a határértékeket, ha vannak!

2.119. $\sqrt[n]{2^n+3^n}$

2.120. $\sqrt[n]{3^n-2^n}$

2.121. $\sqrt[n]{7+(-1)^n}$

2.122. $\sqrt[n]{2^n-n}$

2.123. $\sqrt[n]{2^n+n^2}$

2.124. $\sqrt[n]{2^n-n^2}$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

2.125. $\dfrac{1-2+3-\cdots-2n}{\sqrt{n^2+1}}$

2.126. $\left(\dfrac{n-1}{3n}\right)^n$

2.127. $\dfrac{n^3-n^2+1}{\sqrt{n^6+1}+100n^2+n+1}$

2.128. $\sqrt[n]{\dfrac{n^3-n^2+1}{n^6+100n^2+n+1}}$

2.129. $\sqrt[n]{\dfrac{2^n+n^2+1}{3^n+n^3+1}}$

2.130. $\dfrac{n^2+(-1)^n}{3n^2+1}$

2.131. $\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^{n^2}$

2.132. $\dfrac{n^2-1}{n^2+1}$

2.133. $\dfrac{1}{n^3}$

2.134. $\dfrac{5n-1}{7n+2}$

2.135. $\dfrac{n}{n+1}$

2.136. $\dfrac{2n^6+3n^5}{7n^6-2}$

2.137. $\dfrac{n+1/n}{n+1}$

2.138. $\dfrac{7n^5+2}{5n-1}$

2.139. $\dfrac{3n^7+4}{-5n^2+2}$

2.140. $\dfrac{2^n+3^n}{4^n+(-7)^n}$

2.141. $\dfrac{3n^{5/3}+n\sqrt{n}}{n^{1/4}+\sqrt[5]{n}}$

2.142. $\dfrac{7n-2n^3}{3n^3+18n^2-9}$

Mi a következő állításpárok logikai kapcsolata?

2.143. **P:** a_n konvergens és b_n konvergens **Q:** a_n+b_n konvergens

2.144. **P:** $a_n+b_n\to\infty$ **Q:** $a_n\to\infty$ és $b_n\to\infty$

2.145. **P:** $a_n+b_n\to\infty$ **Q:** $a_n\to\infty$ vagy $b_n\to\infty$

2.146. **P:** $a_n\cdot b_n\to 0$ **Q:** $a_n\to 0$ vagy $b_n\to 0$

2.147. **P:** a_n és b_n korlátos **Q:** a_n+b_n korlátos

2.148. **P:** a_n és b_n korlátos **Q:** $a_n\cdot b_n$ korlátos

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

2.149. Mutassunk példákat az $a_n + b_n$ sorozat lehetséges viselkedésére, ha $\lim_{n\to\infty} a_n = \infty$ és $\lim_{n\to\infty} b_n = -\infty$.

2.150. Mutassunk példákat az $a_n \cdot b_n$ sorozat lehetséges viselkedésére, ha $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$ és $\lim_{n\to\infty} b_n = \infty$.

2.151. Mutassunk példákat az $\frac{a_n}{b_n}$ sorozat lehetséges viselkedésére, ha $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$ és $\lim_{n\to\infty} b_n = 0$.

2.152. Mutassunk példákat az $\frac{a_n}{b_n}$ sorozat lehetséges viselkedésére, ha $\lim_{n\to\infty} a_n = \infty$ és $\lim_{n\to\infty} b_n = \infty$.

2.153. Tegyük fel, hogy a b_n sorozat egyetlen tagja sem 0. Mi a **P** és a **Q** állítások logikai kapcsolata, azaz melyikből következik a másik?

P: $b_n \to \infty$ **Q:** $\frac{1}{b_n} \to 0$

2.154. Mi a **P** és a **Q** állítások logikai kapcsolata, azaz melyikből következik a másik?

P: $\frac{a_n}{b_n} \to 1$ **Q:** $a_n - b_n \to 0$

2.155. Tegyük fel, hogy $a_n \to \infty$ és $b_n \to \infty$. Mi a **P** és a **Q** állítások logikai kapcsolata, azaz melyikből következik a másik?

P: $\frac{a_n}{b_n} \to 1$ **Q:** $a_n - b_n \to 0$

2.156. Tegyük fel, hogy $a_n \to 0$ és $b_n \to 0$. Mi a **P** és a **Q** állítások logikai kapcsolata, azaz melyikből következik a másik?

P: $\frac{a_n}{b_n} \to 1$ **Q:** $a_n - b_n \to 0$

2.3. Monoton sorozatok

Legyen (a_n) és (b_n) két monoton sorozat. Mit tudunk mondani a monotonitás szempontjából a következő sorozatokról? Milyen további feltételek mellett lesznek monotonok?

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

2.157. $(a_n + b_n)$

2.158. $(a_n - b_n)$

2.159. $(a_n \cdot b_n)$

2.160. $\left(\frac{a_n}{b_n}\right)$

2.161. Legyen $a_1 = 1$, és $n \geq 1$ esetén $a_{n+1} = \sqrt{2a_n}$. Bizonyítsuk be, hogy az a_n sorozat monoton növő!

2.162. Legyen $a_1 = \frac{1}{2}$, és $n \geq 1$ esetén $a_{n+1} = 1 - \sqrt{1 - a_n}$. Bizonyítsuk be, hogy a sorozat minden tagja pozitív, továbbá, hogy a sorozat monoton csökkenő!

2.163. Legyen $a_1 = 0,9$, és $n \geq 1$ esetén $a_{n+1} = a_n - a_n^2$. Bizonyítsuk be, hogy a sorozat minden tagja pozitív, továbbá, hogy a sorozat monoton csökkenő! Mutassuk meg, hogy van olyan $n \in \mathbb{N}^+$, amelyre igaz, hogy $a_n < 10^{-6}$, és adjunk példát ilyen n számra!

2.164. Legyen $a_1 > 0$, és minden $n \in \mathbb{N}^+$ esetén $\frac{a_{n+1}}{a_n} > 1,1$. Mutassuk meg, hogy van olyan $n \in \mathbb{N}^+$, amelyre igaz, hogy $a_n > 10^6$, és adjunk példát ilyen n számra!

Mi a következő állítások logikai kapcsolata, azaz melyikből következik a másik?

2.165. **P:** Az a_n sorozat monoton nő.
Q: Az a_n sorozat végtelenhez tart.

2.166. **P:** Az a_n sorozat monoton csökken.
Q: Az a_n sorozat mínusz végtelenhez tart.

2.167. Tegyük fel, hogy az (a_n) sorozat tagjai $n > 1$ esetén kielégítik a $a_n \leq \frac{a_{n-1} + a_{n+1}}{2}$ egyenlőtlenséget. Bizonyítsuk be, hogy az (a_n) sorozat nem lehet oszcillálva divergens.

2.168. Legyen $a_1 = a > 0$ tetszőleges, $a_{n+1} = \frac{1}{2}\left(a_n + \frac{a}{a_n}\right)$. Mutassuk meg, hogy $a_n \to \sqrt{a}$.

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

Határozzuk meg a következő rekurzív sorozatok határértékét, ha van! A rekurzív képletekben $n \geq 1$.

2.169. $a_1 = 2,\ a_{n+1} = \dfrac{2a_n}{1+a_n^2}$

2.170. $a_1 = 1{,}5,\ a_{n+1} = -a_n + 1$

2.171. $a_1 = 3,\ a_{n+1} = \dfrac{a_n + \dfrac{5}{a_n}}{2}$

2.172. $a_1 = 6,\ a_{n+1} = \dfrac{a_n + \dfrac{5}{a_n}}{2}$

2.173. $a_1 = 0,\ a_{n+1} = \sqrt{2+a_n}$

2.174. $a_1 = 0,\ a_{n+1} = \dfrac{1}{2-a_n}$

2.175. $a_1 = 0,\ a_{n+1} = \dfrac{1}{4-a_n}$

2.176. $a_1 = 0,\ a_{n+1} = \dfrac{1}{1+a_n}$

2.177. $a_1 = 1,\ a_{n+1} = a_n + \dfrac{1}{a_n}$

2.178. $a_1 = 0{,}9,\ a_{n+1} = a_n - a_n^2$

2.179. $a_1 = 1,\ a_{n+1} = \sqrt{2a_n}$

2.180. $a_1 = 1,\ a_{n+1} = a_n + \dfrac{1}{a_n^3+1}$

Korlátosak-e, illetve monotonok-e a következő sorozatok? Határozzuk meg a határértékeket, ha vannak!

2.181. $\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^n$

2.182. $\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^{n+1}$

2.183. $\left(1-\dfrac{1}{n}\right)^n$

2.184. $\left(1+\dfrac{1}{2n}\right)^n$

2.4. A Bolzano-Weierstrass-tétel és a Cauchy-kritérium

2.185. Írjuk fel a Cauchy-kritérium tagadását egy (a_n) sorozatra! Mi a felírt állítás logikai kapcsolata az „(a_n) divergens” állítással?

Mi a következő állításpárok logikai kapcsolata?

2.186. **P:** a_{2n} és a_{2n+1} konvergens **Q:** a_n konvergens

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

2.187. **P:** a_{2n}, a_{2n+1} és a_{3n} konvergens **Q:** a_n konvergens

2.188. **P:** $a_{2n} \to 5$ **Q:** $a_n \to 5$

Következik-e valamelyik állításból, hogy a sorozat konvergens?

2.189. $a_{n+1} - a_n \to 0$, ha $n \to \infty$

2.190. $|a_n - a_m| < \dfrac{1}{n+m}$ minden n, m-re

Döntsük el az alábbi sorozatokról, hogy van-e konvergens részsorozatuk!

2.191. $(-1)^n$

2.192. $\dfrac{1}{n}$

2.193. $\sqrt{n}$

2.194. $(-1)^n \dfrac{1}{n}$

2.195. Bizonyítsuk be, hogy ha az (a_n) sorozatnak nincs konvergens részsorozata, akkor $|a_n| \to \infty$.

2.196. Bizonyítsuk be, hogy ha (a_n) korlátos és minden konvergens részsorozata a-hoz tart, akkor $a_n \to a$.

2.197. Bizonyítsuk be, hogy ha az (a_n) sorozatnak nincs két, különböző határértékhez tartó részsorozata, akkor a sorozatnak van határértéke.

2.198. Bizonyítsuk be, hogy ha $|a_{n+1} - a_n| \leq 2^{-n}$ minden n-re, akkor az (a_n) sorozat konvergens.

2.199. Tegyük fel, hogy $a_{n+1} - a_n \to 0$. Következik-e ebből, hogy $a_{2n} - a_n \to 0$?

2.5. Sorozatok nagyságrendje

2.200. Bizonyítsuk be, hogy $n! \prec n^n$ igaz!

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

2.201. Tegyük az alábbi sorozatokat nagyságrend szerint sorba!

(n^7), (n^2+2^n), $(100\sqrt{n})$, $\left(\frac{n!}{10}\right)$

2.202. Illesszük be az $n \prec n^2 \prec n^3 \prec \cdots \prec 2^n \prec 3^n \prec \cdots \prec n! \prec n^n$ sorba a megfelelő helyre $\sqrt{n}$-et, $\sqrt[3]{n}$-et, ... , $\sqrt[k]{n}$-et!

2.203. Keressük meg az alábbi sorozatok között az összes aszimptotikusan egyenlő párt!

$(n!)$, (n^n), $(n!+n^n)$, $(\sqrt{n})$, $(\sqrt[n]{n})$, $(\sqrt{n+1})$, $(\sqrt[n]{2})$

Konvergensek-e vagy divergensek-e a következő sorozatok? Határozzuk meg a határértékeket, ha vannak!

2.204. $\frac{2^n}{3^n}$

2.205. $\frac{3^n}{2^n}$

2.206. $(1,1)^n$

2.207. $\left(-\frac{4}{5}\right)^n$

2.208. $\frac{1}{(1,2)^n+1}$

2.209. $\frac{n+2}{\sqrt{n}-3^{-n}}$

2.210. $\frac{3,01^n}{2^n+3^n}$

2.211. $\frac{3^n}{(-3)^n}$

2.212. $\frac{3^n-\sqrt{n}+n^{10}}{2^n-\sqrt[n]{n}+n!}$

2.213. $\frac{n^{100}}{100^n}$

2.214. $\frac{10^n}{n!}$

2.215. $0,99^n n^2$

2.216. $\frac{n!-3^n}{n^{10}-2^n}$

2.217. $\frac{1,01^n}{n^2}$

2.218. $\frac{n^3}{1,2^n}$

2.219. $\sqrt[n]{2^n+n-1}$

2.220. $\frac{3^{n+6}+n^2}{2^{n+3}}$

2.221. $\frac{4^n+5^n}{6^n+(-7)^n}$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

2.6. Vegyes feladatok

2.222. Legyen $a_n = \frac{1}{n} + \frac{1}{n} + \cdots + \frac{1}{n}$ (n tagú az összeg). Mivel a tagokat alkotó sorozatok 0-hoz tartanak, ezért az a_n sorozat tart 0-hoz. Másrészt minden n-re $a_n = n \cdot \frac{1}{n} = 1$, ezért $a_n \to 1$. Melyik következtetés a hibás, és mi a hiba benne?

2.223. Tudjuk, hogy $1 + \frac{1}{n} \to 1$, továbbá $1^n = 1$, ezért $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \to 1$.
Másrészt a Bernoulli-egyenlőtlenség felhasználásával bizonyíthatjuk, hogy $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \geq 2$, tehát $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ határértéke nem lehet kisebb 2-nél.
Melyik következtetés a hibás, és mi a hiba benne?

2.224. Tegyük fel, hogy $\sqrt[n]{a_n} \to 2$. Mit mondhatunk a $\lim\limits_{n\to\infty} a_n$ határértékről?

2.225. Tegyük fel, hogy $\sqrt[n]{a_n} \to \frac{1}{2}$. Mit mondhatunk a $\lim\limits_{n\to\infty} a_n$ határértékről?

2.226. Tegyük fel, hogy $\sqrt[n]{a_n} \to 1$. Mit mondhatunk a $\lim\limits_{n\to\infty} a_n$ határértékről?

2.227. Tegyük fel, hogy $a_n \to 2$. Mit mondhatunk a $\lim\limits_{n\to\infty} a_n^n$ határértékről?

2.228. Tegyük fel, hogy $a_n \to \frac{1}{2}$. Mit mondhatunk a $\lim\limits_{n\to\infty} a_n^n$ határértékről?

2.229. Tegyük fel, hogy $a_n \to 1$. Mit mondhatunk a $\lim\limits_{n\to\infty} a_n^n$ határértékről?

Mutassunk példát olyan a_n sorozatra, amelyre igaz, hogy $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 1$, és

2.230. $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 1$

2.231. $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = \infty$

2.232. $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$

2.233. $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 7$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

3. fejezet

Valós függvények határértéke, folytonossága

3.1. Jensen-egyenlőtlenség. Az f függvény akkor és csak akkor konvex az (a,b) intervallumon, ha bárhogy megadva véges sok $x_1, x_2, \dots, x_n \in (a,b)$ számot és $t_1, t_2, \dots, t_n \geq 0$ súlyokat úgy, hogy $\sum_{i=1}^{n} t_i = 1$

$$f\left(\sum_{i=1}^{n} t_i x_i\right) \leq \sum_{i=1}^{n} t_i f(x_i),$$

más szóval a súlyozott középen vett függvényérték kisebb vagy egyenlő a függvényértékek súlyozott közepénél.

3.2. Határérték és egyenlőtlenségek kapcsolata.

— Ha a egy környezetében $f(x) \leq g(x)$, f-nek és g-nek létezik a határértéke a-ban, akkor

$$\lim_{x\to a} f(x) \leq \lim_{x\to a} g(x).$$

— Ha f-nek és g-nek létezik a határértéke a-ban és

$$\lim_{x\to a} f(x) < \lim_{x\to a} g(x),$$

akkor a egy környezetében $f(x) < g(x)$.

— **Rendőr-szabály.** Ha $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$ a egy környezetében, f-nek és h-nak létezik a határértéke a-ban,

$$\lim_{x\to a} f(x) = \lim_{x\to a} h(x),$$

akkor a g függvénynek is létezik a határértéke a-ban és

$$\lim_{x\to a} f(x) = \lim_{x\to a} g(x) = \lim_{x\to a} h(x).$$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

— **„0-szor korlátos az 0”.** Ha $\lim_{x\to a} f(x) = 0$ és $g(x)$ korlátos, akkor

$$\lim_{x\to a} f(x)g(x) = 0.$$

3.3. Folytonosság és határérték kapcsolata.

— Az f függvény akkor és csak akkor folytonos az a pontban, ha az a pontban létezik a függvény határértéke és az megegyezik az $f(a)$ helyettesítési értékkel.

— Az f függvény akkor és csak akkor folytonos jobbról az a pontban, ha az a pontban létezik a függvény jobboldali határértéke és az megegyezik az $f(a)$ helyettesítési értékkel.

— Az f függvény akkor és csak akkor folytonos balról az a pontban, ha az a pontban létezik a függvény baloldali határértéke és az megegyezik az $f(a)$ helyettesítési értékkel.

3.4. Korlátos zárt intervallumon folytonos függvények.

— **Weierstrass tétele:** Korlátos zárt intervallumon folytonos függvénynek van legnagyobb értéke, azaz maximuma, és van legkisebb értéke, azaz minimuma.

— **Bolzano tétele:** Ha az $f(x)$ függvény folytonos az $[a, b]$ korlátos zárt intervallumon, akkor a függvény $f(a)$ és $f(b)$ között minden értéket felvesz.

— **Inverz függvény folytonossága:** Korlátos zárt intervallumon folytonos és invertálható függvény értékkészlete egy korlátos zárt intervallum, és ezen a függvény inverze folytonos.

3.5. Egyenletes folytonosság.

— **Heine-Borel tétele:** Korlátos zárt intervallumon folytonos függvény egyenletesen folytonos.

— Az $f(x)$ függvény akkor és csak akkor egyenletesen folytonos a **korlátos nyílt** (a, b) intervallumon, ha folytonos (a, b)-n és léteznek és végesek a $\lim_{x\to a^+} f(x)$, $\lim_{x\to b^-} f(x)$ határértékek.

— Ha $f(x)$ folytonos az $[a, \infty)$-en, deriválható (a, ∞)-en és a derivált korlátos, akkor $f(x)$ egyenletesen folytonos $[a, \infty)$-en.

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

3.1. Függvények globális tulajdonságai

3.1. Jelölje $[x]$ az x szám egészrészét, azaz azt a legnagyobb egész számot, amelyik nem nagyobb, mint x. Ábrázoljuk a következő függvényeket!

(a) $[x]$ **(b)** $[-x]$

(c) $[x+0,5]$ **(d)** $[2x]$

3.2. Jelölje $\{x\}$ az x szám törtrészét: $\{x\} = x - [x]$. Ábrázoljuk a következő függvényeket!

(a) $\{x\}$ **(b)** $\{-x\}$


(c) $\{x+0,5\}$ **(d)** $\{2x\}$

3.3. Függvényt ad-e meg a következő képlet?


$$D(x) = \begin{cases} 1 & \text{ha } x \in \mathbb{Q} \\ 0 & \text{ha } x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

3.4. Adjuk meg a következő függvények képleteit a grafikonjaik alapján!

(a)




(b)




www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

(c)



(d)



Határozzuk meg a valós számok legbővebb részhalmazát, ahol a következő függvények értelmezve lehetnek!

3.5. $\log_2 x^2$

3.6. $\sqrt{x^2-16}$

3.7. $\sqrt{\sin x}$

3.8. $\dfrac{\log_2(-x)}{\sqrt{-x}}$

3.9. Párosítsuk a függvényeket és a függvénygrafikonokat!


(a) $(x-1)^2-4$

(b) $(x-2)^2+2$


(c) $(x+2)^2+2$

(d) $(x+3)^2-2$

(A)




(B)




www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

(C)




(D)




3.10. Az alábbi ábrákon az $y = -x^2$ függvény négy eltoltjának a grafikonját ábrázoltuk. Írjuk fel a grafikonoknak megfelelő képleteket!


(a)




(b)



(c)



(d)



3.11. Vannak-e egyenlők a következő függvények között?

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

(a) $f_1(x) = x$ **(b)** $f_2(x) = \sqrt{x^2}$

(c) $f_3(x) = \left(\sqrt{x}\right)^2$ **(d)** $f_4(x) = \ln e^x$

(e) $f_5(x) = e^{\ln x}$ **(f)** $f_6(x) = \left(\sqrt{-x}\right)^2$

3.12. Határozzuk meg a függvényértékeket, ha $f(x) = x+5$ és $g(x) = x^2 - 3$.

(a) $f(g(0))$ **(b)** $g(f(0))$

(c) $f(g(x))$ **(d)** $g(f(x))$

(e) $f(f(-5))$ **(f)** $g(g(2))$

(g) $f(f(x))$ **(h)** $g(g(x))$

3.13. Határozzuk meg a függvényértékeket, ha $f(x) = x-1$ és $g(x) = \dfrac{1}{x+1}$.

(a) $f(g(1/2))$ **(b)** $g(f(1/2))$

(c) $f(g(x))$ **(d)** $g(f(x))$

(e) $f(f(2))$ **(f)** $g(g(2))$

(g) $f(f(x))$ **(h)** $g(g(x))$

Melyik függvény páros, melyik páratlan, melyik se nem páros, se nem páratlan, melyik páros is, és páratlan is?

3.14. x^3 **3.15.** x^4

3.16. $\sin x$ **3.17.** $\cos x$

3.18. $2 + \sin x$ **3.19.** $2 + \cos x$

3.20. 3 **3.21.** $(x+1)^2$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

3.22. 0

3.23. $|x^3|$

3.24. $[x]$

3.25. $\{x\}$

Tegyük fel, hogy f és g mindenütt értelmezett valós függvények. Döntsük el az alábbi következtetésekről, hogy igazak-e. A válaszokat indokoljuk!

3.26. Ha f páratlan, akkor $f(0) = 0$.

3.27. Ha $f(0) = 0$, akkor f páratlan.

3.28. Ha f páros, akkor $f(-5) = f(5)$.

3.29. Ha $f(-5) = f(5)$, akkor f páros.

3.30. Ha f és g páros, akkor fg páros.

3.31. Ha $f(-5) \neq -f(5)$, akkor f nem páratlan.

3.32. Ha f és g páratlan, akkor fg páros.

3.33. Ha f és g páratlan, akkor fg páratlan.

3.34. Ábrázoljuk a következő függvények grafikonját! Színezzük be pirossal az x-tengelyen azokat az intervallumokat, ahol a függvény monoton csökken. Van-e olyan függvény ezek között, amelyik az egész értelmezési tartományán monoton csökken?

(a) $\sin x$

(b) $\cos x$

(c) x^2

(d) $\dfrac{1}{x}$

(e) $|x|$

(f) $|x^2 - 2|$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

(g) $\operatorname{tg} x$ **(h)** $\operatorname{ctg} x$

3.35. Van-e olyan függvény, amely $\mathbb{R}$-en monoton nő és monoton csökken? Ha van, akkor adjuk meg az összes ilyen függvényt!

Válaszoljunk az alábbi kérdésekre. A válaszokat indokoljuk!

3.36. Lehet-e két szigorúan monoton növő függvény összege szigorúan monoton csökkenő?

3.37. Lehet-e két szigorúan monoton növő függvény szorzata szigorúan monoton csökkenő?

3.38. Igaz-e, hogy két szigorúan monoton csökkenő függvény összege szigorúan monoton csökkenő?

3.39. Igaz-e, hogy két szigorúan monoton csökkenő függvény szorzata szigorúan monoton csökkenő?

Jelölje $D(f)$ az f függvény értelmezési tartományát, $R(f)$ pedig az értékkészletét. Van-e olyan monoton növő függvény, amelyikre igaz, hogy

3.40. $D(f) = (0,1)$ és $R(f) = [0,1]$

3.41. $D(f) = [0,1]$ és $R(f) = (0,1)$

3.42. Írjuk fel logikai jelekkel, hogy egy függvény korlátos!

Adjunk meg alsó, illetve felső korlátokat a következő függvényekhez, ha vannak! Melyik függvény korlátos?

3.43. x^2 **3.44.** $\sin x$

3.45. $\{x\}$ **3.46.** $\dfrac{[x]}{x}$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

3.47. $\sin^2 x$ **3.48.** 2^{-x}

3.49. $\log_2 x$ **3.50.** $\dfrac{1}{1+x^2}$

Tegyük fel, hogy az f függvény mindenütt értelmezett. Írjuk fel logikai jelekkel és adjunk példát arra, hogy az f függvénynek

3.51. 3-ban maximuma van! **3.52.** a maximuma 3.

3.53. van maximuma! **3.54.** nincs minimuma!

Mi a következő állítások logikai kapcsolata, azaz melyikből következik a másik?

3.55. **P:** Az f függvénynek van maximuma.
Q: Az f függvény felülről korlátos.

3.56. **P:** Az f függvénynek nincs minimuma.
Q: Az f függvény alulról nem korlátos.

Adjuk meg a következő függvények m minimumát és M maximumát a megadott intervallumokon, ha vannak!

3.57. x^2 $(-\infty, \infty)$ **3.58.** $|x|$ $[-1, 3]$

3.59. x^3 $[-1, 1)$ **3.60.** $\sin x$ $(-\pi, \pi)$

3.61. $\cos x$ $(-\pi, \pi)$ **3.62.** $[x]$ $[-1, 1]$

3.63. $[x]$ $(-1, 1)$ **3.64.** $\{x\}$ $[-1, 1]$

Mutassunk példát olyan mindenütt értelmezett függvényre, amelyik

3.65. sem alulról, sem felülről nem korlátos.

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

3.66. korlátos, de nincs sem minimuma, sem maximuma.

Mutassunk példát olyan függvényre, amelyiknek az értelmezési tartománya a $[-1, 1]$ intervallum, és a függvény

3.67. sem alulról, sem felülről nem korlátos.

3.68. korlátos, de nincs sem minimuma, sem maximuma.

Van-e olyan függvény, amelyik

3.69. szigorúan monoton csökken $(-\infty, 0)$-ban, szigorúan monoton nő $(0, \infty)$-en, és 0-ban nincs minimuma?

3.70. monoton csökken $(-\infty, 0]$-ban, monoton nő $[0, \infty)$-en, és 0-ban nincs minimuma?

3.71. nem korlátos $[0, 1]$-en?

3.72. korlátos $[0, 1]$-en, de nincs sem maximuma, sem minimuma $[0, 1]$-en?

3.73. pozitív $\mathbb{R}$-en, de nincs minimuma?

Adjuk meg a következő függvények legkisebb pozitív periódusát!

3.74. $\sin x$

3.75. $\sin(2x)$

3.76. $\sin \frac{x}{2}$

3.77. $\operatorname{tg} x$

3.78. $\sin x + \operatorname{tg} x$

3.79. $\sin 2x + \operatorname{tg} \frac{x}{2}$

3.80. Bizonyítsuk be, hogy ha egy függvény p szerint periodikus, akkor p minden pozitív egész többszöröse szerint is periodikus!

3.81. Periodikus-e az $f(x) = 3$ függvény? Ha igen, akkor adjuk meg az összes olyan számot, amely szerint periodikus!

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

3.82. Van-e minden nem konstans periodikus függvénynek legkisebb pozitív periódusa?

3.83. Periodikus-e a

$$D(x) = \begin{cases} 1 & \text{ha } x \in \mathbb{Q} \\ 0 & \text{ha } x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

Dirichlet-függvény? Ha igen, akkor adjuk meg az összes olyan számot, amely szerint periodikus!

Döntsük el, hogy konvex-e illetve konkáv-e az adott függvény $(0, \infty)$-ben!

3.84. x

3.85. x^2

3.86. $\sqrt{x}$

3.87. $-x^3$

3.88. $\sin x$

3.89. $[x]$

3.90. Legyen f valós függvény a $(0, 10)$ intervallumon. Mi a **P** és **Q** állítások logikai kapcsolata, azaz melyikből következik a másik?

P: f konvex az $(3, 8)$ intervallumon.
Q: f konvex az $(5, 7)$ intervallumon.

3.91. Adjuk meg az összes olyan függvényt, amelyik egyszerre konvex és konkáv az $(1, 2)$ intervallumon! Van-e ezek közt szigorúan konvex vagy szigorúan konkáv?

3.92. Tegyük fel, hogy f értelmezve van a $(-1, 3)$ intervallumban. Mi a következő állítások logikai kapcsolata, azaz melyikből következik a másik?

P: $f(1) \leq \dfrac{f(0) + f(2)}{2}$
Q: f konvex a $(-1, 3)$ intervallumban.

3.93. Döntsük el, hogy konvex-e illetve konkáv-e a $\sqrt{x}$ függvény a $[0, \infty)$ intervallumban! Írjuk fel a megfelelő Jensen-egyenlőtlenséget. $t_1 = \ldots = t_n = \dfrac{1}{n}$ súlyokkal!

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

3.94. Vázoljuk az x^{10} függvény grafikonját, és az $[1,2]$ intervallum feletti húrját! Írjuk fel az x^{10} függvény $[1,2]$ intervallum feletti húrjának az egyenletét! Bizonyítsuk be, hogy $x^{10} \leq 1023x - 1022$ minden $x \in [1,2]$-re!

3.95. Írjuk fel az $\sin x$ függvény $\left[\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}\right]$ feletti húrjának egyenletét!

Melyik nagyobb: $\frac{\sin(\pi/6) + \sin(\pi/2)}{2}$ vagy $\sin \frac{\pi/6 + \pi/2}{2}$?

3.96. Írjuk fel az $\log_7 x$ függvény $[2,4]$ feletti húrjának egyenletét!

Melyik nagyobb: $\log_7 3$ vagy $\frac{\log_7 2 + \log_7 4}{2}$?

Rajzoljunk függvénygrafikont úgy, hogy a függvény legyen

3.97. monoton növő $[1,2]$-ben és monoton csökkenő $[3,4]$-ben

3.98. monoton növő $[1,4]$-ben és monoton csökkenő $[3,5]$-ben

3.99. konvex $[1,4]$-ben és konkáv $[4,5]$-ben

3.100. konvex $[1,4]$-ben és konkáv $[2,5]$-ben

3.101. szigorúan monoton növő $[1,2]$-ben, szigorúan monoton csökkenő $[2,4]$-ben, és legyen maximuma 2-ben

3.102. szigorúan monoton növő $[1,2]$-ben, szigorúan monoton csökkenő $[2,4]$-ben, és legyen minimuma 2-ben

Rajzoljunk függvénygrafikont úgy, hogy a függvényre teljesüljön, hogy

3.103. $\forall x_1 \in [1,2] \wedge \forall x_2 \in [1,2] \quad f(x_1) = f(x_2)$

3.104. $\forall x_1 \in [1,2] \wedge \forall x_2 \in [1,2] \quad (x_1 > x_2 \implies f(x_1) > f(x_2))$

3.105. $\forall x_1 \in [1,2] \wedge \forall x_2 \in [1,2] \quad (x_1 > x_2 \implies f(x_1) \leq f(x_2))$

3.106. $\forall x_1 \in [1,2] \wedge \forall x_2 \in [1,2] \quad \exists c \in [x_1, x_2] \quad f(c) = \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2}$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

3.107. $\exists x_1 \in [1,2] \wedge \exists x_2 \in [1,2] \quad \forall x \in [1,2] \quad f(x) \neq \dfrac{f(x_1)+f(x_2)}{2}$

3.108. $\forall x_1 \in [1,2] \wedge \forall x_2 \in [1,2] \quad f\left(\dfrac{x_1+x_2}{2}\right) > \dfrac{f(x_1)+f(x_2)}{2}$

3.109. $\forall x_1 \in [1,2] \wedge \forall x_2 \in [1,2] \quad f\left(\dfrac{1}{4}x_1+\dfrac{3}{4}x_2\right) < \dfrac{1}{4}f(x_1)+\dfrac{3}{4}f(x_2)$

3.110. $\exists x_0 \in [1,2] \quad \forall x \in [1,2] \quad f(x) \leq f(x_0)$

3.111. $(\forall x_1 \in [1,2]\ \exists x_2 \in [1,2]\ f(x_1) < f(x_2)) \wedge (\forall x_1 \in [1,2]\ \exists x_2 \in [1,2]\ f(x_1) > f(x_2))$

3.112. Melyik függvény egy-egy értelmű ráképezés (bijekció) az egész számegyenesen?

(a) x **(b)** x^2

(c) x^3 **(d)** $\sqrt{x}$

(e) $\sqrt[3]{x}$ **(f)** $\sqrt{|x|}$

(g) $\dfrac{1}{x}$ **(h)** $f(x) = \begin{cases} 1/x & \text{ha } x \neq 0 \\ 0 & \text{ha } x = 0 \end{cases}$

3.113. Adjuk meg a következő függvények inverzeit! Rajzoljuk fel egy koordinátarendszerbe az inverz párokat!

(a) x^3 **(b)** x^3+1

(c) 2^x **(d)** 2^x-1

Adjunk meg olyan intervallumokat, ahol a függvény egy-egy értelmű (injekció)! Határozzuk meg a függvények inverzét ezeken az intervallumokon!

3.114. x^2 **3.115.** $\sqrt{x}$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

3.116. $\sin x$

3.117. 2^x

3.118. Keressünk olyan függvényeket, amelyek egyenlők az inverzükkel!

3.119. Mi a következő két állítás logikai kapcsolata, azaz melyikből következik a másik?

P: Az f függvény szigorúan monoton.
Q: Az f függvénynek van inverze.


3.120. Mutassuk meg, hogy az

$$f(x) = \begin{cases} x, \text{ ha } x \in \mathbb{Q} \\ -x \text{ ha } x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$


függvény semmilyen intervallumon sem monoton, de a függvénynek van inverze!

3.121. Keressünk inverz párokat a grafikonok között!

(a)




(b)



© Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó



3.122. Van-e olyan mindenütt értelmezett függvény, amelynek a grafikonja szimmetrikus az

(a) x tengelyre? **(b)** y tengelyre?

3.123. Mi a következő állítások logikai kapcsolata, azaz melyikből következik a másik?

© Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

P: Az f függvény monoton nő $\mathbb{R}$-en.
Q: Minden $x \in \mathbb{R}$ esetén $f(x+1) \geq f(x)$

3.124. Bizonyítsuk be, hogy az $f(x) = \dfrac{1}{x} + \dfrac{1}{x-1}$ függvény a $(0,1)$ intervallumban minden értéket pontosan egyszer vesz fel!

3.125. Bizonyítsuk be, hogy ha minden $x \in \mathbb{R}$ esetén $f(x+1) = \dfrac{1+f(x)}{1-f(x)}$, akkor az f függvény periodikus!

3.126. Tegyük fel, hogy az f függvény páros. Lehet-e f-nek inverze?


3.127. Tegyük fel, hogy az f függvény páratlan. Következik-e ebből, hogy f-nek van inverze?

3.128. Ábrázoljuk a következő f és g függvényeket! Határozzuk meg a $g \circ f$ függvényt! Igaz-e, hogy a g függvény az f függvény inverze?

$$f(x) = \begin{cases} x, & \text{ha } x < 0 \\ 1/2 & \text{ha } x = 0 \\ x+1 & \text{ha } x > 0 \end{cases} \qquad \text{és} \qquad g(x) = \begin{cases} x, & \text{ha } x < 0 \\ 0 & \text{ha } 0 \leq x < 1 \\ x-1 & \text{ha } x \geq 1 \end{cases}$$

3.2. A határérték

3.129. Az ábrán látható $f(x)$ függvény grafikonja alapján döntsük el, hogy léteznek-e az alábbi határértékek, és ha igen, adjuk meg ezt az értéket!




(a) $\lim\limits_{x \to 1} f(x)$ **(b)** $\lim\limits_{x \to 2} f(x)$ **(c)** $\lim\limits_{x \to 3} f(x)$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán


© Typotex Kiadó

3.130. Az ábrán látható $f(x)$ függvény grafikonja alapján döntsük el, hogy léteznek-e az alábbi határértékek, és ha igen, adjuk meg ezt az értéket!



(a) $\lim\limits_{x\to -2} f(x)$ **(b)** $\lim\limits_{x\to -1} f(x)$ **(c)** $\lim\limits_{x\to 0} f(x)$

3.131. Mely állítások igazak az ábrán látható $f(x)$ függvény grafikonja alapján?



(a) $\lim\limits_{x\to 0} f(x)$ létezik. **(b)** $\lim\limits_{x\to 0} f(x) = 0$ **(c)** $\lim\limits_{x\to 0} f(x) = 1$


(d) $\lim\limits_{x\to 1} f(x) = 1$ **(e)** $\lim\limits_{x\to 1} f(x) = 0$

(f) Az $f(x)$ függvénynek a $(-1, 1)$ nyílt intervallum minden pontjában van határértéke.

3.132. Mely állítások igazak az ábrán látható $f(x)$ függvény grafikonja alapján?

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó



(a) $\lim\limits_{x\to 2} f(x)$ nem létezik.


(b) $\lim\limits_{x\to 2} f(x) = 2$

(c) $\lim\limits_{x\to 1} f(x)$ nem létezik.

(d) Az $f(x)$ függvénynek a $(-1,1)$ nyílt intervallum minden pontjában van határértéke.

(e) Az $f(x)$ függvénynek az $(1,3)$ nyílt intervallum minden pontjában van határértéke.

3.133. Mely állítások igazak az ábrán látható $f(x)$ függvény grafikonja alapján?



(a) $\lim\limits_{x\to 1^+} f(x) = 1$

(b) $\lim\limits_{x\to 0^-} f(x) = 0$

(c) $\lim\limits_{x\to 0^-} f(x) = 1$

(d) $\lim\limits_{x\to 0^-} f(x) = \lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$

(e) $\lim\limits_{x\to 0} f(x)$ létezik.

(f) $\lim\limits_{x\to 0} f(x) = 0$

(g) $\lim\limits_{x\to 0} f(x) = 1$

(h) $\lim\limits_{x\to 1} f(x) = 1$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

(i) $\lim\limits_{x\to 1} f(x) = 0$ **(j)** $\lim\limits_{x\to 2^-} f(x) = 2$

(k) $\lim\limits_{x\to 1^-} f(x)$ nem létezik. **(l)** $\lim\limits_{x\to 2^+} f(x) = 0$

3.134. Írjuk fel logikai jelekkel az alábbi állításokat! Adjunk példát olyan függvényekre, amelyekre igazak az állítások!

(a) $\lim\limits_{x\to 3} f(x) = 4$ **(b)** $\lim\limits_{x\to 4} f(x) = \infty$ **(c)** $\lim\limits_{x\to 5} f(x) = -\infty$

(d) $\lim\limits_{x\to 3^+} f(x) = 4$ **(e)** $\lim\limits_{x\to 3^+} f(x) = \infty$ **(f)** $\lim\limits_{x\to 3^+} f(x) = -\infty$

(g) $\lim\limits_{x\to 3^-} f(x) = 4$ **(h)** $\lim\limits_{x\to 3^-} f(x) = \infty$ **(i)** $\lim\limits_{x\to 3^-} f(x) = -\infty$

(j) $\lim\limits_{x\to \infty} f(x) = 4$ **(k)** $\lim\limits_{x\to \infty} f(x) = \infty$ **(l)** $\lim\limits_{x\to \infty} f(x) = -\infty$

(m) $\lim\limits_{x\to -\infty} f(x) = 4$ **(n)** $\lim\limits_{x\to -\infty} f(x) = \infty$ **(o)** $\lim\limits_{x\to -\infty} f(x) = -\infty$

3.135. Keressük meg azokat a függvényeket, amelyeknek létezik és ugyanaz a határértéke 3-ban!

(a) 5 **(b)** 6

(c) $\begin{cases} 5, & \text{ha } x \neq 3 \\ 6, & \text{ha } x = 3 \end{cases}$ **(d)** $\begin{cases} 5, & \text{ha } x \in \mathbb{Q} \\ 6, & \text{ha } x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$

(e) $\dfrac{1}{(x-3)^2}$ **(f)** $\dfrac{1}{\cos(x-3)}$

(g) $\dfrac{1}{\sin(x-3)}$ **(h)** $\dfrac{1}{x-3}$

Határozzuk meg az alábbi határértékeket behelyettesítéssel!

3.136. $\lim\limits_{x\to 3} 5x$ **3.137.** $\lim\limits_{x\to 0} 5x$

3.138. $\lim\limits_{x\to 1/7} (7x-3)$ **3.139.** $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{-2}{7x-3}$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

3.140. $\lim\limits_{x\to -1} 3x^2(7x-3)$

3.141. $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{3x^2}{7x-3}$

3.142. $\lim\limits_{x\to \pi/2} x\sin x$

3.143. $\lim\limits_{x\to \pi} \dfrac{\cos x}{1-\pi}$

Határozzuk meg az alábbi határértékeket a törtek egyszerűsítése után!

3.144. $\lim\limits_{x\to 5} \dfrac{x-5}{x^2-25}$

3.145. $\lim\limits_{x\to -3} \dfrac{x+3}{x^2+4x+3}$

3.146. $\lim\limits_{x\to -5} \dfrac{x^2+3x-10}{x+5}$

3.147. $\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{x^2-7x+10}{x-2}$

3.148. $\lim\limits_{t\to 1} \dfrac{t^2+t-2}{t^2-1}$

3.149. $\lim\limits_{t\to -1} \dfrac{t^2+3t+2}{t^2-t-2}$

3.150. $\lim\limits_{x\to 9} \dfrac{\sqrt{x}-3}{x-9}$

3.151. $\lim\limits_{x\to 4} \dfrac{4x-x^2}{2-\sqrt{x}}$

3.152. $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{x-1}{\sqrt{x+3}-2}$

3.153. $\lim\limits_{x\to -1} \dfrac{\sqrt{x^2+8}-3}{x+1}$

3.154. $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{\sqrt{x}-1}{x-1}$

3.155. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sqrt{1+x^2}-1}{x^2}$

Határozzuk meg a következő trigonometrikus határértékeket!

3.156. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin x}{x}$

3.157. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1-\cos x}{x^2}$

3.158. $\lim\limits_{\vartheta\to 0} \dfrac{\sin(\vartheta\sqrt{2})}{\vartheta\sqrt{2}}$

3.159. $\lim\limits_{t\to 0} \dfrac{\sin kt}{t}$

3.160. $\lim\limits_{y\to 0} \dfrac{\sin 3y}{4y}$

3.161. $\lim\limits_{h\to 0} \dfrac{h}{\sin 3h}$

3.162. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{tg} 2x}{x}$

3.163. $\lim\limits_{t\to 0} \dfrac{2t}{\operatorname{tg} t}$

Határozzuk meg a következő határértékeket, ha léteznek!

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

3.164. $\lim\limits_{x\to 0} x\sin x$

3.165. $\lim\limits_{x\to 0} \sin\dfrac{1}{x}$

Határozzuk meg a következő függvények határértékeit a ∞-ben és a $-\infty$-ben!

3.166. $\dfrac{2x+3}{5x+7}$

3.167. $\dfrac{2x^2-7x+1}{\sqrt{x^2+1}+1}$

3.168. $\dfrac{2x^3-7x}{x^3+1}$

3.169. $\dfrac{2x+3}{5x^2+7}$

3.170. $\dfrac{2x^2-7x}{x^3+1}$

3.171. $\dfrac{x^{-1}+x^{-5}}{x^{-2}-x^{-3}}$

Határozzuk meg az alábbi függvények (véges illetve végtelen) határértékét a ∞-ben!

3.172. $\dfrac{2\sqrt{x}+x^{-1}}{3x-7}$

3.173. $\dfrac{2+\sqrt{x}}{2-\sqrt{x}}$

3.174. $\dfrac{2x^3-7x}{x^2+1}$

3.175. $\dfrac{2x^2-7x+1}{\sqrt{x^3+3}+7}$

3.176. $\dfrac{2x^2-7x+1}{\sqrt{x^4+1}+1}$

3.177. $\dfrac{\sqrt[3]{2x^2+1}+1}{\sqrt{x^2+1}+1}$

Számítsuk ki a következő féloldali határértékeket! Mindegyik feladatnál számoljuk ki a másik oldali határértéket is!

3.178. $\lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{1}{3x}$

3.179. $\lim\limits_{x\to 0^-} \dfrac{5}{2x}$

3.180. $\lim\limits_{x\to 2^-} \dfrac{3}{x-2}$

3.181. $\lim\limits_{x\to 3^+} \dfrac{1}{x-3}$

3.182. $\lim\limits_{x\to -8^+} \dfrac{2x}{x+8}$

3.183. $\lim\limits_{x\to -5^-} \dfrac{3x}{2x+10}$

3.184. $\lim\limits_{x\to 7^+} \dfrac{4}{(x-7)^2}$

3.185. $\lim\limits_{x\to 0^-} \dfrac{-1}{x^2(x+1)}$

Számítsuk ki a következő határértékeket!

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

3.186. $\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{\sin x}{x}$

3.187. $\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{e^x}{x}$

3.188. $\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{\ln x}{x}$

3.189. $\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{x^2}{e^x}$

Legyen k egy rögzített pozitív egész szám. Számítsuk ki a következő határértékeket:

3.190. $\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{x^k}{e^x}$

3.191. $\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{\ln x}{\sqrt[k]{x}}$

Van-e határértéke 0-ban a következő függvényeknek? Van-e féloldali határértékük ugyanitt?

3.192. $[x]$

3.193. $\{x\}$

3.194. $\begin{cases} 1, & \text{ha } x \in \mathbb{Q} \\ 0, & \text{ha } x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$

3.195. $\begin{cases} x, & \text{ha } x \in \mathbb{Q} \\ -x, & \text{ha } x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$

3.196. Mutassunk példát olyan mindenütt értelmezett függvényre, amelyiknek pontosan 2 pontban van határértéke!

3.197. Van-e olyan mindenütt értelmezett függvény, amelyiknek végtelen sok pontban végtelen a határértéke?

3.198. Bizonyítsuk be, hogy ha f nem konstans, periodikus függvény, akkor f-nek nincs határértéke végtelenben!

Van-e határértéke végtelenben a következő függvényeknek?

3.199. $[x]$

3.200. $\{x\}$

3.201. $\sin x$

3.202. $\operatorname{tg} x$

Mi a logikai kapcsolata a következő állításoknak, azaz melyikből következik a másik?

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

3.203. **P:** $\lim_{x\to\infty} f(x) = 5$ **Q:** $\lim_{x\to\infty} f^2(x) = 25$

3.204. **P:** $\lim_{x\to\infty} f(x) = -5$ **Q:** $\lim_{x\to\infty} |f(x)| = 5$

3.205. **P:** $\lim_{x\to\infty} f(x) = \infty$ **Q:** $\lim_{x\to\infty} \frac{1}{f(x)} = 0$

3.206. Van-e határértéke az

(a) $a_n = \sin(n\pi)$ sorozatnak?

(b) $f(x) = \sin x$ függvénynek végtelenben?

(c) $a_n = \left[\frac{1}{n}\right]$ sorozatnak?

(d) $f(x) = [x]$ függvénynek 0-ban?

Mi a logikai kapcsolata a következő állításoknak, azaz melyikből következik a másik?

3.207. **P:** Az $f(n)$ sorozat határértéke 5. **Q:** $\lim_{x\to\infty} f(x) = 5$.

3.208. **P:** Az $f\left(\frac{1}{n}\right)$ sorozat határértéke 5. **Q:** $\lim_{x\to 0} f(x) = 5$.

3.209. **P:** $\lim_{x\to\infty} (f(x) + g(x)) = \infty$
Q: $\lim_{x\to\infty} f(x)g(x) = \infty$

3.210. **P:** $\lim_{x\to\infty} (f(x) + g(x)) = \infty$
Q: $\lim_{x\to\infty} f(x) = \infty$ vagy $\lim_{x\to\infty} g(x) = \infty$

3.211. **P:** $\lim_{x\to\infty} f(x)g(x) = \infty$
Q: $\lim_{x\to\infty} f(x) = \infty$ vagy $\lim_{x\to\infty} g(x) = \infty$

3.212. Legyen f mindenütt értelmezett függvény! Mi a

P: $\lim_{x\to\infty} f(x) = 0$ **Q:** Az $f(n)$ sorozat határértéke 0

állítások logikai kapcsolata, azaz melyikből következik a másik, ha

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

(a) f tetszőleges? **(b)** f folytonos?

(c) f monoton? **(d)** f korlátos?

3.3. Folytonos függvények

3.213. Írjuk fel logikai jelekkel, hogy az f függvény folytonos 3-ban!

Mi a következő állítások logikai kapcsolata, azaz melyikből következik a másik?

3.214. **P:** Az f függvénynek van határértéke 3-ban.
Q: Az f függvény folytonos 3-ban.

3.215. **P:** Az f függvénynek nincs határértéke 3-ban.
Q: Az f függvény nem folytonos 3-ban.

3.216. Folytonosak-e 0-ban a következő függvények?

(a) $D(x) = \begin{cases} 1, & \text{ha } x \in \mathbb{Q} \\ 0, & \text{ha } x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$ **(b)** $f(x) = \begin{cases} x, & \text{ha } x \in \mathbb{Q} \\ -x, & \text{ha } x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$

3.217. Mutassunk példát olyan függvényre, amelyik pontosan 2 pontban folytonos!

3.218. Az $f, g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ függvények egy pontban eltérnek, mindenhol máshol megegyeznek. Lehet-e mindkét függvény mindenhol folytonos?

3.219. Tegyük fel, hogy az $f, g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ függvényeknek minden pontban van véges határértékük és a határértékek meg is egyeznek. Következik-e ebből, hogy $f = g$ mindenhol? Mi a helyzet akkor, ha f is, g is folytonos?

3.220. Mi a következő állítások logikai kapcsolata, azaz melyikből következik a másik?

P: Az f és g függvények folytonosak 3-ban.
Q: Az $f + g$ függvény folytonos 3-ban.

3.221. Tegyük fel, hogy f folytonos, g pedig nem folytonos 3-ban. Lehet-e

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

(a) $f+g$ **(b)** fg

folytonos 3-ban?

3.222. Tegyük fel, hogy sem f, sem g nem folytonos 3-ban. Következik-e ebből, hogy

(a) $f+g$ **(b)** fg

sem folytonos 3-ban?

3.223. Tegyük fel, hogy f is, g is folytonos 3-ban. Következik-ebből, hogy az $\frac{f}{g}$ függvény is folytonos 3-ban?

Hol folytonosak a következő függvények?

3.224. $\dfrac{x^2-4}{x+2}$ **3.225.** $\dfrac{x^3-1}{x-1}$

3.226. $\sqrt{x}$ **3.227.** $\sqrt[3]{x}$

3.228. Adjunk példát olyan $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ függvényre, amelyik sehol nem folytonos, de $|f|$ mindenütt folytonos!

Milyen c szám megadása esetén lesznek a következő függvények folytonosak a 0-ban?

3.229. $f(x)=\begin{cases} x^2+2 & \text{ha } x\geq 0 \\ mx+c & \text{ha } x<0 \end{cases}$

3.230. $f(x)=\begin{cases} \dfrac{\sin x}{x} & \text{ha } x\neq 0 \\ c & \text{ha } x=0 \end{cases}$

3.231. $f(x)=\begin{cases} x^3+x+1 & \text{ha } x>0 \\ ax^2+bx+c & \text{ha } x\leq 0 \end{cases}$

3.232. $f(x)=\begin{cases} \sqrt{x+2} & \text{ha } x\geq 0 \\ (x+c)^2 & \text{ha } x<0 \end{cases}$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

3.233. Bizonyítsuk be, hogy minden 3-adfokú polinomnak van valós gyöke!

3.234. Tegyük fel, hogy az f pozitív függvény folytonos $[a,b]$-ben. Bizonyítsuk be, hogy van olyan $c \in [a,b]$, amelyre igaz, hogy

(a) $f(c) = \dfrac{f(a)+f(b)}{2}$ **(b)** $f(c) = \sqrt{f(a)f(b)}$

3.235. Tegyük fel, hogy f folytonos $[a,b]$-ben, továbbá $f(a) \geq a$ és $f(b) \leq b$. Bizonyítsuk be, hogy van olyan $c \in [a,b]$, amire $f(c) = c$.

3.236. Tegyük fel, hogy f és g folytonosak $[a,b]$-ben, továbbá $f(a) \geq g(a)$ és $f(b) \leq g(b)$. Bizonyítsuk be, hogy van olyan $c \in [a,b]$, amire $f(c) = g(c)$.

3.237. Tegyük fel, hogy f és g folytonosak $[a,b]$-n, és minden $x \in [a,b]$ esetén $f(x) < g(x)$. Bizonyítsuk be, hogy van olyan $m > 0$ szám, hogy minden $x \in [a,b]$ esetén $g(x) - f(x) \geq m$.

3.238. Adjunk példát olyan $f : [0,1] \to \mathbb{R}$ függvényre, amely egy pont kivételével folytonos és

(a) nem korlátos.

(b) korlátos, de nincs legnagyobb értéke.

Mi a következő állításpárok logikai kapcsolata, azaz melyikből következik a másik?

3.239. **P:** f folytonos $[1,2]$-n **Q:** f-nek van maximuma és minimuma $[1,2]$-n

3.240. **P:** f folytonos $(1,2)$-n **Q:** f-nek van maximuma és minimuma $(1,2)$-n

3.241. **P:** f korlátos $(1,2)$-n **Q:** f-nek van maximuma és minimuma $(1,2)$-n

3.242. **P:** f korlátos $[1,2]$-n **Q:** f-nek van maximuma és minimuma $[1,2]$-n

Van-e olyan függvény, amelyik

3.243. nem folytonos $[0,1]$-en, de $[0,1]$-en van maximuma is és minimuma is?

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

3.244. folytonos $(0,1)$-en, és $(0,1)$-en van maximuma is és minimuma is?

3.245. folytonos $(0,1)$-en, de $(0,1)$-en nincs sem maximuma, sem minimuma?

3.246. folytonos $[0,1]$-en, de $[0,1]$-en nincs sem maximuma, sem minimuma?

Van-e maximuma a következő függvényeknek a $[77, 888]$ intervallumon?

3.247. $3^{x+5}\sin x + \sqrt{x}$

3.248. $\sin(2x) + \cos(3x)$

3.249. $[x]$

3.250. $\{x\}$

Jelölje $D(f)$ az f függvény értelmezési tartományát, $R(f)$ pedig az értékkészletét! Van-e olyan függvény, amelyikre igaz, hogy

3.251. $D(f) = (0,1)$ és $R(f) = [0,1]$

3.252. $D(f) = [0,1]$ és $R(f) = (0,1)$

3.253. $D(f) = [0,1]$ és $R(f) = [3,4] \cup [5,6]$

Van-e olyan monoton növő függvény, amelyikre igaz, hogy

3.254. $D(f) = (0,1)$ és $R(f) = [0,1]$

3.255. $D(f) = [0,1]$ és $R(f) = (0,1)$

3.256. $D(f) = [0,1]$ és $R(f) = [3,4] \cup [5,6]$

Van-e olyan folytonos függvény, amelyikre igaz, hogy

3.257. $D(f) = (0,1)$ és $R(f) = [0,1]$

3.258. $D(f) = [0,1]$ és $R(f) = (0,1)$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

3.259. $D(f) = [0,1]$ és $R(f) = [3,4] \cup [5,6]$

3.260. Bizonyítsuk be, hogy (korlátos) zárt intervallumon folytonos függvény értékkészlete (korlátos) zárt intervallum.

3.261. Bizonyítsuk be, hogy ha az f függvény folytonos $\mathbb{R}$-en, továbbá a határértéke végtelenben is, és mínusz végtelenben is nulla, akkor f korlátos!

3.262. Bizonyítsuk be, hogy ha az f függvény folytonos $\mathbb{R}$-en, továbbá a határértéke végtelenben is, és mínusz végtelenben is végtelen, akkor f-nek van minimuma!

3.263. Bizonyítsuk be, hogy az $x \sin x = 100$ egyenletnek végtelen sok gyöke van!

Hol folytonosak jobbról, hol folytonosak balról, illetve hol folytonosak a következő függvények?

3.264. $[x]$

3.265. $[-x]$

3.266. $[x] + [-x]$

3.267. $[x] - [-x]$

Hol folytonosak a következő függvények?

3.268. $$f(x) = \begin{cases} \cos \dfrac{1}{x}, & \text{ha } x \neq 0 \\ 0 & \text{ha } x = 0 \end{cases}$$

3.269. $$f(x) = \begin{cases} x \sin \dfrac{1}{x}, & \text{ha } x \neq 0 \\ 0 & \text{ha } x = 0 \end{cases}$$

Egyenletesen folytonosak-e a következő függvények az adott intervallumokban?

3.270. $f(x) = x^2$ $(-\infty, \infty)$, $[-2,2]$, $(-2,2)$

3.271. $f(x) = \dfrac{1}{x}$ $(0,\infty)$, $[1,2]$, $(1,2)$, $[1,\infty)$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

4. fejezet

A differenciálszámítás és alkalmazásai

4.1. Az f függvénynek pontosan akkor van érintője az a pontban, ha itt deriválható. Ekkor az érintő egyenlete

$$y = f'(a)(x - a) + f(a)$$

4.2. Ha az $f(x)$ függvény deriválható az a pontban, akkor a függvény folytonos az a pontban.
Ez a tétel nem fordítható meg: például az $f(x) = |x|$ függvény folytonos 0-ban, de itt nem deriválható!

4.3. Deriválási szabályok. Ha f és g deriválható a-ban, akkor

— tetszőleges $c \in \mathbb{R}$ esetén $c \cdot f$ deriválható a-ban és

$$(c \cdot f)'(a) = c \cdot f'(a);$$

— $f + g$ deriválható a-ban és

$$(f + g)'(a) = f'(a) + g'(a);$$

— $f \cdot g$ deriválható a-ban és

$$(f \cdot g)'(a) = f'(a) \cdot g(a) + f(a) \cdot g'(a);$$

— $g(a) \neq 0$ esetén $\dfrac{f}{g}$ deriválható a-ban, és

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(a) = \frac{f'(a) \cdot g(a) - f(a) \cdot g'(a)}{g^2(a)}.$$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

4.4. Láncszabály. Ha g deriválható a-ban, f deriválható $g(a)$-ban, akkor $f \circ g$ deriválható a-ban és

$$(f \circ g)'(a) = f'(g(a)) \cdot g'(a).$$

4.5. Inverz függvény deriváltja. Ha f folytonos és invertálható a körül, a-ban deriválható, és $f'(a) \neq 0$, akkor f^{-1} deriválható $f(a)$-ban és

$$(f^{-1})'(f(a)) = \frac{1}{f'(a)}.$$

4.6. Középértéktételek.

— **Rolle tétele.** Ha f folytonos az $[a, b]$ zárt intervallumon, deriválható az (a, b) nyílt intervallumon és $f(a) = f(b)$, akkor van olyan $c \in (a, b)$, amelyre $f'(c) = 0$.

— **Lagrange-középértéktétel.** Ha f folytonos az $[a, b]$ zárt intervallumon, deriválható az (a, b) nyílt intervallumon, akkor van olyan $c \in (a, b)$, amelyre

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

A tétel geometriai jelentése az, hogy minden húrhoz található vele párhuzamos érintő.

— **Cauchy-középértéktétel.** Ha f és g folytonos az $[a, b]$ zárt intervallumon, deriválható az (a, b) nyílt intervallumon, és $x \in (a, b)$ esetén $g'(x) \neq 0$, akkor van olyan $c \in (a, b)$, amelyre

$$\frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}.$$

— **Az integrálszámítás alaptétele.** Ha f és g folytonos az $[a, b]$ zárt intervallumon, deriválható az (a, b) nyílt intervallumon és $x \in (a, b)$ esetén $f'(x) = g'(x)$, akkor $f - g$ konstans függvény.

4.7. Darboux-tétel. Ha f deriválható (a, b)-ben, a-ban jobbról, b-ben balról deriválható, akkor az $f'(x)$ deriváltfüggvény minden $f'_+(a)$ és $f'_-(b)$ közötti értéket felvesz.

4.8. Monotonitás és derivált kapcsolata. Legyen $f(x)$ folytonos $[a, b]$-n és deriválható (a, b)-n.

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

— Az $f(x)$ függvény monoton nő $[a,b]$-n, akkor és csak akkor, ha minden $x \in (a,b)$ esetén $f'(x) \geq 0$.

— Ha minden $x \in (a,b)$ esetén $f'(x) > 0$, akkor $f(x)$ szigorúan monoton nő $[a,b]$-n.

Ez az állítás nem fordítható meg, például $f(x) = x^3$ szigorúan monoton nő de $f'(0) = 0$.

— Az $f(x)$ függvény szigorúan monoton nő $[a,b]$-n akkor és csak akkor, ha minden $x \in (a,b)$ esetén $f'(x) \geq 0$ és minden $a < c < d < b$ esetén $f'(x)$-nek csak véges sok gyöke van (c,d)-ben.

4.9. Lokális szélsőérték és a derivált kapcsolata. Tegyük fel, hogy $f(x)$ deriválható a-ban.

— Ha $f(x)$-nek lokális szélsőértéke (maximum vagy minimum) van a-ban, akkor $f'(a) = 0$.

— Ha $f(x)$ deriválható a egy környezetében, $f'(a) = 0$ és $f'(x)$ előjelet vált a-ban, akkor $f(x)$-nek lokális szélsőértéke van a-ban, mégpedig
  – lokális (szigorú) maximuma, ha a-tól balra $(f'(x) > 0)$ $f'(x) \geq 0$, és a-tól jobbra $(f'(x) < 0)$ $f'(x) \leq 0$,
  – lokális (szigorú) minimuma, ha a-tól balra $(f'(x) < 0)$ $f'(x) \leq 0$, és a-tól jobbra $(f'(x) > 0)$ $f'(x) \geq 0$.

— Ha $f(x)$ kétszer deriválható a-ban, $f'(a) = 0$ és $f''(a) \neq 0$, akkor $f(x)$-nek lokális szélsőértéke van a-ban, mégpedig
  – lokális szigorú maximuma, ha $f"(a) < 0$,
  – lokális szigorú minimuma, ha $f"(a) > 0$.

4.10. Konvexitás és a derivált kapcsolata. Tegyük fel, hogy $f(x)$ deriválható (a,b)-ben.

— $f(x)$ akkor és csak akkor (szigorúan) konvex (a,b)-n, ha $f'(x)$ (szigorúan) monoton növő (a,b)-n.

— $f(x)$ akkor és csak akkor (szigorúan) konkáv (a,b)-n, ha $f'(x)$ (szigorúan) monoton csökken (a,b)-n.

— $f(x)$-nek a $c \in (a,b)$ **inflexiós pontja** akkor és csak akkor, ha $f'(x)$-nek c-ben lokális szélsőértéke van.

4.11. L'Hospital szabály. Tegyük fel, hogy f és g deriválható a egy pontozott környezetében, f-nek és g-nek van határértéke a-ban és vagy mindkét

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

határérték 0 vagy mindkét határérték ∞, azaz a két függvény hányadosának határértéke kritikus. Ekkor **ha létezik** a $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f'(x)}{g'(x)}$ határérték, **akkor létezik** a $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)}{g(x)}$ határérték is, és

$$\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to a}\frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

A fenti tétel a (pontozott) környezet értelemszerű módosításával érvényes marad akkor is, ha a határértéket valamelyik végtelenben, illetve valamelyik oldalról vizsgáljuk.

4.1. A derivált fogalma

4.1. Számítsuk ki a definíció szerint $\sqrt{x}$ és $\sqrt[3]{x}$ differenciálhányadosát az $x=a$ pontban! Hol van értelmezve, hol folytonos és hol differenciálható a $\sqrt{x}$ és a $\sqrt[3]{x}$ függvény? Adjuk meg a deriváltfüggvényeket!

4.2. Tegyük fel, hogy

$$\lim_{x\to 3}\frac{f(x)-f(3)}{x-3}=4.$$

Következik-e ebből, hogy az f függvény folytonos 3-ban?

4.3. Tegyük fel, hogy az f függvény folytonos 3-ban. Következik-e ebből, hogy a

$$\lim_{x\to 3}\frac{f(x)-f(3)}{x-3}$$

határérték létezik és véges?

Számítsuk ki a következő határértékeket!

4.4. $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{(x+h)^2-x^2}{h}$

4.5. $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{\sqrt{x+h}-\sqrt{x}}{h}$

4.6. $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{1/(x+h)-1/x}{h}$

4.7. $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{(x+h)^3-x^3}{h}$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

4.8. $\lim\limits_{x\to x_0} \dfrac{x^2 - x_0^2}{x - x_0}$

4.9. $\lim\limits_{x\to x_0} \dfrac{\sqrt{x} - \sqrt{x_0}}{x - x_0}$

4.10. $\lim\limits_{x\to x_0} \dfrac{1/x - 1/x_0}{x - x_0}$

4.11. $\lim\limits_{x\to x_0} \dfrac{x^3 - x_0^3}{x - x_0}$

Hol folytonosak, és hol differenciálhatók a következő függvények?

4.12. $|x|$

4.13. $|x^3|$

4.14. $|x^2 - 1|$

4.15. $|\sqrt[3]{x}|$

Milyen *b* és *c* esetén lesznek a következő függvények differenciálhatók 3-ban? Adjuk meg a deriváltakat!

4.16. $f(x) = \begin{cases} x & \text{ha } x \geq 3 \\ bx^2 - c & \text{ha } x < 3 \end{cases}$

4.17. $g(x) = \begin{cases} x^2 & \text{ha } x \leq 3 \\ b - cx & \text{ha } x > 3 \end{cases}$

4.18. $h(x) = \begin{cases} (1-x)(2-x) & \text{ha } x \geq -3 \\ bx + c & \text{ha } x < -3 \end{cases}$

Hol differenciálhatók a következő függvények? Hol folytonosak a deriváltfüggvények?

4.19. $f(x) = \begin{cases} x \sin \dfrac{1}{x} & \text{ha } x \neq 0 \\ 0 & \text{ha } x = 0 \end{cases}$

4.20. $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \dfrac{1}{x} & \text{ha } x \neq 0 \\ 0 & \text{ha } x = 0 \end{cases}$

4.21. $f(x) = |x^3|$

4.22. $f(x) = \{x\} \sin \pi x$

4.23. $f(x) = [x] \sin^2 \pi x$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

4.24. $f(x) = \begin{cases} -x^2 & \text{ha } x \le 0 \\ x^2 & \text{ha } x > 0 \end{cases}$


4.25. $f(x) = \begin{cases} 1-x & \text{ha } x < 1 \\ (1-x)(2-x) & \text{ha } 1 \le x \le 2 \\ -(2-x) & \text{ha } 2 < x \end{cases}$

4.26. $f(x) = \left(\{x\} - \frac{1}{2}\right)^2$, ahol $\{x\}$ az x törtrészét jelöli.


4.27. $f(x) = [x] \sin \pi x$, ahol $[x]$ az x egészrészét jelöli.

4.28. Melyik grafikon az $f(x) = \sin^2 x$ függvényé és melyik a $g(x) = |\sin x|$ függvényé?

(a)



(b)



Határozzuk meg a következő függvények első, második, . . . , n-edik deriváltját!

4.29. x^6 **4.30.** $\frac{1}{x}$ **4.31.** $\sin x$ **4.32.** $\cos x$

4.2. Deriválási szabályok

Mi a következő állítások logikai kapcsolata, azaz melyikből következik a másik?

4.33. **P:** Az f függvény páros. **Q:** f' páratlan.

4.34. **P:** Az f függvény páratlan. **Q:** f' páros.

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

Tegyük fel, hogy az f függvény differenciálható. Mi a következő állítások logikai kapcsolata, azaz melyikből következik a másik?

4.35. **P:** Az f függvény periodikus. **Q:** Az f' függvény periodikus.

4.36. **P:** $\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = 0$ **Q:** $\lim\limits_{x\to\infty} f'(x) = 0$

4.37. **P:** $\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = \infty$ **Q:** $\lim\limits_{x\to\infty} f'(x) = \infty$

4.38. **P:** f differenciálható a-ban **Q:** $\lim\limits_{h\to 0} \dfrac{f(a+h) - f(a-h)}{2h}$ létezik.

Keressük meg azokat a helyeket, ahol a $\sin x$ függvény érintője párhuzamos az

4.39. x tengellyel;

4.40. az $y = x$ egyenessel.

4.41. Adjuk meg $\cos x$ grafikonjának $x = \dfrac{\pi}{3}$ pontbeli érintőjét!

4.42. Írjuk fel az $f(x) = x^3 - 2x^2 + 3x + 4$ függvény érintőjének az egyenletét az $(1; 6)$ pontban!

4.43. Hol vízszintes a $2x^3 - 6x^2 + 8$ függvény grafikonjának az érintője?

4.44. Adjuk meg $2x^3 - 6x^2 + 8$ grafikonjának azokat az érintőit, amelyek az x-tengellyel 45 fokos, illetve 30 fokos szöget zárnak be!

4.45. Milyen szögben metszi az x^2 függvény grafikonja az $y = 2x$ egyenest, azaz mekkora a közös pontokban az érintő és az egyenes szöge?

4.46. Bizonyítsuk be, hogy az $x^2 - y^2 = a$ és $xy = b$ görbék merőlegesen metszik egymást, azaz a metszéspontokban az érintők merőlegesek.


4.47. Hol függőleges az érintője a $\sqrt[3]{\sin x}$ függvény grafikonjának?

4.48. A következő két ábra egyikén a $\operatorname{tg} x$, a másikon az x^3 függvény szerepel. Melyik rajzhoz melyik függvény tartozik?


www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

(a)



(b)



4.49. Egy autó út – idő függvényét az $s(t) = 3t^2 + 5t + 8$ függvény adja meg. Határozzuk meg az autó pillanatnyi sebességét a $t = 3$ pillanatban! Adjuk meg az autó sebesség – idő függvényét!

4.50. Egy autó sebesség – idő függvényét a $v(t) = 5t + 3$ függvény adja meg. Határozzuk meg az autó pillanatnyi gyorsulását a $t = 7$ pillanatban! Adjuk meg az autó gyorsulás – idő függvényét!

4.51. Egy rezgő test kitérés – idő függvénye: $y(t) = 5 \sin\, t$. Adjuk meg a test sebesség – idő függvényét! Adjuk meg a test gyorsulás – idő függvényét!

Határozzuk meg a következő függvények értelmezési tartományát! Deriváljuk a következő függvényeket, és határozzuk meg a deriváltak értelmezési tartományát!

4.52. $3x^8 - \frac{3}{4}x^6 + 2$

4.53. $\frac{5x+3}{2x-1}$

4.54. $x + \frac{1}{x} + \sqrt{x}$

4.55. $3x^2 - \frac{\sqrt[3]{x}}{5} + 7$

4.56. $\sqrt{x\sqrt{x\sqrt{x}}}$

4.57. $\sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}}$

4.58. $4 \sin x$

4.59. $\frac{\sin x + \cos x}{3}$

4.60. $\sin\left(x^{22}\right)$

4.61. $(\sin x)^{22}$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

4.62. $\dfrac{\sin x - x\cos x}{\cos x + x\sin x}$

4.63. $4x^3\,\mathrm{tg}(x^2+1)$

4.64. $\dfrac{\sin x}{\cos x}$

4.65. $\sin\dfrac{1}{x}$

4.66. $x\sin x$

4.67. $(3x^5+1)\cos\ x$

4.68. x^x

4.69. $\sqrt[x]{x}$

4.70. x^{-x}

4.71. $e^{\sqrt{x}}$

4.72. $\sqrt[x]{x^2+1}$

4.73. e^{-3x^2}

4.74. $\log_4 x$

4.75. $\log_x 4$

4.76. $\ln(\ln x)$

4.77. $\dfrac{1}{2}\ln\dfrac{x+1}{x-1}$

4.78. $\ln\left(x+\sqrt{x^2+1}\right), \quad (x>1)$

4.79. $\ln\left(e^x+\sqrt{1+e^{2x^2}}\right)$

4.80. $4\,\mathrm{sh}\,x$

4.81. $\dfrac{\mathrm{sh}\,x+\mathrm{ch}\,x}{3}$

4.82. $\mathrm{sh}\left(x^{22}\right)$

4.83. $(\mathrm{sh}\,x)^{22}$

4.84. $\dfrac{\mathrm{sh}\,x - x\,\mathrm{ch}\,x}{\mathrm{ch}\,x + x\,\mathrm{sh}\,x}$

4.85. $4x^3\,\mathrm{th}(x^2+1)$

4.86. $\dfrac{\mathrm{sh}\,x}{\mathrm{ch}\,x}$

4.87. $\mathrm{sh}\,\dfrac{1}{x}$

4.88. $x\,\mathrm{sh}\,x$

4.89. $(3x^5+1)\,\mathrm{ch}\,x$

4.90. $\log_3 x\cdot\cos x$

4.91. $\dfrac{\sin x + 2\ln x}{\sqrt{x}+1}$

4.92. $\dfrac{x^2e^x - 3^x\ln x + \cos\pi}{x^2+1}$

4.93. $\ln\left(\sin x+\cos^2 x\right)$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

4.94. $\dfrac{\cos(3^x)+5}{\ln(\sin x)+x^2}$

4.95. $(\sin x)^{\cos x}$

4.96. $\ln(\sin x)$

4.97. $x^{\operatorname{tg} x}$

Mutassuk meg, hogy a következő függvények invertálhatóak egy alkalmas intervallumon, és számítsuk ki az inverz deriváltját a megadott helyen!

4.98. $x+\sin x, \quad a=1+\pi/2$

4.99. $3x^3+x, \quad a=4$

4.100. $f(x)=x^5+x^2\ (x>0), \quad a=2$

4.101. $-2x^3+\sqrt{x}, \quad a=-1$

Határozzuk meg a következő trigonometrikus függvények inverzeinek a deriváltját!

4.102. $\arcsin x$

4.103. $\arccos x$

4.104. $\operatorname{arctg} x$

4.105. $\operatorname{arcctg} x$

Hol deriválható és mi a deriváltja a következő függvényeknek?

4.106. $\arcsin(\cos x)$

4.107. $\sin(\arccos x)$

4.108. $\operatorname{arctg}(\sin x)$

4.109. $\operatorname{tg}(\arcsin x)$

4.110. $\operatorname{arsh}(\operatorname{ch} x)$

4.111. $\operatorname{sh}(\operatorname{arch} x)$

4.112. $\operatorname{arth}(\operatorname{sh} x)$

4.113. $\operatorname{th}(\operatorname{arsh} x)$

Számítsuk ki a következő határértékeket, ha léteznek!

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

4.114. $\lim\limits_{x\to\pi/6} \dfrac{2\sin x - 1}{6x - \pi}$

4.115. $\lim\limits_{x\to\pi/2} \dfrac{\sin x - 2/(\pi x)}{\cos x}$

4.116. $\lim\limits_{x\to\pi/2} \dfrac{\cos x}{x - \pi/2}$

4.117. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^x - 1}{x}$

Számítsuk ki a következő sorozatok határértékét, ha léteznek!

4.118. $\lim\limits_{n\to\infty} n\left(\sqrt{\dfrac{n+1}{n}} - 1\right)$

4.119. $\lim\limits_{n\to\infty} n\left(\cos\dfrac{1}{n} - 1\right)$

4.120. $\lim\limits_{n\to\infty} ne^{1/n} - 1$

4.121. $\lim\limits_{n\to\infty} n^2 \sin\dfrac{1}{n}\left(\sqrt[n]{e} - 1\right)$

Számoljuk ki a következő függvények második deriváltját:

4.122. $x^3 + 2x^2 + x + 1$

4.123. $e^{\sin x}$

4.124. $\ln\cos x$

4.125. $\operatorname{arctg}\dfrac{1}{x}$

4.3. Középértéktételek, L'Hospital szabály

4.126. Van-e olyan függvény, amelyiknek a deriváltja a $[-3, 5]$ intervallumon $[x]$, azaz x egész része?

4.127. Van-e olyan függvény, amelyiknek a deriváltja nem folytonos?

4.128. Legyen $f(x) = \operatorname{arctg} x$, $\quad g(x) = \operatorname{arctg}\dfrac{1+x}{1-x}$ és $h(x) = f(x) - g(x)$. Bizonyítsuk be, hogy $h'(x) = 0$. Következik-e ebből, hogy $h(x)$ konstans függvény? Számítsuk ki $h(0)$-t, és a $\lim\limits_{x\to\infty} h(x)$ határértéket! Magyarázzuk meg az eredményt!

4.129. Tegyük fel,hogy f és g differenciálható függvények, továbbá $f(0) \geq g(0)$, és hogy minden $x \in \mathbb{R}$ esetén $f'(x) > g'(x)$. Bizonyítsuk be, hogy ekkor $f(x) > g(x)$, ha $x > 0$.

Hány gyöke van a következő egyenleteknek?

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

4.130. $x^3 + 2x + 4 = 0$

4.131. $x^5 - 5x + 2 = 0$

4.132. $e^x = 2x + 2$

4.133. $\sin x = \dfrac{x}{2}$

Számítsuk ki a következő határértékeket!

4.134. $\lim\limits_{x\to\infty} x\left(\dfrac{\pi}{2} - \operatorname{arctg} x\right)$

4.135. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{x}{\ln(1+x)}$

4.136. $\lim\limits_{x\to\pi/2} \dfrac{1-\sin x}{1+\cos 2x}$

4.137. $\lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{x}{\sin\sqrt{x}}$

4.138. $\lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{\ln x}{\operatorname{ctg} x}$

4.139. $\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{x+\ln x}{x+1}$

4.140. $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{x+1}{e^{-x}}$

4.141. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin x - x}{\operatorname{tg} x - x}$

4.142. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{x\operatorname{ctg} x - 1}{x^2}$

4.143. $\lim\limits_{x\to 0} \left(\operatorname{ctg} x - \dfrac{1}{x}\right)$

4.144. $\lim\limits_{x\to 0} (1+x)^{1/x}$

4.145. $\lim\limits_{x\to 0} \left(\dfrac{\sin x}{x}\right)^{1/x^2}$

4.146. $\lim\limits_{x\to 0} \left(\dfrac{1+e^x}{2}\right)^{\operatorname{ctg} x}$

4.147. $\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{x^3+x^2+1}{e^x}$

4.148. $\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{\ln x}{\sqrt{x}}$

4.149. $\lim\limits_{x\to\infty} x\sin\dfrac{1}{x+1}$

4.150. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{ch} x - \cos x}{x^2}$

4.151. $\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{1+\operatorname{arctg} x}{\operatorname{sh} x + \operatorname{ch} x}$

4.152. Számoljuk ki a $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin x}{x+1}$ határértéket!

Megoldás: A L'Hospital-szabály alkalmazásával:

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x+1} = \lim_{x\to 0} \frac{\cos x}{1} = 1$$

Mi a hiba?

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

4.153. Számoljuk ki a $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{x+1}{2x+2}$ határértéket!

Megoldás: A L'Hospital-szabály alkalmazásával:

$$\lim_{x\to 0} \frac{x+1}{2x+2} = \lim_{x\to 0} \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

Mi a hiba?

4.154. Számoljuk ki a $\lim\limits_{x\to \infty} \dfrac{\sin x}{x}$ határértéket!

Megoldás: A L'Hospital-szabály alkalmazásával:

$$\lim_{x\to \infty} \frac{\sin x}{x} = \lim_{x\to \infty} \frac{\cos x}{1} = \lim_{x\to \infty} \cos x.$$

Ez a határérték nem létezik.

Mi a hiba?

4.4. Szélsőértékkeresés

Határozzuk meg következő függvények abszolút szélsőértékeit a megadott intervallumokon!

4.155. $x^3 - 12x \qquad [-10; 3], \quad [0; 3]$

4.156. $x^3 + 2x^5 \qquad [-1, 4], \quad [2, 5], \quad [-7, 3]$

4.157. A vékony lencsék leképezési törvénye szerint

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{t} + \frac{1}{k},$$

ahol f a lencse fókusztávolsága, t a tárgy távolsága a lencsétől és k a képtávolság. Adott f fókusztávolság esetén mennyi legyen a tárgytávolság, hogy $t + k$ maximális, illetve minimális legyen?

4.158. A ferde hajításnál a földről α szögben v_0 kezdősebességgel kilőtt test a kilövés helyétől

$$\frac{2v_0^2}{g} \sin\alpha \cos\alpha$$

távolságra ér földet, ha a közegellenállástól eltekintünk. Milyen szögben lőjük ki a testet, hogy a lehető legmesszebb repüljön?

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

4.159. Az egyenlő szárú derékszögű háromszögbe írható téglalapok közül melyiknek a területe a legnagyobb? Na és melyiknek a kerülete a legnagyobb?

Itt **beírt téglalapon** olyan téglalapot értünk, amelynek két szomszédos csúcsa az átfogón, a többi csúcsa a befogókon van.

4.160. Határozzuk meg egy adott a alkotójú egyenes körkúp alapkörének R sugarát és m magasságát úgy, hogy a kúp térfogata maximális legyen!

4.161. A 16cm^2 területű téglalapok közül melyiknek a kerülete minimális? Mekkorák ennek az oldalai?

4.162. A 8 egység kerületű téglalapok közül miért a négyzetnek legnagyobb a területe?

4.163. Legfeljebb mekkora lehet a derékszögű háromszög területe, ha az egyik befogójának és az átfogójának az összege 10 cm?

4.164. Egy téglalap egyik oldala az x tengelyen fekszik, két felső csúcsa pedig az $y = 12 - x^2$ parabolán. Mikor maximális a területe egy ilyen téglalapnak?

4.165. 8 x 15 dm-es kartonlapból téglalap alakú, nyitott dobozt készítünk úgy, hogy a kartonlap sarkaiból egybevágó négyzeteket vágunk ki, majd felhajtjuk az oldalakat. Milyenek legyenek a doboz méretei, ha azt szeretnénk elérni, hogy a lehető legnagyobb legyen a térfogata? Mekkora lesz a maximális térfogat?

4.166. Hozzunk létre egy háromszöget a koordináta-rendszer első síknegyedében úgy, hogy az x-, illetve y-tengely $(a, 0)$, $(0, b)$ koordinátájú pontjait egy 20 egység hosszú egyenes szakasszal összekötjük. Mutassuk meg, hogy a közbezárt háromszög területe akkor lesz a legnagyobb, ha $a = b$.

4.167. Egy farmon az állatok számára el kell keríteni egy téglalap alakú karámot. A területet egyik oldalról folyó határolja, a másik három oldalon egyszálas vezetéket kell kifeszíteni, amelybe aztán áramot vezetnek. A rendelkezésre álló 800 méternyi vezetékkel mekkora területet lehet elkeríteni, és milyen méretű lesz a maximális területű karám?

4.168. Határozzuk meg egy adott V térfogatú egyenes körhenger alapkörének R sugarát és m magasságát úgy, hogy a henger felszíne minimális legyen!

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

4.169. Egy borsóültetvény 216 m^2-es téglalap alakú részét be kell keríteni, majd a kerítés egyik oldalával párhuzamosan két egyenlő részre kell osztani. Mekkorák legyenek a külső téglalap oldalai, hogy a lehető legkevesebb kerítésfonatot kelljen felhasználni? Milyen hosszú kerítésre van szükség?

4.170. Egy függőlegesen mozgó test magasságát az

$$s = -4,9t^2 + 30t + 34$$

függvény adja meg, ahol s-t méterben, t-t másodpercben mérjük. Mekkora lesz

(a) a test sebessége a $t = 0$ időpontban;

(b) a legnagyobb magassága, és mikor éri azt el;

(c) a sebessége, amikor $s = 0$?

4.171. Janka a parttól 3 kilométerre egy csónakban ül, és szeretne eljutni a tőle légvonalban 5 kilométerre lévő part menti faluba. 2 km/h sebességgel tud evezni és 5 km/h sebességgel gyalogolni. Hol szálljon ki a csónakból, hogy a lehető legrövidebb idő alatt érjen a faluba?

4.172. Két részecske helyzetét az s-tengelyen az $s_1 = \cos t$ és $s_2 = \cos(t + \pi/4)$ függvények írják le.

(a) Mekkora a részecskék legnagyobb távolsága?

(b) Mikor ütköznek össze?

4.5. Függvényvizsgálat

Tegyük fel, hogy f differenciálható $\mathbb{R}$-en. Mi a következő állítások logikai kapcsolata, azaz melyikből következik a másik?

4.173. **P:** $f'(a) = 0$ **Q:** f-nek lokális szélsőértéke van a-ban

4.174. **P:** $f'(a) \neq 0$ **Q:** f-nek nincs lokális szélsőértéke a-ban

4.175. **P:** $f'(x) \geq 0$ $(3,5)$-ben **Q:** f monoton nő $(3,5)$-ben

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

4.176. **P:** $f'(x) > 0 \quad (3,5)$-ben **Q:** f szigorúan monoton nő $(3,5)$-ben

Tegyük fel, hogy f kétszer differenciálható $\mathbb{R}$-en. Mi a következő állítások logikai kapcsolata, azaz melyikből következik a másik?

4.177. **P:** $f''(a) > 0$ **Q:** f-nek lokális minimuma van a-ban

4.178. **P:** $f'(a) = 0$ és $f''(a) > 0$ **Q:** f-nek lokális minimuma van a-ban

4.179. **P:** $f''(a) = 0$ **Q:** f-nek inflexiós pontja van a-ban

4.180. **P:** $f''(a) = 0$ **Q:** f-nek inflexiós pontja vagy lokális szélsőértéke van a-ban

4.181. **P:** $f''(x) \geq 0 \quad (3,5)$-ben **Q:** f konvex $(3,5)$-ben

4.182. **P:** $f''(x) > 0 \quad (3,5)$-ben **Q:** f szigorúan konvex $(3,5)$-ben

Milyen intervallumokon növekszik, illetve csökken, hol van lokális szélsőértéke a következő függvényeknek?

4.183. $f(x) = -x^2 - 3x + 23$

4.184. $f(x) = 2x^3 - 18x + 23$

4.185. $f(x) = x^4 - 4x^3 + 4x^2 + 23$

4.186. $f(x) = x\sqrt{9 - x^2}$

4.187. $f(x) = x^2\sqrt{5 - x}$

4.188. $f(x) = \dfrac{x^2 - 9}{x - 2}$

Keressük meg a következő függvények lokális szélsőértékeit, és határozzuk meg a típusaikat!

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

4.189. $y = xe^{-x}$

4.190. $y = 2 + x - x^2$

4.191. $y = x^3 - 6x^2 + 9x - 4$

4.192. $y = x + \sin x$

Végezzük el a következő függvények teljes függvényvizsgálatát!

4.193. $f(x) = x + \frac{1}{x}$

4.194. $f(x) = x - \frac{1}{x^2}$

4.195. $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$

4.196. $f(x) = \frac{x}{1+x^2}$

4.197. $f(x) = \frac{x+1}{1+x^2}$

4.198. $f(x) = \frac{x^3}{x^2+1}$

4.199. $f(x) = \frac{x^3}{x^2-1}$

4.200. $f(x) = x + \frac{2x}{x^2-1}$

4.201. $f(x) = \frac{1}{x^2} - \frac{1}{(x-1^2)}$

4.202. $f(x) = \frac{x\sqrt{1-x}}{1+x}$

Ábrázoljuk a következő függvényeket!

4.203. $f(x) = 6 - 2x - x^2$

4.204. $f(x) = x^3 - 3x + 3$

4.205. $f(x) = x(6-2x)^2$

4.206. $f(x) = 1 - 9x - 6x^2 - x^3$

4.207. $f(x) = (x-2)^3 + 1$

4.208. $f(x) = 1 - (x+1)^3$

4.6. Elemi függvények

Végezzük el a következő függvények teljes függvényvizsgálatát!

4.209. $x^{2n}, \quad n \in \mathbb{N}^+$

4.210. $x^{2n+1}, \quad n \in \mathbb{N}^+$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

4.211. $x^{-2n}, \quad n \in \mathbb{N}^+$

4.212. $x^{-(2n+1)}, \quad n \in \mathbb{N}^+$

4.213. $\sqrt[2n]{x}, \quad n \in \mathbb{N}^+$

4.214. $\sqrt[2n+1]{x}, \quad n \in \mathbb{N}^+$

4.215. $a^x, \quad (a > 1)$

4.216. $a^x, \quad (0 < a < 1)$

4.217. $\log_a x, \quad (a > 1)$

4.218. $\log_a x, \quad (0 < a < 1)$

4.219. $\sin x$

4.220. $\operatorname{tg} x$

4.221. $\arcsin x$

4.222. $\operatorname{arctg} x$

4.223. $\operatorname{sh} x = \dfrac{e^x - e^{-x}}{2}$

4.224. $\operatorname{ch} x = \dfrac{e^x + e^{-x}}{2}$

4.225. $\operatorname{arsh} x$

4.226. $\operatorname{arch} x$

Számítsuk ki a következő értékeket!

4.227. $2^{\frac{\ln 100}{\ln 2}}$

4.228. $\left(\dfrac{1}{9}\right)^{-\log_3 7}$

4.229. $\arcsin \dfrac{\sqrt{3}}{2}$

4.230. $\operatorname{arctg}(-1)$

4.231. $\arccos(\cos(9\pi))$

4.232. $\sin\left(\arcsin \dfrac{1}{3}\right)$

4.233. $\operatorname{tg}(\operatorname{arctg} 100)$

4.234. $\arcsin(\sin 3)$

Periodikusak-e a következő függvények? Ha igen, adjunk meg egy periódust!

4.235. $\operatorname{tg}(10x)$

4.236. $\operatorname{ctg}(\pi x)$

4.237. $\sin \dfrac{x}{5}$

4.238. $\cos \dfrac{x}{2} + \operatorname{tg} \dfrac{x}{3}$


www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó


4.239. A következő függvények közül ábrázoltunk néhányat, keressük meg a grafikonokhoz tartozó képleteket!

$$\operatorname{sh} x, \quad \operatorname{ch} x, \quad e^x, \quad e^{-x}, \quad \log_3 x, \quad \log_{0,5} x, \quad \ln(-x), \quad x^3, \quad x^{-3}$$


(a)




(b)




(c)




(d)



(e)



(f)



www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán


© Typotex Kiadó

4.240. A következő függvények közül ábrázoltunk néhányat, keressük meg a grafikonokhoz tartozó képleteket!


$$\sin x, \quad \cos 2x, \quad 2\sin x, \quad \sin(x-2), \quad -\cos x,$$

$$\operatorname{tg} x, \quad \operatorname{ctg} x, \quad \sin^2 x, \quad |\cos x|$$


(a)




(b)




(c)




(d)



(e)



(f)




4.241. A következő függvényeket ábrázoltuk, keressük meg a grafikonokhoz tartozó képleteket!

$$\arcsin x, \quad \arccos x, \quad \operatorname{arctg} x, \quad \operatorname{arcctg} x$$

$$\sin(\arcsin x), \quad \arcsin(\sin x), \quad \operatorname{tg}(\operatorname{arctg} x), \quad \operatorname{arctg}(\operatorname{tg} x)$$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó




4.242. A következő függvényeket ábrázoltuk, keressük meg a grafikonokhoz tartozó képleteket!

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán


© Typotex Kiadó

$\sin(\arccos x)$, $\arccos(\sin x)$, $\cos(\arcsin x)$, $\arcsin(\cos x)$
$\operatorname{tg}(\operatorname{arcctg} x)$, $\operatorname{arcctg}(\operatorname{tg} x)$, $\operatorname{ctg}(\operatorname{arctg} x)$, $\operatorname{arctg}(\operatorname{ctg} x)$


(a)




(b)




(c)




(d)




(e)




(f)



(g)



(h)



www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

5. fejezet
Az egyváltozós Riemann-integrál

5.1. Alapintegrálok

$$\int x^\alpha\,dx = \frac{1}{\alpha+1}x^{\alpha+1}+C \quad (\alpha \neq -1) \qquad \int \frac{1}{x}\,dx = \ln|x|+C$$

$$\int a^x\,dx = \frac{1}{\ln a}\,a^x + C \quad (a \neq 1) \qquad \int e^x\,dx = e^x + C$$

$$\int \cos x\,dx = \sin x + C \qquad \int \sin x\,dx = -\cos x + C$$

$$\int \frac{1}{\cos^2 x}\,dx = \operatorname{tg} x + C \qquad \int \frac{1}{\sin^2 x}\,dx = -\operatorname{ctg} x + C$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\,dx = \arcsin x + C \qquad \int \frac{1}{1+x^2}\,dx = \operatorname{arctg} x + C$$

$$\int \operatorname{ch} x\,dx = \operatorname{sh} x + C \qquad \int \operatorname{sh} x\,dx = \operatorname{ch} x + C$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}\,dx = \operatorname{arsh} x + C \qquad \int \frac{1}{\sqrt{x^2-1}}\,dx = \operatorname{arch} x + C$$

5.2. Integrálási szabályok

— Ha f-nek és g-nek van primitív függvénye, akkor $f+g$-nek és $c\cdot f$-nek is van, nevezetesen

$$\int (f+g) = \int f + \int g, \qquad \int c\cdot f = c\int f$$

— Ha F primitív függvénye f-nek, akkor minden $a, b \in \mathbb{R},\ a \neq 0$ esetén

$$\int f(ax+b)\,dx = \frac{1}{a}F(ax+b)+C$$

© Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

— Ha f deriválható és mindenütt pozitív, akkor

$$\int f^\alpha(x) f'(x)\,dx = \frac{f^{\alpha+1}(x)}{\alpha+1} + C \quad (\alpha \neq -1)$$

— Ha f deriválható, és sehol sem nulla, akkor

$$\int \frac{f'(x)}{f(x)}\,dx = \ln|f(x)| + C$$

— **Parciális integrálás:**

Ha f és g deriválható, és fg'-nek van primitív függvénye, akkor $f'g$-nek is, és

$$\int f'g = fg - \int fg'$$

— **Integrálás helyettesítéssel:**

Ha $g(x)$ deriválható, $f(y)$ értelmezett $g(x)$ értékkészletén, és itt van primitív függvénye, akkor az $f(g(x)) \cdot g'(x)$ összetett függvénynek is van primitív függvénye és

$$\int f(g(x)) \cdot g'(x)\,dx = F(g(x)) + C,$$

ahol $F(y)$ az $f(y)$ függvény egyik primitív függvénye.

5.3. Newton-Leibniz formula. Ha f integrálható az $[a,b]$ zárt intervallumon, létezik az F primitív függvénye az (a,b) nyílt intervallumon, és F folytonos az $[a,b]$ zárt intervallumon, akkor

$$\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a),$$

azaz az integrál megegyezik a primitív függvény megváltozásával.

5.4. Integráltranszformáció. Ha f folytonos az $[a,b]$ intervallumon, $g : [c,d] \to [a,b]$ folytonosan deriválható függvény és $g(c) = a$, $g(d) = b$, akkor

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_c^d f(g(t))g'(t)\,dt.$$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

A fenti képlet előnye, hogy nem kell ismernünk a g helyettesítő függvény inverzét, elég ha a c és d pontokat meghatározzuk.

5.5. A határozott integrál alkalmazásai.

— **Függvénygörbe alatti terület.** Ha $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ integrálható, és sehol sem negatív, akkor az

$$A = \{(x; y) : x \in [a, b], 0 \leq y \leq f(x)\}$$

síkidomnak van területe, és

$$t(A) = \int_a^b f(x)\,dx.$$

— **Normáltartomány területe.** Ha f és g két integrálható függvény $[a, b]$-n, $x \in [a, b]$ esetén $g(x) \geq f(x)$, akkor a

$$N = \{(x; y) : x \in [a, b], f(x) \leq y \leq g(x)\}$$

normáltartománynak van területe és

$$t(N) = \int_a^b (g(x) - f(x))\,dx$$

— **Szektorszerű tartomány területe.** Ha az S tartományt a polárkoordinátákkal megadott $r = r(\varphi),\ \varphi \in [\alpha, \beta]$ síkgörbe és az origóból a görbe két végpontjába húzott szakaszok határolják, és $r(\varphi)$ integrálható, akkor az S síkidomnak van területe, és

$$t(S) = \frac{1}{2}\int_\alpha^\beta r^2(\varphi)\,d\varphi.$$

— **Függvénygrafikon ívhossza.** Ha az f függvény az $[a, b]$ intervallumon folytonosan deriválható, akkor a függvény grafikonjának van ívhossza, és

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2}\,dx.$$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

— **Forgástest térfogata.** Ha $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ integrálható és sehol sem negatív, akkor az

$$A = \left\{(x; y; z) : a \le x \le b,\ y^2 + z^2 \le f^2(x)\right\}$$

forgástestnek van térfogata és

$$V = \pi \int_a^b f^2(x)\,dx.$$

5.6. Majorizációs-elv vagy **összehasonlító kritérium**. Ha f és g integrálható $[a, \infty)$ minden korlátos zárt részintervallumán, és $x \in [a, \infty)$ esetén $|f(x)| \le g(x)$ és $\int_a^\infty g(x)\,dx$ konvergens, akkor $\int_a^\infty f(x)\,dx$ is (abszolút) konvergens.

5.7. Nagyságrendi kritérium vagy **határérték összehasonlító kritérium**. Ha f és g pozitív és integrálható $[a, \infty)$ minden korlátos zárt részintervallumán,

$$\lim_{x\to\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = L$$

létezik, és $0 < L < \infty$, akkor az

$$\int_a^\infty f(x)\,dx \qquad \text{és} \qquad \int_a^\infty g(x)\,dx$$

improprius integrálok egyszerre konvergensek vagy divergensek.

A két fenti konvergencia-kritérium értelemszerűen megfogalmazható korlátos intervallumokon vett improprius integrálok esetén is.

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán


© Typotex Kiadó

5.1. Határozatlan integrál


5.1. A következő függvényeket a baloldali oszlopban, deriváltjaikat a jobboldali oszlopban ábrázoltuk. Keressük meg őket!

$$x^3 - 4x, \quad x^3, \quad x + \sin x, \quad \operatorname{tg} x, \quad e^{-x}$$


(1)




(A)




(2)




(B)



(3)




(C)




www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó


(4)




(D)



(5)



(E)



Számítsuk ki a következő határozatlan integrálokat!

5.2. $\int \sin(x+3)\ dx$

5.3. $\int (1+x+5x^2)\ dx$

5.4. $\int \sqrt{x+2}\ dx$

5.5. $\int (\sin x+\cos x)^2\ dx$

5.6. $\int \frac{1}{(x+2)^3}\ dx$

5.7. $\int e^{2x+3}\ dx$

Alapintegrálokra való visszavezetéssel. illetve lineáris helyettesítés alkalmazásával számítsuk ki a következő határozatlan integrálokat! Az eredményt minden esetben ellenőrizzük deriválással!

© Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

5.8. $\int x^{3/2}\,dx$

5.9. $\int \left(\sqrt{x}+\frac{1}{x}\right)\,dx$

5.10. $\int \frac{-5}{x-7}\,dx$

5.11. $\int \frac{x^5-3x^3+x-2}{x^2}\,dx$

5.12. $\int \sin 2x+3\cos x\,dx$

5.13. $\int 2^x\,dx$

5.14. $\int e^{2x-3}\,dx$

5.15. $\int e^{-x}+3\cos\frac{x}{2}\,dx$

Határozzuk meg a következő $\int \frac{f'}{f}$ vagy $\int f^a f'$ alakúra visszavezethető határozatlan integrálokat! Az eredményt minden esetben ellenőrizzük deriválással!

5.16. $\int \frac{x^2}{x^3+1}\,dx$

5.17. $\int \ln^2 x\cdot\frac{1}{x}\,dx$

5.18. $\int \frac{2x+1}{\sqrt{x^2+x+1}}\,dx$

5.19. $\int x\sqrt{x^2+1}\,dx$

5.20. $\int \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}\,dx$

5.21. $\int \frac{1}{x\ln x}\,dx$

5.22. $\int \frac{1}{(1+x^2)\operatorname{arctg} x}\,dx$

5.23. $\int \frac{\sin x}{\cos^{2013} x}dx$

A következő határozatlan integrálok nevezőjében másodfokú kifejezések vannak. A megoldásban segíthet a parciális törtekre bontás, az $\frac{f'}{f}$ alakok felismerése, illetve visszavezetés az $\int \frac{1}{1+x^2}\,dx$ alapintegrálra. Az eredményt minden esetben ellenőrizzük deriválással!

5.24. $\int \frac{1}{2+x^2}\,dx$

5.25. $\int \frac{4}{5+6x^2}dx$

5.26. $\int \frac{1}{4-x^2}dx$

5.27. $\int \frac{1}{4-9x^2}dx$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

5.28. $\int \frac{3}{(x+3)(x+2)}dx$

5.29. $\int \frac{3}{(x+3)(2-x)}dx$

5.30. $\int \frac{1}{10-x^2}dx$

5.31. $\int \frac{1}{10+x^2}dx$

5.32. $\int \frac{x-2}{x^2-2x+6}dx$

5.33. $\int \frac{x}{x^2-2x+6}dx$

5.34. $\int \frac{x^2+1}{x^2-1}dx$

5.35. $\int \frac{x^2-1}{x^2+1}dx$

5.36. $\int \frac{3x^3+2x-1}{x^2-x-6}dx$

5.37. $\int \frac{3x^2+2x-1}{x^2-2x+6}dx$

5.38. $\int \frac{x^4+2}{x^2+1}dx$

5.39. $\int \frac{x^4-2}{x^2-1}dx$

Integráljuk a következő racionális törtfüggvényeket!

5.40. $\int \frac{1}{x^3+x^2}\,dx$

5.41. $\int \frac{1}{x^3+x}\,dx$

5.42. $\int \frac{x}{x^2-2x+5}\,dx$

5.43. $\int \frac{x}{x^2-2x-3}\,dx$

5.44. $\int \frac{x+2}{x-1}\,dx$

5.45. $\int \frac{x^2+2}{x-1}\,dx$

5.46. $\int \frac{x^2-2}{x+1}\,dx$

5.47. $\int \frac{3x^2+2}{x^3+2x}\,dx$

5.48. $\int \frac{x+2}{x^2+2x+2}\,dx$

5.49. $\int \frac{2}{(x-1)^2}\,dx$

Alapintegrálokra való visszavezetéssel, $\int \frac{f'}{f}$ vagy $\int f'f^a$ alakok felismerésével, illetve trigonometrikus azonosságok felhasználásával számítsuk ki a következő határozatlan integrálokat! Az eredményt minden esetben ellenőrizzük deriválással!

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

5.50. $\int \sin^2 x\,dx$

5.51. $\int \cos^2 2x\,dx$

5.52. $\int \frac{3}{\cos^2 x}\,dx$

5.53. $\int \frac{4}{\sin^2(3x-5)}\,dx$

5.54. $\int \frac{5}{\cos^2(1-x)}\,dx$

5.55. $\int \operatorname{tg} x\,dx$

5.56. $\int \frac{(\sin x+\cos x)^2}{\sin^2 x}dx$

5.57. $\int \frac{(\sin x-\cos x)^2}{\cos^2 x}\,dx$

5.58. $\int \frac{\sin^2 2x+1}{\cos^2 x}\,dx$

5.59. $\int \sqrt{1+\sin x}\,dx$

Határozzuk meg parciális integrálással a következő határozatlan integrálokat!

5.60. $\int x\cos x\,dx$

5.61. $\int x^2\sin x\;dx$

5.62. $\int e^x\sin x\;dx$

5.63. $\int x^2e^{-x}\,dx$

5.64. $\int \operatorname{arctg} x\,dx$

5.65. $\int x\operatorname{arctg} x\,dx$

5.66. $\int x\operatorname{sh} x\,dx$

5.67. $\int x\ln^2 x\,dx$

5.68. $\int x\ln\frac{1+x}{1-x}\,dx$

5.69. $\int \sin 3x\cdot\cos 4x\,dx$

5.70. Helyes-e a következő parciális integrálás? Ha igen, akkor $0=1$?

$$\int \frac{1}{x}\cdot\frac{1}{\ln x}\,dx = \ln x\cdot\frac{1}{\ln x}-\int \ln x\cdot\frac{-\frac{1}{x}}{\ln^2 x}\,dx = 1+\int \frac{1}{x}\cdot\frac{1}{\ln x}\,dx$$

Határozzuk meg a következő határozatlan integrálokat a javasolt helyettesítésekkel!

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

5.71. $\int xe^{x^2}\,dx, \qquad t = x^2$

5.72. $\int x^2\sqrt{x^3+1}\,dx, \qquad t = \sqrt{x^3+1}$

5.73. $\int \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}}\,dx, \qquad x = \sin t$

5.74. $\int \frac{1}{\sqrt{x(1-x)}}\,dx, \qquad x = \sin^2 t$

5.75. $\int \frac{1}{\sin x}\,dx, \qquad t = \cos x$

5.76. $\int \frac{1}{1+\cos^2 x}\,dx, \qquad t = \operatorname{tg} x$

5.77. $\int \frac{1}{2^x+4^x}\,dx, \qquad t = 2^x$

5.78. $\int \frac{1}{1+\sin^2 x}\,dx, \qquad t = \operatorname{tg} x$

5.79. $\int \frac{1}{(1-x^2)\sqrt{1-x^2}}\,dx, \qquad x = \sin t$

5.80. $\int \frac{1}{(1+x^2)\sqrt{1+x^2}}\,dx, \qquad x = \operatorname{tg} t$

5.81. $\int \frac{1}{(1+x^2)\sqrt{1+x^2}}\,dx, \qquad x = \operatorname{sh} t$

5.82. $\int \frac{1}{(x+1)^2(x-2)^3}\,dx, \qquad t = \frac{x+1}{x-2}$

Számoljuk ki a következő határozatlan integrálokat helyettesítésekkel!

5.83. $\int (2x+1)e^{x^2+x+1}\,dx$

5.84. $\int \cos x\, e^{\sin x}\,dx$

5.85. $\int \frac{dx}{\sqrt{x(1-x)}}$

5.86. $\int \frac{x}{(x^2+1)^2}\,dx$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

5.87. $\int \frac{e^x+2}{e^x+e^{2x}}\,dx$

5.88. $\int \frac{1}{e^x+e^{-x}}\,dx$

5.89. $\int \frac{2^x+3}{2^x+2^{2x}}\,dx$

5.90. $\int \frac{1}{\cos x}\,dx$

Számoljuk ki a következő határozatlan integrálokat!

5.91. $\int \frac{1}{(x+2)(x-1)}\,dx$

5.92. $\int \frac{x+1}{x^2+x+1}\,dx$

5.93. $\int \cos^3 x \sin^2 x\,dx$

5.94. $\int \frac{e^x-e^{-x}}{e^x+e^{-x}}\,dx$

5.95. $\int \frac{1}{e^x+e^{-x}}\,dx$

5.96. $\int x\sin(x^2+1)\,dx$

5.97. $\int \frac{1}{1+\sqrt{x}}\,dx$

5.98. $\int \ln x\,dx$

5.99. $\int \ln(x^2+1)\,dx$

5.100. $\int \frac{1}{(1+x^2)\operatorname{arctg} x}\,dx$

5.101. $\int \frac{1}{1+\cos x}\,dx$

5.102. $\int \frac{\operatorname{arctg} x}{1+x^2}\,dx$

5.103. $\int 2x\sin(x^2+1)\,dx$

5.104. $\int e^{-3x}-2\sin(3x-2)\,dx$

5.105. $\int (2x+2)(x^2+2x)^{222}\,dx$

5.106. $\int \operatorname{ctg} x\,dx$

5.107. $\int \frac{e^{2x}}{1+e^x}\,dx$

5.108. $\int \sqrt{2-x}\,dx$

5.109. $\int \frac{1}{1+\sqrt{x}}\,dx$

5.110. $\int x^2\ln x\,dx$

5.111. $\int (x^2+x)\ln x\,dx$

5.112. $\int \left(3\sqrt[4]{x}+2\right)\,dx$

5.113. $\int \sin x\cdot\cos^{3000} x\,dx$

5.114. $\int \frac{1}{x\ln x}\,dx$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

5.115. $\int 3^{-2x}\,dx$

5.116. $\int \sqrt{2-x^2}\,dx$

5.117. $\int \cos x \cdot e^{\sin x}\,dx$

5.118. $\int \frac{\cos^3 x}{\sin^4 x}\,dx$

5.119. $\int \frac{1}{\sin^2 x \cos^4 x}\,dx$

5.120. $\int \frac{\cos^5 x}{\sin^3 x}\,dx$

5.121. $\int \frac{1}{\cos^4 x}\,dx$

5.122. $\int \cos x \sin^2 x\,dx$

5.2. Határozott integrál

5.123. Ellenőrizzük, hogy a $[-2,4]$ intervallumban megadott pontok megfelelnek-e a Riemann-integrál definíciójában szereplő felosztásnak? Ha igen, határozzuk meg a felosztás finomságát!

(a) $x_0=-2, x_1=-1, x_2=0, x_3=\frac{1}{2}, x_4=4$

(b) $x_0=-1, x_1=2, x_2=4$

(c) $x_0=-2, x_1=4$

(d) $x_0=-2, x_1=x_0+1, x_2=x_1+\frac{1}{2}, \ldots, x_n=x_{n-1}+\frac{1}{n}$

(e) $x_0=-2, x_1=-1,5, x_2=3, x_3=4$

5.124. Finomításai-e egymásnak a következő felosztások a $[-2,4]$ intervallumban?

(a) F={-2; -1; 0; 4} $\quad \Phi=\{-2;-1;0;\frac{1}{2};3;4\}$

(b) F={-2; -1,5; 3; 4} $\quad \Phi=\{-2;-1;0;3;4\}$

Határozzuk meg a következő függvények alsó és felső összegét az adott felosztás esetén a $[-2,4]$ intervallumban!

5.125. $f(x)=\begin{cases}1, & \text{ha } x\in\mathbb{Q}\\ 0, & \text{ha } x\notin\mathbb{Q}\end{cases}$, $\quad \Phi=\{-2,1,5,4\}$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

5.126. x^2, $\Phi = \{-2, -1, 0, 4\}$ **5.127.** x^2, $\Phi = \{-2, 4\}$

5.128. $[x]$, $\Phi = \{-2, -1, 0, 4\}$ **5.129.** $[x]$, $\Phi = \{-2, 1, 5, 4\}$

5.130. Határozzuk meg az

$$f(x) = \begin{cases} 0, \text{ ha } 0 \le x < \dfrac{1}{2} \\ \\ 1, \text{ ha } \dfrac{1}{2} \le x \le 1 \end{cases}$$

függvény alsó és felső összegeinek halmazát a $[0, 1]$ intervallum esetén! Adjuk meg az alsó összegek szuprémumát és a felső összegek infimumát!

Riemann-integrálhatók-e a következő függvények a megadott I intervallumokban?

5.131. $f(x) = 5 \quad I = [0, 1]$ **5.132.** $f(x) = -4 \quad I = (-1, 2)$

5.133. $f(x) = [x] \quad I = [2, 4]$ **5.134.** $f(x) = |x| \quad I = [-2, 1]$

5.135. $f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{x}, \text{ ha } x \neq 0 \\ \\ 0, \text{ ha } x = 0 \end{cases} \quad I = [0, 1]$

5.136. $D(x) = \begin{cases} 1, \text{ ha } x \in \mathbb{Q} \\ 0, \text{ ha } x \notin \mathbb{Q} \end{cases} \quad I = [3, 5]$

5.137. $g(x) = \begin{cases} x, \text{ ha } x \in \mathbb{Q} \\ -x, \text{ ha } x \notin \mathbb{Q} \end{cases} \quad I = [3, 5]$

5.138. Bizonyítsuk be, hogy ha minden $x \in [a, b]$ esetén teljesül, hogy $m \le f(x) \le M$, továbbá f integrálható $[a, b]$-n, akkor

$$m(b-a) \le \int_a^b f(x)\,dx \le M(b-a).$$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

5.139. Bizonyítsuk be, hogy ha minden $x \in [a,b]$ esetén teljesül, hogy $f(x) \leq g(x)$, továbbá f és g integrálható $[a,b]$-n, akkor

$$\int_a^b f(x)\,dx \leq \int_a^b g(x)\,dx.$$

Bizonyítsuk be a következő egyenlőtlenségeket!

5.140. $0 \leq \int_1^2 \frac{1}{x^2+e^x}\,dx \leq 1$

5.141. $1 \leq \int_4^5 \sqrt{\ln x + 0,2}\,dx \leq 2$

5.142. Legyen

$$f(t) = \operatorname{sgn} t \text{ és } G(x) = \int_{-6}^{x} f(t)\,dt \quad (x > -6).$$

Határozzuk meg $G(-4), G(0), G(1), G(6)$ értékét! Határozzuk meg $G(x)$ deriváltját!

5.143. Legyen

$$f(t) = \begin{cases} 1, \text{ ha } t = \frac{1}{n}\ (n \in \mathbb{N}^+) \\ 0 \text{ egyébként} \end{cases} \quad \text{és } G(x) = \int_0^x f(t)\,dt \quad (x > 0).$$

Határozzuk meg a $G(x)$ és $G'(x)$ függvényeket!

5.144. Lehet-e $\operatorname{sgn} x$ valamilyen függvénynek az integrálfüggvénye $[-1,1]$-en? Van-e $\operatorname{sgn} x$-nek primitív függvénye $(-1,1)$-en?

5.145. Legyen

$$F(x) = \begin{cases} x^2, \text{ ha } x \neq 0 \\ 0, \text{ ha } x = 0 \end{cases} \quad \text{és } g(x) = \begin{cases} F'(x), \text{ ha } x \neq 0 \\ 1, \text{ ha } x = 0 \end{cases}.$$

Van-e g-nek primitív függvénye? Integrálható-e a g függvény? Deriválható-e a g függvény?

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

Számítsuk ki a következő sorozatok határértékét!

5.146. $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{\sin\frac{1}{n}+\sin\frac{2}{n}+\cdots+\sin\frac{n}{n}}{n}$

5.147. $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{\sqrt{1}+\sqrt{1}+\cdots+\sqrt{n}}{n\sqrt{n}}$

5.148. $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{\sqrt[3]{1}+\sqrt[3]{2}+\cdots+\sqrt[3]{n}}{n\sqrt[3]{n}}$

5.149. $\lim\limits_{n\to\infty} n\sum\limits_{i=1}^{n}\left(\dfrac{i}{n}\right)^2$

5.150. $\lim\limits_{n\to\infty} n\sum\limits_{i=1}^{n}\dfrac{i}{n^2+i^2}$

5.151. $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\left(\ln\sqrt[n]{n+i}-\ln\sqrt[n]{n}\right)$

5.152. Legyen f korlátos függvény $[0,1]$-ben, és tegyük fel, hogy

$$\lim_{n\to\infty}\frac{f\left(\frac{1}{n}\right)+f\left(\frac{2}{n}\right)+\cdots+f\left(\frac{n}{n}\right)}{n}=5.$$

Következik-e ebből, hogy f integrálható $[0,1]$-ben, és hogy $\int\limits_0^1 f(x)\,dx=5$?

5.153. Mi a következő két állítás logikai kapcsolata, azaz melyikből következik a másik?

P: Az f függvény integrálható $[a,b]$-n.
Q: Az $|f|$ függvény integrálható $[a,b]$-n.

5.154. Számítsuk ki a

$$G(x)=\begin{cases}x^2\sin\dfrac{1}{x}, & \text{ha } x\neq 0\\ 0, & \text{ha } x=0\end{cases}$$

függvény deriváltját! Bizonyítsuk be ennek segítségével, hogy az

$$f(x)=\begin{cases}\cos\dfrac{1}{x}, & \text{ha } x\neq 0\\ 0, & \text{ha } x=0\end{cases}$$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

függvénynek van primitív függvénye!

5.155. Tudjuk, hogy az

$$f(x) = \begin{cases} \cos\dfrac{1}{x}, & \text{ha } x \neq 0 \\ 0, & \text{ha } x = 0 \end{cases}$$

függvénynek van primitív függvénye. Lehet-e primitív függvénye a

$$g(x) = \begin{cases} \cos\dfrac{1}{x}, & \text{ha } x \neq 0 \\ 1, & \text{ha } x = 0 \end{cases}$$

függvénynek?

Határozzuk meg a következő függvények deriváltját!

5.156. $H(x) = \displaystyle\int_2^x \frac{1}{\ln t}\,dt.$

5.157. $L(x) = \displaystyle\int_2^{\operatorname{ch} x} \frac{1}{\ln t}\,dt.$

Határozzuk meg a következő határértékeket!

5.158. $\displaystyle\lim_{x\to\infty} \frac{\ln x}{x} \int_2^x \frac{1}{\ln t}\,dt$

5.159. $\displaystyle\lim_{x\to\infty} \frac{\ln x}{x} \int_2^{\operatorname{ch} x} \frac{1}{\ln t}\,dt$

Legyen f integrálható $[-a, a]$-n. Bizonyítsuk be, hogy ha f

5.160. páros függvény, akkor $\displaystyle\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = 2\int_0^a f(x)\,dx,$

5.161. páratlan függvény, akkor $\displaystyle\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = 0.$

Számítsuk ki a következő határozott integrálokat!

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

5.162. $\int_2^3 x^2\,dx$

5.163. $\int_4^6 4^{5x+6}\,dx$

5.164. $\int_0^\pi \sin x\,dx$

5.165. $\int_3^4 x^2 \ln x\,dx$

5.166. $\int_{-2\pi}^0 \sin^2 x\,dx$

5.167. $\int_{-2}^3 \frac{3x^4+4x^3-2x+1}{x^2+1}\,dx$

Határozzuk meg a következő határozott integrálokat a javasolt helyettesítésekkel!

5.168. $\int_{1/2}^{\sqrt{3}/2} \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}}\,dx, \quad x=\sin t$

5.169. $\int_2^5 x^2\sqrt{x^3+1}\,dx, \quad t=\sqrt{x^3+1}$

Határozzuk meg a következő határozott integrálokat helyettesítésekkel!

5.170. $\int_1^2 \frac{3^x+2}{3^x+3^{2x}}\,dx$

5.171. $\int_0^1 \operatorname{arctg} x\cdot\sqrt{x}\,dx$

5.172. $\int_{\pi/6}^{\pi/2} \frac{1}{1+\operatorname{tg} x}\,dx$

5.173. $\int_1^2 \frac{5^{2x}}{1+5^x}\,dx$

5.174. Számítsuk ki az $\int_{-2}^2 \sin^9 x\cdot e^{x^4}\,dx$ integrált!

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

5.3. A határozott integrál alkalmazásai

5.175. Határozzuk meg a $-x^2+3$ függvény grafikonja alatti területet!

5.176. Határozzuk meg a $\sin^2 x$ függvény egy „huplija” alatti területet!

Határozzuk meg az f és g függvények grafikonja által bezárt tartományok területét!

5.177. $f(x)=x^2, \qquad g(x)=-x+2$

5.178. $f(x)=-x^2+2x, \qquad g(x)=-x$

5.179. $f(x)=\sqrt{1-x^2}, \qquad g(x)=0$

5.180. $f(x)=\sqrt{1-x^2}, \qquad g(x)=-x$

Határozzuk meg az adott görbék által bezárt területet!

5.181. x tengely, $\ln x$ grafikonja, $x=e$ egyenes

5.182. x tengely, $\operatorname{tg} x$ grafikonja, $x=\pi/4$ egyenes

5.183. y tengely, x^2 grafikonja, $y=3$ egyenes

5.184. y tengely, e^x grafikonja, $y=5$ egyenes

5.185. $\dfrac{1}{1+x^2}$ grafikonja, $\dfrac{x^2}{2}$ grafikonja

5.186. x^2 grafikonja, $y=x$ egyenes, $y=-x+1$ egyenes


5.187. x^2 grafikonja, $2x^2$ grafikonja, $y=x$ egyenes

5.188. $\dfrac{1}{x}$ grafikonja, $y=x$ egyenes, $y=-2x+4,5$ egyenes

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

5.189. Bizonyítsuk be, hogy az ábrán látható parabolaszeletnek a területe, amelyiknek a magassága m, és amelyet h hosszúságú húr határol, $T = \frac{2}{3}mh$.



Határozzuk meg a következő, polárkoordinátákkal megadott görbék által határolt síkidomok területét!

5.190. $r = \cos\varphi$

5.191. $r = \cos 2\varphi$

5.192. $r = \cos 3\varphi$

5.193. $r = \dfrac{1}{1 + \frac{1}{2}\cos\varphi}, \quad 0 \le \varphi \le \dfrac{\pi}{2}$

Forgassuk meg a következő függvények grafikonjait az x tengely körül a megadott I intervallumok felett! Számítsuk ki a keletkezett forgástestek térfogatát!

5.194. $e^{-x} \quad I = [0, 1]$

5.195. $\sqrt{x} \quad I = [0, 1]$

5.196. $\sin x \quad I = [0, \pi]$

5.197. $\dfrac{1}{x} \quad I = [1, 4]$

Forgassuk meg a következő függvények grafikonjait az y tengely körül a megadott intervallumokban! Számítsuk ki a keletkezett forgástestek térfogatát!

5.198. $e^{-x} \quad x \in [0, 1]$

5.199. $\sqrt{x} \quad x \in [0, 1]$

5.200. $\sin x \quad x \in [0, \pi/2]$

5.201. $\dfrac{1}{x} \quad x \in [1, 4]$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

Forgassuk meg f és g grafikonját az x tengely körül az $[x_1, x_2]$ intervallumban, majd számoljuk ki azoknak a forgástesteknek a térfogatát, amelyeket a megforgatott grafikonok, illetve az $x = x_1$ és $x = x_2$ síkok határolnak!

5.202. $f(x) = -x^2 + 4$ $g(x) = -2x^2 + 8$ $x_1 = -2$ $x_2 = 2$

5.203. $f(x) = \sin x$ $g(x) = -4x^4 + 4$ $x_1 = 0$ $x_2 = 1$

5.204. $f(x) = e^x$ $g(x) = \dfrac{1}{x}$ $x_1 = 1$ $x_2 = 2$

5.205. $f(x) = \ln x$ $g(x) = \operatorname{ch} x$ $x_1 = 1$ $x_2 = 2$

Számítsuk ki a következő függvénygrafikonok ívhosszát a megadott I intervallumokon!

5.206. $\sqrt{x}$, $I = [0, 1]$

5.207. $\ln x$, $I = [\sqrt{3}, \sqrt{8}]$

5.208. $\operatorname{ch} x$, $I = [-1, 1]$

5.209. $x^{3/2}$, $I = [0, 4]$

Határozzuk meg az egyenesvonalú pályán mozgó pont által megtett utat az adott időintervallumokban, ha a mozgó pont sebessége az idő függvényében

5.210. $v(t) = 5t^2$ $t \in [0, 2]$

5.211. $v(t) = 3 \sin 2t$ $t \in [0, 2\pi]$

Egy testet az x tengelyen az x tengely irányában ható $F(x)$ erő mozgat az x_1 pontból az x_2 pontba. Mekkora munkát végez az erő?

5.212. $F(x) = 2x$, $[x_1, x_2] = [0, 2]$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

5.213. $F(x) = 3\sin x, \qquad [x_1, x_2] = [0, \pi/4]$

Egy 1 méter hosszúságú rudat az x tengelyre helyezünk úgy, hogy a rúd bal végpontja az origó. Mekkora a rúd tömege, ha a sűrűsége az origótól x távolságra $\varrho(x)$?

5.214. $\varrho(x) = 2 + x$

5.215. $\varrho(x) = 2 + \dfrac{x^2}{1000}$

5.216. Határozzuk meg az előző feladatban a rudak tömegközéppontját!

5.217. Határozzuk meg az előző feladatban a rudak y tengelyre vonatkozó tehetetlenségi nyomatékát!

5.218. Mekkora munkát kell végeznünk ahhoz, hogy az x tengely x_0 pontjában lévő q töltést az x tengely mentén a $2x_0$ pontba vigyük, ha az origóban egy Q töltést rögzítettünk?

5.219. Egy homogén rúd l hosszúságú, m tömegű. A rudat az x tengelyre helyezzük úgy, hogy a rúd bal végpontja az origó. Mekkora erővel vonzza ez a rúd a $(0, y_0)$ pontban lévő M tömegű anyagi pontot?

5.4. Improprius integrál

5.220. Milyen c esetén konvergens az $\displaystyle\int_1^\infty \frac{1}{x^c}\,dx$ improprius integrál?

5.221. Milyen c esetén konvergens az $\displaystyle\int_0^1 \frac{1}{x^c}\,dx$ improprius integrál?

5.222. Melyik állításból következik, hogy az $\displaystyle\int_1^\infty f(x)\,dx$ improprius integrál konvergens vagy az, hogy divergens?

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

(a) $\forall x \in [1,\infty) \quad |f(x)| < \dfrac{1}{x^2}$ **(b)** $f(x) > \dfrac{1}{x^3}$

(c) $\forall x \in [1,\infty) \quad |f(x)| > \dfrac{1}{x}$ **(d)** $\forall x \in [1,\infty) \quad |f(x)| < \dfrac{1}{x}$

Konvergensek-e, és ha igen, mennyi az értékük az alábbi improprius integráloknak!

5.223. $\displaystyle\int_3^\infty 2^{-x}\,dx$

5.224. $\displaystyle\int_0^1 \frac{dx}{x-1}$

5.225. $\displaystyle\int_2^\infty \frac{dx}{x^3}$

5.226. $\displaystyle\int_0^7 \frac{dx}{x^3}$

5.227. $\displaystyle\int_1^\infty \frac{dx}{\sqrt{x}}$

5.228. $\displaystyle\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x}}$

5.229. $\displaystyle\int_1^2 \frac{dx}{x\ln x}$

5.230. $\displaystyle\int_2^\infty \frac{dx}{x\ln x}$

5.231. $\displaystyle\int_{\frac12}^1 \frac{dx}{x\ln x}$

5.232. $\displaystyle\int_0^{\frac12} \frac{dx}{x\ln x}$

5.233. $\displaystyle\int_1^\infty \frac{dx}{x+\sqrt{x}}$

5.234. $\displaystyle\int_0^1 \frac{dx}{x+\sqrt{x}}$

5.235. $\displaystyle\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$

5.236. $\displaystyle\int_0^1 \ln x\,dx$

5.237. $\displaystyle\int_0^{\pi/2} \operatorname{tg} x\,dx$

5.238. $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2}$

Döntsük el az alábbi improprius integrálokról, hogy konvergensek, abszolút konvergensek vagy divergensek!

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

5.239. $\displaystyle\int_1^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{x}+x^2}$

5.240. $\displaystyle\int_0^{1} \frac{dx}{\sqrt{x}+x^2}$

5.241. $\displaystyle\int_2^{\infty} \frac{dx}{x\ln^2 x}\,dx$

5.242. $\displaystyle\int_1^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{x+x^3}}$

5.243. $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{x^2}{x^4-x^2+1}\,dx$

5.244. $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{x+1}{\sqrt{x^4+1}}\,dx$

5.245. $\displaystyle\int_1^{\infty} \frac{x+1}{x^3+x}\,dx$

5.246. $\displaystyle\int_0^{1} \frac{dx}{\sqrt{x+x^3}}$

5.247. $\displaystyle\int_0^{\pi/2} \frac{dx}{\sin x}$

5.248. $\displaystyle\int_0^{\infty} e^{-x^2}\,dx$

5.249. $\displaystyle\int_1^{\infty} \frac{\cos x}{x^2}\,dx$

5.250. $\displaystyle\int_1^{\infty} \frac{\ln x}{x^2}\,dx$

5.251. $\displaystyle\int_0^{\infty} xe^{-x^2}\,dx$

5.252. $\displaystyle\int_0^{\infty} x^2e^{-x^2}\,dx$

5.253. $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^2}$

5.254. $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{\cos x}{x^2}\,dx$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

6. fejezet

Numerikus sorok

6.1. Konvergenciakritériumok.

— Ha $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ konvergens, akkor $a_n \to 0$.

— **Sorok Cauchy-kritériuma.** A $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ numerikus sor akkor és csak akkor konvergens, ha

$$\forall \varepsilon > 0 \; \exists n_0 \; \forall n, m \; (n_0 \leq n \leq m \implies \left| \sum_{k=n}^{m} a_k \right| < \varepsilon).$$

— **Majoráns kritérium.** Ha véges sok kivétellel minden $n \in \mathbb{N}^+$ esetén $|a_n| \leq b_n$ és $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ konvergens, akkor a $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ sor abszolút konvergens.

— **Nagyságrendi kritérium** vagy **határérték összehasonlító kritérium**. Ha $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ és $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ két pozitív tagú sor, valamint létezik a $\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = c$ határérték és $0 < c < \infty$, akkor a két sor egyszerre konvergens vagy divergens.

— **Hányadoskritérium.** Ha $\lim_{n\to\infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|}$ létezik és értéke q, akkor $q < 1$ esetén a $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ sor abszolút konvergens, $q > 1$ esetén pedig divergens. $q = 1$ esetén a hányadoskritériummal nem tudjuk eldönteni, hogy a sor konvergens vagy divergens.

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

— **Gyökkritérium.** Ha $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|}$ létezik és értéke q, akkor $q < 1$ esetén a $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ sor abszolút konvergens, $q > 1$ esetén pedig divergens. $q = 1$ esetén a gyökkritériummal nem tudjuk eldönteni, hogy a sor konvergens vagy divergens.

— **Integrálkritérium.** Ha f egy monoton csökkenő pozitív függvény az $[1, \infty)$ félegyenesen, akkor a $\sum\limits_{n=1}^{\infty} f(n)$ végtelen sor és a $\int\limits_{1}^{\infty} f(x)\,dx$ improprius integrál egyszerre konvergens vagy divergens.

— **Leibniz-kritérium.** A $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n a_n$ numerikus sort *Leibniz-típusú* sornak vagy röviden *Leibniz-sornak* nevezzük, ha az (a_n) sorozat **monoton csökkenően** nullához tart.
A Leibniz-típusú sorok konvergensek.

6.1. Numerikus sorok konvergenciája

Írjuk fel a következő sorok n-edik részletösszegét! Határozzuk meg a részletösszegek határértékét! Adjuk meg a sorok összegét!

6.1. $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2^k} + \cdots$

6.2. $1 + \frac{1}{10} + \frac{1}{100} + \cdots + \frac{1}{10^k} + \cdots$

6.3. $\frac{1}{1\cdot 2} + \frac{1}{2\cdot 3} + \cdots + \frac{1}{k\cdot(k+1)} + \cdots$

6.4. $\frac{1}{1\cdot 4} + \frac{1}{4\cdot 7} + \cdots + \frac{1}{(3k-2)\cdot(3k+1)} + \cdots$

6.5. $\frac{1}{1\cdot 4} + \frac{1}{2\cdot 5} + \cdots + \frac{1}{k\cdot(k+3)} + \cdots$

Határozzuk meg a következő sorok összegét, ha konvergensek!

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

6.6. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n}{9^n}$

6.7. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5^n}{9^n}$

6.8. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n + 5^n}{9^n}$

6.9. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2 \cdot 4^n}{(-9)^n}$

6.10. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{9^n}{4^n + 5^n}$

6.11. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2)^n}{5^n}$

6.12. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{10^n}$

6.13. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n}{(-3)^n}$

6.14. Konvergens-e a $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n$ sor?

6.15. Bizonyítsuk be, hogy ha $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ konvergens, akkor $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$ (lásd a tagok 0-hoz tartásáról szóló konvergencia kritériumot).

6.16. Bizonyítsuk be, hogy a $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ **harmonikus sor** divergens.

Változhat-e egy végtelen sor konvergenciája, illetve összege, ha

6.17. a sorba új zárójeleket teszünk?

6.18. a sorba véges sok új tagot illesztünk?

6.19. a sorból zárójeleket veszünk ki?

6.20. a sorból véges sok tagot elhagyunk?

Igaz-e, hogy ha

6.21. $a_n \to 0$, akkor $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ konvergens?

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

6.22. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ konvergens, akkor $a_n \to 0$?

6.23. $a_n \to 1$, akkor $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ divergens?

6.24. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ divergens, akkor $a_n \to 1$?

Hova tartanak a következő sorok tagjaiból álló sorozatok? Konvergensek-e a sorok?

6.25. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+1}$

6.26. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$

6.27. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+n^2}$

6.28. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n^2}$

6.29. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3n}$

6.30. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$

6.31. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{n}}$

6.32. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[n]{3}}$

6.33. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[n]{0,01}}$

6.34. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n}}$

6.35. $\sum_{n=1}^{\infty} \sin(n\pi)$

6.36. $\sum_{n=1}^{\infty} \cos(n\pi)$

6.37. Bizonyítsuk be, hogy ha minden n pozitív egész esetén $a_n > 0$, $a_n \leq b_n \leq c_n$, továbbá $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = 7$ és $\sum_{n=1}^{\infty} c_n = 10$, akkor $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ konvergens!

6.38. Bizonyítsuk be, hogy ha minden n pozitív egész esetén $a_n > 0$, akkor $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ konvergens vagy végtelen.

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

6.39. Tegyük fel, hogy $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ konvergens, és hogy minden pozitív egész n szám esetén $b_n < a_n$. Következik-e ebből, hogy $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ konvergens?

6.40. Tegyük fel, hogy $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ divergens, és hogy minden pozitív egész n szám esetén $b_n > a_n$. Következik-e ebből, hogy $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ divergens?

6.2. Pozitív tagú sorok konvergenciakritériumai

Döntsük el a majoráns kritérium segítségével, hogy konvergensek-e a következő sorok!

6.41. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+4}$

6.42. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n+1}$

6.43. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2+4}$

6.44. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$

6.45. Tegyük fel, hogy minden pozitív egész n-re $a_n > 0$. Mit állíthatunk a $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ sor konvergenciáját illetően biztosan, ha

(a) $\lim \frac{a_{n+1}}{a_n} > 1$; **(b)** $\lim \frac{a_{n+1}}{a_n} < 1$; **(c)** $\lim \frac{a_{n+1}}{a_n} = 1$?

Döntsük el a hányadoskritérium segítségével, hogy konvergensek-e a következő sorok!

6.46. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!}$

6.47. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{n!}$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

6.48. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n n!}{n^n}$

6.49. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n n!}{n^n}$

6.50. Tegyük fel, hogy minden pozitív egész n-re $a_n > 0$. Mit állíthatunk a $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ sor konvergenciáját illetően biztosan, ha

(a) $\lim \sqrt[n]{a_n} > 1$ **(b)** $\lim \sqrt[n]{a_n} < 1$ **(c)** $\lim \sqrt[n]{a_n} = 1$

Döntsük el a gyökkritérium segítségével, hogy konvergensek-e a következő sorok!

6.51. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n}$

6.52. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n + 1}{3^n}$

6.53. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{n}\right)^n$

6.54. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3}{2} - \frac{1}{n}\right)^n$

6.55. Tegyük fel, hogy $b_n \neq 0 \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$, továbbá $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = c > 0$. Mit állíthatunk a $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ sor konvergenciáját illetően biztosan, ha

(a) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ konvergens. **(b)** $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ divergens.

6.56. Tegyük fel, hogy $b_n \neq 0 \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$, továbbá $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = 0$. Mit állíthatunk a $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ sor konvergenciáját illetően biztosan, ha

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

(a) $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ konvergens. **(b)** $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ divergens.

6.57. Tegyük fel, hogy $b_n \neq 0 \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$, továbbá $\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = \infty$. Mit állíthatunk a $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ sor konvergenciáját illetően biztosan, ha

(a) $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ konvergens. **(b)** $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ divergens.

Döntsük el ismert sorok nagyságrendjével való összehasonlítással (ld. nagyságrendi kritérium), hogy konvergensek-e a következő sorok!

6.58. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2+4}{n^4+3n}$

6.59. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n^3}{n^2+3}$

6.60. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{2n^6}}{n^2+3}$

6.61. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt[3]{3n^9}}{\sqrt{n^4+3}}$

6.62. Tegyük fel, hogy $\int_1^{\infty} f(x)\,dx = 5$. Következik-e ebből, hogy $\sum_{n=1}^{\infty} f(n) = 5$?

6.63. Tegyük fel, hogy az $\int_1^{\infty} f(x)\,dx$ improprius integrál konvergens. Következik-e ebből, hogy $\sum_{n=2}^{\infty} f(n)$ konvergens?

6.64. Tegyük fel, hogy $f(x) > 0$, és $f(x)$ monoton csökken az $(1, \infty)$ intervallumban, továbbá $\int_1^{\infty} f(x)\,dx = 5$. Következik-e ebből, hogy $\sum_{n=2}^{\infty} f(n) = 5$?

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

6.65. Tegyük fel, hogy $f(x) > 0$ és $f(x)$ monoton csökken az $(1, \infty)$ intervallumban, továbbá az $\int_1^\infty f(x)\,dx$ improprius integrál konvergens. Következik-e ebből, hogy $\sum_{n=2}^{\infty} f(n)$ konvergens?

Döntsük el az integrálkritérium segítségével, hogy konvergensek-e a következő sorok!

6.66. $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$

6.67. $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^{4/5}}$

Döntsük el, hogy konvergensek-e a következő sorok!

6.68. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+\sqrt{n}}$

6.69. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{n^2+\sqrt{n}}$

6.70. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{\sqrt{n}}$

6.71. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{\sqrt[n]{n}}$

6.72. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{3^n}$

6.73. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \sqrt[n]{\frac{1}{2}}$

6.74. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2^n}$

6.75. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{n}\right)^n$

6.76. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \left(-\frac{2}{3}\right)^n$

6.77. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n}$

6.78. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1000^n}{n!}$

6.79. $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln^2 n}$

6.80. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{10}}{3^n - 2^n}$

6.81. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} n \left(\frac{1}{2}\right)^n$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

6.82. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(-\frac{1}{n}\right)^n$

6.83. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\left(-\frac{3}{2}\right)^n$

6.84. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{n+200}{2n+7}\right)^n$

6.85. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^5+3}{n^3-n+2}$

6.86. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2^n+3^n}{5^n}$

6.87. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\sqrt[n]{\frac{1}{2}}$

6.88. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{5}{2}\right)^n$

6.89. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{2}{5}\right)^n$

6.90. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\left(1-\frac{1}{n}\right)$

6.91. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\left(1-\frac{1}{n}\right)^n$

6.92. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)$

6.93. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$

6.94. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(n+1)^3}{3^n}$

6.95. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{\sqrt[n]{n^2+1}}$

6.96. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}n(n+5)$

6.97. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\left(\sqrt{n+1}-\sqrt{n}\right)$

6.98. Tegyük fel, hogy $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}a_n=A\in\mathbb{R}$ és $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}b_n=B\in\mathbb{R}$, valamint c egy valós szám. Következnek-e ebből az alábbi állítások?

(a) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}c\cdot a_n=c\cdot A$

(b) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(a_n+b_n)=A+B$

(c) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(a_n-b_n)=A-B$

(d) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(a_nb_n)=AB$

(e) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{b_n}=\frac{A}{B}\quad(b_n\neq 0)$

(f) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}|a_n|=|A|$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

6.3. Feltételes és abszolút konvergencia

6.99. Igaz-e, hogy ha egy végtelen sorban a tagok előjele váltakozik, akkor a sor konvergens?

6.100. Igaz-e, hogy ha egy végtelen sorban a tagokból álló sorozat monoton csökken, akkor a sor konvergens?

6.101. Igaz-e, hogy ha egy végtelen sorban a tagok előjele váltakozik, és a tagok abszolút értékeiből álló sorozat monoton csökken, akkor a sor konvergens?

6.102. Igaz-e, hogy ha egy végtelen sorban a tagokból álló sorozat monoton csökkenve 0-hoz tart, akkor a sor konvergens?

6.103. Igaz-e, hogy ha egy végtelen sorban a tagok előjele váltakozik, és a tagok abszolút értékeiből álló sorozat 0-hoz tart, akkor a sor konvergens?

Melyik sor Leibniz-sor? Melyik sor konvergens?

6.104. $1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\cdots$

6.105. $1-\frac{1}{3}+\frac{1}{5}-\frac{1}{7}+\cdots$

6.106. $1-\frac{1}{1\cdot 3}+\frac{1}{3\cdot 5}-\frac{1}{5\cdot 7}+\cdots$

6.107. $1-\frac{1}{2}+\frac{1}{4}-\frac{1}{8}+\cdots$

6.108. $1-\frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt[3]{3}}-\frac{1}{\sqrt[4]{4}}+\cdots$

6.109. $1-\frac{1}{2\cdot 3}+\frac{1}{4\cdot 9}-\frac{1}{8\cdot 27}+\cdots$

Döntsük el, hogy konvergensek-e, illetve abszolút konvergensek-e a következő sorok!

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

6.110. $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n$

6.111. $\sum_{n=1}^{\infty}(-2)^n$

6.112. $\sum_{n=1}^{\infty}\left(-\frac{1}{2}\right)^n$

6.113. $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{n}$

6.114. $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{2n+1}$

6.115. $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{n\cdot(n+1)}$

6.116. $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{n^3}$

6.117. $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{\sqrt[5]{n}}$

6.118. $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{n^{1,3}}$

6.119. $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{n^{0,3}}$

6.120. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin n}{n^2}$

6.121. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(\sin n)^2}{n^2}$

6.122. Változhat-e egy pozitív tagú végtelen sor konvergenciája, illetve összege, ha

(a) a sorba új zárójeleket teszünk?

(b) a sorból zárójeleket veszünk ki?

(c) a sor tagjainak a sorrendjét átrendezzük?

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

7. fejezet
Függvénysorozatok és sorok

7.1. Az egyenletes konvergencia tulajdonságai.

— **Folytonosság.** Folytonos függvények egyenletesen konvergens sorozatának határértéke folytonos.

— **Deriválhatóság.** Ha a deriválható függvényekből álló f_n sorozat pontonként tart az f függvényhez, f_n' pedig egyenletesen tart egy g függvényhez az (a,b) intervallumon, akkor ezen az intervallumon f deriválható és $f'=g$, azaz

$$\lim_{n\to\infty} f_n' = \left(\lim_{n\to\infty} f_n\right)' = f'$$

— **Integrálhatóság.** Ha a Riemann-integrálható függvényekből álló f_n sorozat egyenletesen tart az f függvényhez az $[a,b]$ intervallumon, akkor az f függvény is integrálható, és integrálja megegyezik a sorozat integráljainak határértékével, azaz

$$\lim_{n\to\infty} \int_a^b f_n(x)\,dx = \int_a^b \left(\lim_{n\to\infty} f_n(x)\right)\,dx = \int_a^b f(x)\,dx$$

7.2. Egyenletes konvergencia Weierstrass-kritériuma. Ha a $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ függvénysornak van a H halmazon **konvergens numerikus majoránsa**, azaz van olyan (M_n) sorozat, hogy minden $n\in\mathbb{N}$ és $x\in H$ esetén

$$|f_n(x)| \le M_n \quad \text{és} \quad \sum_{n=1}^{\infty} M_n < \infty,$$

akkor a $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ függvénysor abszolút és egyenletesen konvergens H-n.

7.3. Hatványsorok konvergenciatartománya.

© Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

— A $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-c)^n$ hatványsor konvergenciatartománya egy olyan intervallum, amelyik az esetleges végpontokat kivéve szimmetrikus a hatványsor középpontjára, c-re.

A fenti tételbe beleértendő az az eset, amikor ez a tartomány az egész számegyenes, illetve az egyedül a c pontból álló halmaz.

— **Konvergenciasugár.** Ha $\limsup \sqrt[n]{|a_n|} = L$, illetve ha $\limsup \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = L$, akkor a konvergenciasugár

$$R = \begin{cases} \frac{1}{L} & \text{ha } 0 < L < \infty \\ \infty & \text{ha } L = 0 \\ 0 & \text{ha } L = \infty \end{cases}$$

— A konvergenciatartomány belsejében minden zárt intervallumon egyenletes a konvergencia és így lehet tagonként deriválni és integrálni.

7.4. Ha f akárhányszor deriválható a c pontban, akkor a

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(c)}{n!}(x-c)^n$$

hatványsort az f függvény c pontbeli **Taylor-sorának** nevezzük, a fenti sorban szereplő

$$a_n = \frac{f^{(n)}(c)}{n!}$$

együtthatókat pedig **Taylor-együtthatóknak**.

7.5. Lagrange-maradék. Legyen az f függvény $n+1$-szer deriválható a $[c,x]$ intervallumon. Ekkor van olyan $d \in (c,x)$ szám, amelyre

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(c)}{k!}(x-c)^k + \frac{f^{(n+1)}(d)}{(n+1)!}(x-c)^{n+1}.$$

Ha az f függvény $n+1$-szer deriválható az $[x,c]$ intervallumon, akkor van olyan $d \in (x,c)$ szám, amelyre a fenti egyenlőség teljesül.

7.6. Egyenletesen korlátos deriváltú függvényt előállít a Taylor-sora, azaz ha az (a,b) intervallumon az f függvény akárhányszor deriválható, és megadható

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

egy M szám úgy, hogy tetszőleges $n \in \mathbb{N}$ és $x \in (a,b)$ esetén $\left|f^{(n)}(x)\right| \leq M$, akkor minden $c \in (a,b)$-re a c-hez tartozó Taylor-sor előállítja a függvényt az egész (a,b) intervallumon.

7.7. Nevezetes Taylor-sorok.

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \qquad \text{ha } x \in \mathbb{R};$$

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} \qquad \text{ha } x \in \mathbb{R};$$

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} \qquad \text{ha } x \in \mathbb{R};$$

$$\operatorname{sh} x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} \qquad \text{ha } x \in \mathbb{R};$$

$$\operatorname{ch} x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!} \qquad \text{ha } x \in \mathbb{R};$$

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n \qquad \text{ha } |x| < 1 \quad \textbf{(Geometriai sor)};$$

$$\ln(1+x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1} \qquad \text{ha } |x| < 1;$$

$$\operatorname{arctg} x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} \qquad \text{ha } |x| < 1.$$

7.8. Fourier-sor.

— Ha $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ periodikus 2π szerint és Riemann-integrálható a $[0, 2\pi]$-n, akkor az

$$a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

trigonometrikus sort az f függvény **Fourier-sorának** nevezzük, ahol

$$a_0 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x)\,dx, \;\; a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cos nx\,dx, \;\; b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \sin nx\,dx$$

az f függvény **Fourier-együtthatói**.

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

— **Cantor tétele.** Ha $f(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty}(a_n \cos nx + b_n \sin nx)$ $[0, 2\pi]$-n, akkor az a_0, a_n és b_n együtthatók egyértelműen meghatározottak, azaz egy függvényt csak egyféleképpen lehet trigonometrikus sorral előállítani. Ha a konvergencia egyenletes, akkor $f(x)$ folytonos, és ez a trigonometrikus sor az f Fourier-sora.

— **Pontonkénti konvergencia.** Ha az $f(x)$ függvény 2π szerint periodikus és szakaszonként folytonosan deriválható, akkor az $f(x)$ függvény Fourier-sora mindenütt konvergens, az $f(x)$ függvény folytonossági helyein a Fourier-sor előállítja a függvényt, a szakadási helyeken pedig a függvény bal-, és jobboldali határértékének a számtani közepe, azaz minden $x \in \mathbb{R}$ esetén

$$a_0 + \sum_{n=1}^{\infty}(a_n \cos nx + b_n \sin nx) = \frac{f(x^+) + f(x^-)}{2}$$

7.1. Pontonkénti és egyenletes konvergencia

Hol konvergensek és mi a pontonkénti határértékük az alábbi függvénysorozatoknak? Milyen intervallumokban egyenletes a konvergencia?

7.1. $f_n(x) = x^n$

7.2. $f_n(x) = x^n - x^{n+1}$

7.3. $f_n(x) = \dfrac{x}{n}$

7.4. $f_n(x) = \dfrac{x^n}{n!}$

7.5. $f_n(x) = \sqrt[n]{1 + x^{2n}}$

7.6. $f_n(x) = \sqrt[n]{|x|}$

7.7. $f_n(x) = \sqrt{x + \dfrac{1}{n}}$

7.8. $f_n(x) = \sqrt{x^2 + \dfrac{1}{n^2}}$

7.9. $f_n(x) = \dfrac{\sin x}{n}$

7.10. $f_n(x) = \sin \dfrac{x}{n}$

7.11. $f_n(x) = \begin{cases} 1, & \text{ha } x = \dfrac{1}{n} \\ 0, & \text{egyébként} \end{cases}$

7.12. $f_n(x) = \begin{cases} 1, & \text{ha } 0 < x < \dfrac{1}{n} \\ 0, & \text{egyébként} \end{cases}$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

Mi a következő állításpárok logikai kapcsolata, azaz melyikből következik a másik?

7.13. **P:** $\forall x \in [a,b] \quad \lim\limits_{n\to\infty} f_n(x) = 5$
Q: $\forall n \in \mathbb{N} \quad \lim\limits_{x\to\infty} f_n(x) = 5$

7.14. **P:** $\forall x \in [a,b] \quad \lim\limits_{n\to\infty} f_n(x) = f(x)$
Q: $\forall x \in [a,b] \quad \lim\limits_{n\to\infty} (f_n(x) - f(x)) = 0$

7.15. **P:** f_n pontonként konvergál I-n. **Q:** f_n egyenletesen konvergál I-n.

7.16. Bizonyítsuk be, hogy az $f_n(x) = \cos nx$ függvénysorozat konvergens az $x = 2k\pi \quad (x \in \mathbb{Z})$ pontokban. Konvergens-e a függvénysorozat az $x = k\pi \quad (x \in \mathbb{Z})$ pontokban?

7.17. Adjunk meg 3 különböző függvénysorozatot úgy, hogy mindhárom függvénysorozat konvergáljon az azonosan 5 függvényhez $[0,1]$-en!

7.18. Megadható-e olyan függvénysorozat, amelyik $[0,1]$-en az azonosan 5 függvényhez konvergál, és a függvénysorozat egyetlen tagja sem folytonos $[0,1]$-en?

7.19. Adjunk példát olyan függvénysorozatra, amelynek minden tagja minden pontban szakad a $[0,1]$ intervallumban, de a függvénysorozat egyenletesen tart egy $[0,1]$-ben folytonos függvényhez!

7.20. Adjunk példát olyan függvénysorozatra, amelynek minden tagja minden pontban folytonos, és a függvénysorozat az

$$f(x) = \begin{cases} 1, & \text{ha } x = 5 \\ 0, & \text{egyébként} \end{cases}$$

függvényhez tart! Lehet-e a konvergencia egyenletes?

7.21. Adjunk meg 3 különböző függvénysorozatot úgy, hogy mindhárom függvénysorozat egyenletesen konvergáljon a

$$D(x) = \begin{cases} 1, & \text{ha } x \in \mathbb{Q} \\ 0, & \text{egyébként} \end{cases}$$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

Dirichlet-függvényhez $[0,1]$-en! Állhatnak-e az előbbi függvénysorozatok csak folytonos függvényekből?

7.22. Legyen $f_n(x) = n^2(x^{n-1} - x^n)$. Bizonyítsuk be, hogy

(a) $\forall x \in [0,1] \quad \lim\limits_{n\to\infty} f_n(x) = 0$

(b) $\lim\limits_{n\to\infty} \int\limits_0^1 f_n(x)\,dx \neq 0$

(c) $[0,1]$-en az f_n függvénysorozat nem tart egyenletesen az azonosan 0 függvényhez.

7.23. Legyen $f_n(x) = \sqrt{x^2 + \frac{1}{n}}$. Bizonyítsuk be, hogy

(a) $\forall n \quad f_n(x)$ differenciálható 0-ban.

(b) $\lim\limits_{n\to\infty} f_n(x) = |x|$

(c) f_n egyenletesen konvergál $|x|$-hez.

(d) $|x|$ nem differenciálható 0-ban.

7.24. Melyik függvényhez konvergál az $f_n(x) = x^n - x^{n+1}$ függvénysorozat a $[0,1]$ intervallumon? Egyenletes-e a konvergencia?

Alkalmazzuk a Weierstrass-kritériumot, azaz keressünk olyan konvergens numerikus sorokat, amelyek tagonként nagyobbak a függvénysor tagjainak abszolút értékénél, és ezzel bizonyítsuk, hogy a függvénysorok egyenletesen konvergensek!

7.25. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + n^4x^{2n}}$

7.26. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \sin^n x$

Konvergensek-e, illetve egyenletesen konvergensek-e $\mathbb{R}$-en a következő függvénysorok?

7.27. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{x^2 + n^2}$

7.28. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} (x^n - x^{n-1})$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

7.29. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{x^4+2^n}$

7.30. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} (\operatorname{arctg}(n+1)x - \operatorname{arctg}\,(nx))$

7.31. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n!}$

7.32. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} 2^n x^n$

7.33. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2[1+(nx)^2]}$

7.34. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^2}$

7.35. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n!+2^n}$

7.36. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{x^n}$

7.37. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^4}{x^4+2^n}$

7.38. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{x^6+3^n}$

7.39. Hol konvergens a $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} x^n$ függvénysor? Egyenletes-e a konvergencia a konvergenciatartományban?

7.40. Egyenletesen konvergens-e a $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(2n-1)x}{2n-1}$ függvénysor?

7.2. Hatványsorok, Taylor-sor

7.41. Konvergens-e $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}(2^n+3^n)x^n$ hatványsor $x=\frac{1}{6}$, $x=0,3$, $x=\frac{1}{2}$, $x=1$ esetén?

Milyen x esetén konvergensek a következő hatványsorok?

7.42. $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n!}{n^n}x^n$

7.43. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{x^n}{n^2}$

7.44. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \left(1+\frac{1}{n}\right)^{n^2} x^n$

7.45. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} nx^n$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

7.46. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$

7.47. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^7}$

Határozzuk meg a következő hatványsorok konvergenciasugarát!

7.48. $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} n^2 x^n$

7.49. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^2}$

7.50. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1000^n}{n!}(x-2)^n$

7.51. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n-1)!}{n^n}(x-3)^n$

7.52. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n} x^n$

7.53. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} (x+4)^n$

7.54. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x+5)^n}{n \cdot 2^n}$

7.55. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-6)^n}{n!}$

7.56. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} n!(x+7)^n$

7.57. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x+1)^n}{\sqrt{n}}$

7.58. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1000^n}{n^2+1} x^n$

7.59. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n+3^n}{n^n} x^n$

7.60. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n \cdot 3^n}$

7.61. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^n}$

7.62. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} 2^n x^n$

7.63. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^n}{\sqrt{n}}$

7.64. $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n!)^2}{(2n)!} x^n$

7.65. $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} n! x^n$

Igazak-e a következő állítások?

7.66. $\displaystyle\int_{-0,2}^{0,3} \left(\sum_{n=0}^{\infty} x^n \right) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\int_{-0,2}^{0,3} x^n \, dx \right)$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

7.67. $\displaystyle\int_{-2}^{3}\left(\sum_{n=0}^{\infty}x^n\right)dx=\sum_{n=1}^{\infty}\left(\int_{-2}^{3}x^n\,dx\right)$

7.68. $\forall x\in\mathbb{R}-\text{re}\quad\left(\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n+1}x^{n+1}\right)'=\frac{1}{1-x}$

7.69. $\forall\,|x|<1-\text{re}\quad\left(\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n+1}x^{n+1}\right)'=\frac{1}{1-x}$

Határozzuk meg a következő hatványsorok konvergenciasugarát! A konvergenciatartomány belsejében adjuk meg az összegfüggvényeket!

7.70. $1+x+x^2+x^3+\cdots$

7.71. $1-x+x^2-x^3+\cdots$

7.72. $x+\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^3}{3}+\cdots$

7.73. $1-x^2+x^4-x^6+x^8-\cdots$

7.74. $x+\dfrac{x^3}{3}+\dfrac{x^5}{5}+\cdots$

7.75. $x+2x^2+3x^3+\cdots$

Hol konvergensek a következő függvénysorok? Adjuk meg az összegfüggvényeket!

7.76. $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}(\sin x)^n$

7.77. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(1+x^2)^n$

7.78. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{0,1+0,2\cos^2 x}\right)^n$

7.79. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2^n x^n}$

Számítsuk ki a következő hatványsorok konvergenciasugarát és összegét:

7.80. $f(x)=\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n(n+1)}$

7.81. $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n+1}$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

7.82. $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} nx^n$

7.83. $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^n$

7.84. $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n(n+1)x^n$

7.85. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$

Adjuk meg a következő függvények $a = 0$ körüli Taylor-sorát! Határozzuk meg a konvergenciatartományokat! Előállítja-e sor a függvényt a konvergenciatartományban?

7.86. e^x

7.87. e^{2x}

7.88. e^{-x}

7.89. e^{-x^2}

7.90. $\operatorname{sh} x$

7.91. $\operatorname{ch} x$

7.92. $\frac{1}{1-x}$

7.93. $\frac{1}{1+x}$

7.94. $\frac{1}{1+x^2}$

7.95. $\frac{x^3}{1-x^2}$

7.96. $\ln(1+x)$

7.97. $\operatorname{arctg} x$

7.98. $\frac{1}{2+x}$

7.99. $f(x) = \frac{1}{1+x+x^2}$

7.100. $\sin x$

7.101. $\cos x$

7.102. $\sin(2x)$

7.103. $\cos x^2$

7.104. $\sin^2 x$

7.105. $\cos^2 x$

Legyen $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, 0-ban akárhányszor differenciálható függvény. Igazak-e a következő állítások? A választ minden esetben indokoljuk meg!

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

7.106. f Taylor-sora mindig felírható.

7.107. f Taylor-sora minden valós x helyen konvergens.

7.108. Ha f Taylor-sora konvergens egy x_0 pontban, akkor abban a pontban a Taylor-sor összege $f(x_0)$.

7.109. Ha egy $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ sor előállítja az f függvényt, akkor ez a hatványsor megegyezik f Taylor-sorával.

7.110. Ha $f(x)$ Taylor-sora $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, akkor minden valós x esetén $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = f(x)$.

7.111. Számítsuk ki 10^{-2} pontossággal $\sin 1$ illetve e értékét!

7.112. Számítsuk ki az $1 - \frac{\pi^2}{2} + \frac{\pi^4}{4!} - \frac{\pi^6}{6!} + \dots + (-1)^n \frac{\pi^{2n}}{(2n)!} + \dots$ összeget!

7.113. Bizonyítsuk be, hogy az $f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{3k}}{(3k)!}$ függvény kielégíti az $f'''(x) = f(x)$ egyenletet!

7.114. Írjuk fel az $f(x) = \int_0^x e^{-t^2}\,dt$ Taylor-sorát! Számítsuk ki $\int_0^1 e^{-x^2}\,dx$ értékét két tizedesjegy pontossággal!

7.115. Bizonyítsuk be, hogy az e szám irracionális!

Számítsuk ki a keresett deriváltakat az $x = 0$ helyen!

7.116. $\left(\frac{1}{1-x}\right)^{(135)}$

7.117. $\left(e^{x^2}\right)^{(136)}$

7.118. $(\operatorname{arctg} x)^{(356)}$

7.119. $(\operatorname{arctg} x)^{(357)}$

---

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

7.120. Írjuk fel az $f(x) = \operatorname{tg} x$ függvény harmadik Taylor-polinomját a 0-ban.

7.121. A fonálinga mozgását leíró törvényben a $\sin x$ függvényt az x függvénnyel közelítik. Mekkora lesz legfeljebb az elkövetett hiba, ha a kitérés szöge legfeljebb $5° < 0,1$ radián?

7.122. Hány tagot vegyünk figyelembe $\sin x$ Taylor-sorából, ha azt akarjuk, hogy $|x| < 0,1$ esetén a hiba legfeljebb 10^{-6} legyen?

7.123. Hány tagot vegyünk figyelembe $\sin x$ Taylor-sorából, ha azt akarjuk, hogy
$|x| < 1 < \frac{\pi}{3} (= 60°)$ esetén a hiba legfeljebb 10^{-3} legyen?

7.124. Fejtsük hatványsorba az $f(x) = x^2 + x + 1$ függvényt

(a) 0-körül; **(b)** 1-körül.

7.125. Fejtsük hatványsorba az $f(x) = \dfrac{1}{2+x}$ függvényt

(a) 0-körül; **(b)** 1-körül.

7.3. Trigonometrikus sorok, Fourier-sor

Állítsuk elő az alábbi függvények Fourier-sorát!

7.126. $\sin^2 x$ **7.127.** $\cos^2 x$

Fejtsük Fourier-sorba a $(-\pi, \pi)$ intervallumon az alábbi függvényeket:

7.128. $f(x) = \operatorname{sgn} x \qquad -\pi < x < \pi$

7.129. $f(x) = \begin{cases} 1 & \text{ha } 0 < x < \pi \\ 0 & \text{ha } -\pi < x < 0 \end{cases}$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

7.130. $f(x) = |\operatorname{sgn} x| \qquad -\pi < x < \pi$

A fenti három függvény megegyezik a $(0, \pi)$ intervallumon!

7.131. $f(x) = x \qquad -\pi < x < \pi$

7.132. $f(x) = |x| \qquad -\pi < x < \pi$

Az előző két függvény megegyezik a $(0, \pi)$ intervallumon!

7.133. $f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{ha } 0 < x < \pi \\ -x^2 & \text{ha } -\pi < x < 0 \end{cases}$

7.134. Legyen most $f(x)$ az a 2π szerint periodikus függvény, amelyikre $f(x) = \dfrac{\pi - x}{2}$, ha $x \in (0, 2\pi)$ és $f(0) = 0$. Ezt a függvényt *fűrészfog-függvénynek* is nevezik.

(a) Fejtsük Fourier-sorba az $f(x)$ függvényt a $(0, 2\pi)$ nyílt intervallumon.

(b) Számoljuk ki a $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{2n+1}$ numerikus sor összegét.


7.135. Legyen f az a periodikus függvény, amelyre $f(x) = x^2$, ha $x \in [-\pi, \pi]$.

(a) Fejtsük Fourier-sorba az $f(x)$ függvényt a $[-\pi, \pi]$ intervallumon.

(b) Számoljuk ki a $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ numerikus sor összegét.

Kirajzoltuk néhány előző feladat függvényeit és a 10-edik (egynél az 5-ödik) Fourier közelítéseit. Melyek ezek a függvények?


7.136.




www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó


7.137.




7.138.



7.139.




7.140.




www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

7.141.





Fejtsük Fourier-sorba a következő függvényeket a $(-\pi, \pi)$ intervallumban!

7.142. e^x

7.143. e^{2x}

7.144. $\operatorname{sh} x$

7.145. $\operatorname{sh} 3x$

7.146. $\operatorname{ch} x$

7.147. $\operatorname{ch} 4x$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

8. fejezet

Többváltozós függvények differenciálása

8.1. Euklideszi terek topológiája.

— A $G \subset \mathbb{R}^n$ halmaz **nyílt** akkor és csak akkor, ha egyetlen határpontját sem tartalmazza.

— Az $F \subset \mathbb{R}^n$ halmazra a következő állítások ekvivalensek:

- Az F halmaz **zárt**.
- Az F halmaz tartalmazza minden határpontját.
- Nem lehet F-ből kikonvergálni, azaz ha

$$\{p_n : n \in \mathbb{N}\} \subset F, \text{ és } p_n \longrightarrow p, \text{ akkor } p \in F.$$

— A $K \subset \mathbb{R}^n$ halmazra a következő állítások ekvivalensek:

- A K halmaz **kompakt**.
- A K halmaz korlátos és zárt.
- Minden K-beli sorozatnak van K-beli ponthoz konvergáló részsorozata.

8.2. Többváltozós Bolzano-Weierstrass-tétel. Korlátos pontsorozatnak van konvergens részsorozata.

8.3. Többváltozós Weierstrass-tétel. Kompakt halmaz folytonos képe kompakt. Speciálisan kompakt halmazon folytonos függvénynek van maximuma (és minimuma).

8.4. Többváltozós Bolzano-tétel. Összefüggő halmaz folytonos képe összefüggő.

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

8.5. Többváltozós derivált.

— Ha az f függvény (totálisan) deriválható a $\mathbf{p}$ pontban, akkor itt folytonos, minden parciális deriváltja létezik, és a derivált koordinátái a megfelelő parciális deriváltak.

— Ha az f függvény parciális deriváltjai léteznek a $\mathbf{p}$ pont egy környezetében, és ezek $\mathbf{p}$-ben folytonosak (**folytonosan deriválható** $\mathbf{p}$-ben), akkor f deriválható $\mathbf{p}$-ben.

— Ha az f függvény (totálisan) deriválható a $\mathbf{p}$ pontban, akkor itt minden $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ irány mentén deriválható, és

$$\frac{\partial}{\partial \mathbf{v}} f(\mathbf{p}) = \frac{1}{|\mathbf{v}|}\mathbf{v} \cdot \operatorname{grad} f(\mathbf{p})$$

Ennek következményeként

$$\max\left\{\left|\frac{\partial}{\partial \mathbf{v}} f(\mathbf{p})\right| : |\mathbf{v}| = 1\right\} = |\operatorname{grad} f(p)|^2$$

— Ha az $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ függvény deriválható a $\mathbf{p}$ pontban, akkor grafikonjának van **érintő hipersíkja** a $\mathbf{p}$ pont felett, és ennek egyenlete

$$y = f(\mathbf{p}) + \operatorname{grad} f \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{p}).$$

8.6. Young-tétel. Ha az n-változós f függvény kétszer folytonosan deriválható a $\mathbf{p}$ pont egy környezetében, akkor minden $1 \leq i, j \leq n$ esetén

$$f''_{x_i x_j}(\mathbf{p}) = f''_{x_j x_i}(\mathbf{p}).$$

8.7. Többváltozós szélsőérték.

— Ha az $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ n-változós függvénynek lokális szélsőértéke van az értelmezési tartomány $\mathbf{p}$ belső pontjában, és $\mathbf{p}$-ben (parciálisan) deriválható, akkor $\operatorname{grad} f(\mathbf{p}) = \mathbf{0}$.

— Tegyük fel, hogy az $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ függvény kétszer folytonosan deriválható a $\mathbf{p}$ pontban és $\operatorname{grad} f(\mathbf{p}) = \mathbf{0}$. Jelölje H az f másodrendű parciális deriváltjaiból álló szimmetrikus Hesse-mátrixot a $\mathbf{p}$ pontban, valamint $Q(\mathbf{x}) = \mathbf{x} \cdot H\mathbf{x}$ a H-hoz tartozó kvadratikus leképezést. Ekkor

- ha Q pozitív definit, akkor $\mathbf{p}$-ben lokális minimum van;

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

- ha Q negatív definit, akkor $\mathbf{p}$-ben lokális maximum van;
- ha Q indefinit, akkor $\mathbf{p}$-ben nincs szélsőérték (nyeregpont);
- ha Q szemidefinit, akkor $\mathbf{p}$-ben ez a próba nem dönti el, hogy van-e szélsőérték.

Speciálisan kétváltozós függvény esetén ha

$$D = \det H = \begin{vmatrix} f''_{xx} & f''_{xy} \\ f''_{yx} & f''_{yy} \end{vmatrix}$$

a Hesse-mátrix determinánsa a $\mathbf{p}$ pontban, akkor

- minimum van, ha $D > 0$ és $f''_{xx} > 0$;
- maximum van, ha $D > 0$ és $f''_{xx} < 0$;
- nincs szélsőérték, ha $D < 0$;
- ez a próba nem dönti el, hogy van-e szélsőérték, ha $D = 0$.

8.8. Feltételes szélsőérték, Lagrange-féle multiplikátor módszer. Ha az $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ függvénynek lokális szélsőértéke van az$\mathbf{a}$ pontban a $g_k(\mathbf{x}) = 0$, $k = 1, 2, \ldots, p$ feltételek mellett, akkor megadhatók olyan $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_p$ valós számok, hogy

$$\frac{\partial}{\partial x_i} f(\mathbf{a}) + \sum_{k=1}^{p} \lambda_k \frac{\partial}{\partial x_i} g_k(\mathbf{a}) = 0, \quad i = 1, 2, \ldots, n$$

8.1. Topológiai alapfogalmak

Írjuk fel a megadott pontok távolságát!

8.1. $\mathbf{p}, \mathbf{q} \in \mathbb{R}^2 \quad \mathbf{p} = (-1, 3) \quad \mathbf{q} = (5, -4)$

8.2. $\mathbf{p}, \mathbf{q} \in \mathbb{R}^3 \quad \mathbf{p} = (-1, 3, 5) \quad \mathbf{q} = (5, -4, 0)$

8.3. $\mathbf{p}, \mathbf{q} \in \mathbb{R}^n \quad \mathbf{p} = (p_1, p_2, \ldots p_n) \quad \mathbf{q} = (q_1, q_2, \ldots q_n)$

8.4. Írjuk fel az origó középpontú, 1 sugarú (nyílt) gömböt meghatározó egyenlőtlenséget $\mathbb{R}^k$-ban, ahol $k = 1, 2, 3, n$.

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

8.5. Írjuk fel a $\mathbf{c}$ középpontú, r sugarú (nyílt) gömböt meghatározó egyenlőtlenséget $\mathbb{R}^k$-ban, ahol $k = 1, 2, 3, n$.

Rajzoljuk le az alábbi halmazokat, határozzuk meg a belső-, külső- és határpontjaikat, és döntsük el mindegyik halmazról, hogy nyílt-e, zárt-e, és hogy korlátos-e!

8.6. $\{h \in \mathbb{R} : -3 < h \leq 5\}$

8.7. $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1\}$

8.8. $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 1 < x^2 + y^2 < 4\}$

8.9. $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : -3 < x < 5\}$

8.10. $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \geq 4\}$

8.11. $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : -1 \leq x, y \leq 1\}$

8.12. $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \geq 0\}$

8.13. $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq -4\}$

Melyik halmaz nyílt, melyik zárt, melyik nyílt is, zárt is, és melyik se nem nyílt, se nem zárt? Indokoljuk a válaszokat! A feladatokban x és y valós számokat jelölnek.

8.14. $H = \{x : 0 < x < 1\}$

8.15. $H = \{(x, 0) : 0 < x < 1\}$

8.16. $H = \{x : 0 \leq x \leq 1\}$

8.17. $H = \{(x, 0) : 0 \leq x \leq 1\}$

8.18. $H = \{x : 0 \leq x < 1\}$

8.19. $H = \{(x, 0) : 0 \leq x < 1\}$

8.20. $H = \{(x, y) : x^2 + y^2 < 1\}$

8.21. $H = \{(x, y, 0) : x^2 + y^2 < 1\}$

8.22. $H = \{(x, y) : x \in \mathbb{Q}, y \in \mathbb{Q}\}$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

8.23. $H = \{(x, y) : 0 < x < 1, 0 < y < 1\}$

Adjuk meg a következő síkbeli halmazok belső pontjait, külső pontjait és határpontjait!

8.24. $H = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 1, 0 \leq x \leq 1\}$

8.25. $H = \{(x, y) : 0 \leq x < 1, 0 < y \leq 1\}$

8.26. $H = \{(x, y) : x \in \mathbb{Q}, y \in \mathbb{Q}, 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$

8.27. $H = \{(x, y) : 0 < x < 1, y = 0\}$

Adjuk meg a következő térbeli halmazok belső pontjait, külső pontjait és határpontjait!

8.28. $H = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 + z^2 < 1\}$

8.29. $H = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$

8.30. $H = \{(x, y, z) : x \in \mathbb{Q}, y \in \mathbb{Q}, z \in \mathbb{Q}, 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, 0 \leq z \leq 1\}$

8.31. $H = \{(x, y, z) : x \in \mathbb{Q}, 0 < x < 1, y = z = 0\}$

8.32. Legyen $H \subset \mathbb{R}^n$. Igazak-e a következő állítások?

(a) Ha $x \in H$, akkor x belső pontja H-nak.

(b) Ha $x \notin H$, akkor x nem lehet belső pontja H-nak.

(c) Ha $x \in H$, akkor x nem lehet határpontja H-nak.

(d) Ha $x \notin H$, akkor x nem lehet határpontja H-nak.

(e) Van olyan halmaz, amelynek minden pontja határpont.

(f) Van olyan halmaz, amelynek minden pontja belső pont.

(g) Van olyan halmaz, amelynek nincs belső pontja.

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

8.2. Többváltozós függvények grafikonja

Számítsuk ki a következő függvények helyettesítési értékét a megadott p pontokban!

8.33. $f(x,y) = x + y^2 \quad \mathbf{p} = (2,3)$

8.34. $f(x,y) = \operatorname{arctg} x + \arcsin xy \quad \mathbf{p} = (\pi/4, 0)$

8.35. $f(x,y,z) = x^{(y^z)} \quad \mathbf{p} = (4,3,2)$

8.36. $f(x,y,z) = x^{y^z} \quad \mathbf{p} = (4,3,2)$

Adjuk meg a következő függvények helyettesítési értékét a megadott görbék pontjaiban!

8.37. $f(x,y) = x^2 + y^2$, $y = x$, illetve $x^2 + y^2 = 1$

8.38. $f(x,y) = x - y$, $y = x$, illetve $y = x^2$

8.39. $f(x,y) = \sin x$, $x = \pi/4$, illetve $y = \pi/4$

8.40. $f(x,y) = \sin xy$, $x = \pi/4$, illetve $y = \pi/4$

8.41. Keressük meg a következő kétváltozós függvények grafikonjait az ábrák között!


(a) $x^2 + y^2$ **(b)** $(x+y)^2$ **(c)** $x^2 - y^2$

(d) xy **(e)** $\sin x + \sin y$ **(f)** $\sin x \sin y$


www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó


(A)




(B)




(C)




(D)



(E)



(F)




www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán


© Typotex Kiadó

8.42. Az előző függvényeknek kirajzoltuk a szintvonalait is. Keressük meg a rajzokhoz tartozó képleteket!


(A)




(B)




(C)




(D)



(E)



(F)



www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

Ábrázoljuk a következő függvények szintvonalait! Készítsünk a függvények grafikonjáról térbeli rajzot!

8.43. $(x+y)^2$

8.44. $\sqrt{x^2+y^2}$

8.45. xy

8.46. $(x-y)^2$

8.47. x^2+y^2,

8.48. $|x|$

8.49. x^2-y^2

8.50. $|x+y|$

Határozzuk meg a következő függvények szintfelületeit!

8.51. $f(x,y,z)=x+y+z$

8.52. $f(x,y,z)=x^2+y^2+z^2$

8.53. $f(x,y,z)=x+y$

8.54. $f(x,y,z)=y^2$

Döntsük el az alábbi térbeli halmazokról, hogy lehetnek-e grafikonjai-e valamilyen kétváltozós függvénynek! Ha igen, akkor adjunk meg ilyen függvényt!

8.55. sík

8.56. gömbfelület

8.57. kúppalást

8.58. hengerpalást

8.59. félhenger palástja

8.60. félgömb felülete

Határozzuk meg a következő függvények lehetséges legbővebb értelmezési tartományát!

8.61. $f(x,y)=\dfrac{x+y}{x-y}$

8.62. $f(x,y)=\sqrt{1-x^2}+\sqrt{y^2+1}$

8.63. $f(x,y)=\dfrac{1}{x^2+y^2}$

8.64. $f(x,y)=\sqrt{1-x^2-y^2}$

8.65. $f(x,y,z)=\dfrac{z}{\sin x}\cos y$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

8.66. $f(x,y,z) = \dfrac{x}{y-z} + \dfrac{y}{x+z} - \dfrac{z}{x^2-y^2}$

8.3. Többváltozós határérték, folytonosság

Van-e a következő többváltozós függvényeknek határértéke az adott pontokban? Ha igen, mennyi? Hol folytonosak ezek a függvények?

8.67. $f(x,y) = 7$ $\quad \mathbf{p} = (0,0)$

8.68. $f(x,y) = x + y$ $\quad \mathbf{p} = (3,5)$

8.69. $f(x,y) = \dfrac{x}{y}$ $\quad \mathbf{p} = (3,0)$

8.70. $f(x,y) = \dfrac{\sin xy}{x}$ $\quad \mathbf{p} = (0,2)$

8.71. $f(x,y) = \dfrac{\sin xy}{\operatorname{tg} 2xy}$ $\quad \mathbf{p} = (0,3)$

8.72. $f(x,y) = \dfrac{\sin x - \sin y}{x-y}$ $\quad \mathbf{p} = (0,0)$

8.73. $f(x,y) = \dfrac{\sin x - \sin y}{e^x - e^y}$ $\quad \mathbf{p} = (0,0)$

8.74. $\sqrt{x+y-1}$ $\quad \mathbf{p} = (0,0)$

8.75. $xy\ln(x^2+y^2)$ $\quad \mathbf{p} = (0,0)$

8.76. $f(x,y) = \begin{cases} 1, & \text{ha } x \neq 0 \text{ és } y \neq 0 \\ 0, & \text{ha } x = 0 \text{ vagy } y = 0 \end{cases}$ $\quad \mathbf{p} = (0,0), \quad \mathbf{q} = (0,1)$

8.77. $f(x,y) = \begin{cases} 1, & \text{ha } x \neq 0 \\ 0, & \text{ha } x = 0 \end{cases}$ $\quad \mathbf{p} = (0,0),\ \mathbf{q} = (0,1),\ \mathbf{r} = (1,0)$

8.78. $f(x,y) = \begin{cases} 1, & \text{ha } x^2+y^2 \neq 0 \\ 0, & \text{egyébként} \end{cases}$ $\quad \mathbf{p} = (0,0), \quad \mathbf{q} = (0,1)$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

8.79. $f(x,y) = \begin{cases} x, & \text{ha } x = y \\ 0, & \text{egyébként} \end{cases}$ $\mathbf{p} = (0,0), \quad \mathbf{q} = (0,1)$

8.80. $f(x,y) = \begin{cases} 1, & \text{ha } x = y \\ 0, & \text{egyébként} \end{cases}$ $\mathbf{p} = (0,0), \quad \mathbf{q} = (0,1)$

8.81. Legyen $f(x,y) = \dfrac{x-y}{x+y}$. Léteznek-e a következő határértékek?

(a) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)$ **(b)** $\lim\limits_{x\to 0}\left(\lim\limits_{y\to 0} f(x,y)\right)$

(c) $\lim\limits_{y\to 0}\left(\lim\limits_{x\to 0} f(x,y)\right)$ **(d)** $\lim\limits_{x\to 0} f(x,x)$

8.82. Legyen $f(x,y) = (x+y)\sin\dfrac{1}{x}\sin\dfrac{1}{y}$. Léteznek-e a következő határértékek?

(a) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)$ **(b)** $\lim\limits_{x\to 0}\left(\lim\limits_{y\to 0} f(x,y)\right)$

(c) $\lim\limits_{y\to 0}\left(\lim\limits_{x\to 0} f(x,y)\right)$ **(d)** $\lim\limits_{x\to 0} f(x,x)$

8.83. Legyen

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{2xy}{x^2+y^2}, & \text{ha } x^2+y^2 \neq 0 \\ 0, & \text{egyébként} \end{cases}.$$

Bizonyítsuk be, hogy a $g(x) = f(x,0)$ és a $h(y) = f(0,y)$ függvények folytonosak $x = 0$-ban, illetve $y = 0$-ban! Bizonyítsuk be, hogy az $f(x,y)$ függvény nem folytonos $(x,y) = (0,0)$-ban!

8.84. Bizonyítsuk be, hogy ha $f(x,y)$ folytonos a síkon, akkor

(a) a $G = \{(x,y) : f(x,y) > 0\}$ halmaz nyílt;

(b) az $F = \{(x,y) : f(x,y) \geq 0\}$ halmaz zárt!

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

8.4. Parciális és totális derivált

8.85. Mutassunk példát olyan kétváltozós függvényre, amelynek mindkét parciális deriváltja létezik az origóban, de a függvény nem folytonos az origóban!

Határozzuk meg a következő függvények parciális deriváltjait!

8.86. $f(x,y) = x \sin y$

8.87. $f(x,y) = \sin(xy)$

8.88. $f(x,y) = (x+2y)\sin(x+2y)$

8.89. $f(x,y) = 3x^2y^4 - 4$

8.90. $f(x,y) = \dfrac{x+y}{x-y^2}$

8.91. $f(x,y) = (5x+y^2)^{e^{x^2}+3y}$

8.92. $g(x,y,z) = \sin z \cdot (\cos x)^{\ln y}$

8.93. $g(x,y,z) = \left(\dfrac{x}{y}\right)^z$

8.94. $f(x,y) = x^2 + xy + y^2$

8.95. $f(x,y) = e^{x-y}$

8.96. $g(x,y,z) = x^{y^z}$

8.97. $g(x,y,z) = \dfrac{z \operatorname{arctg} x^2y}{1+\ln(xy^3+2x\sqrt{z})}$

8.98. $f(x,y,z) = \sin(x^2+y^3+z^4)$

8.99. $f(x,y) = \operatorname{arctg} \dfrac{1-x}{1-y}$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

8.100. $f(x,y) = x^y + y^x$

8.101. $f(x,y,z) = x^{yz}$

8.102. Parciálisan deriválható-e $f(x,y) = |x| + |y|$ a $(0,0)$ pontban?

8.103. Mi a következő két állítás logikai kapcsolata, azaz melyikből következik a másik?

P: $f(x,y)$ folytonos $(0,0)$-ban
Q: $f(x,y)$ parciális deriváltjai léteznek $(0,0)$-ban

8.104. Tudjuk, hogy $f(1,2) = 3$, továbbá hogy minden (x,y) pontban $f'_x(x,y) = 0$ és $f'_y(x,y) = 0$. Mennyi lehet $f(5,10)$?

8.105. Hol folytonosak az

$$f(x,y) = \begin{cases} (x+y)\sin\dfrac{1}{x}\sin y, & \text{ha } x \neq 0 \text{ és } y \neq 0 \\ 0, & \text{ha } x = 0 \text{ vagy } y = 0 \end{cases}$$

függvény parciális derivált függvényei?

Határozzuk meg a következő függvények második parciális deriváltjait!

8.106. $g(x,y,z) = xy^2 \sin z$

8.107. $g(x,y,z) = \dfrac{x}{y+z}$

8.108. $g(x,y,z) = 2 + x + y^2 + z^3$

8.109. $g(x,y,z) = \ln(x + y^2 + z^3)$

Írjuk fel a következő függvények iránymenti deriváltjait az adott pontokban az adott irányban!

8.110. $f(x,y) = x + y^2$ $\qquad \mathbf{p} = (2,3), \quad \mathbf{v} = (3,4)$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

8.111. $f(x,y) = \sin xy$ $\quad \mathbf{p} = (0,0), \quad \mathbf{v} = (1,-1)$

8.112. $f(x,y) = e^{x+y} \cdot \ln y$ $\quad \mathbf{p} = (0,1), \quad \mathbf{v} = (-4,3)$

8.113. $f(x,y) = \dfrac{x}{y}$ $\quad \mathbf{p} = (1,1), \quad \mathbf{v} = (-1,-1)$

Határozzuk meg a következő függvények $\alpha = 30°$-os szöghöz tartozó iránymenti deriváltját a $(3,5)$ pontban!

8.114. $f(x,y) = x^2 - y^2$

8.115. $h(x,y) = x\mathrm{e}^y$

Milyen irányban lesz az iránymenti derivált maximális, illetve minimális a $(-4,2)$ pontban?

8.116. $f(x,y) = (x-y)^2$

8.117. $g(x,y) = x^2 + \dfrac{2}{xy}$

Egy terepasztal felületét az $f(x,y)$ függvénnyel adjuk meg. Milyen irányban indul el a felület adott $A = (1,2)$, $B = (2,1)$, $C = (2,0)$ és $D = (-2,1)$ pontjai fölé helyezett golyó?

8.118. $e^{-(x^2+y^2)}$

8.119. $x^3 + y^3 - 9xy$

8.120. Egy buckás domb felületét az $f(x,y) = -x^2 + \sin y$ függvény adja meg, ha $-2 \le x \le 2, -10 \le y \le 10$. Milyen irányban induljon el a síelő a $\mathbf{p} = (1, \pi/3)$ pontból, ha a lehető legmeredekebb pályán akar lecsúszni?

8.121. Legyen $f(x,y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$. Írja fel az $(1/2, 1/2)$ ponton áthaladó szintvonal egyenletét, valamint a szintvonal érintőjét az $(1/2, 1/2)$ pontban! Írjuk fel a függvény gradiensét az $(1/2, 1/2)$ pontban! Mekkora szöget zár be a szintvonal érintője a gradienssel?

8.122. Adjunk példát olyan $f(x,y)$ függvényre, ahol a gradiens létezik, de nem merőleges a szintvonal érintőjére!

Segítség: vizsgáljuk az

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

$$f(x,y)=\begin{cases}0, & \text{ha } (x-1)^2+y^2=1\\ y, & \text{ha } x=0 \text{ és } y\neq 0\\ x & \text{egyébként}\end{cases}$$

függvényt az origóban!

8.123. Legyen $f(x,y)=\sqrt{1-x^2-y^2}$. Ellenőrizzük, hogy az $(1/2,1/2)$ pontban a függvény gradiense merőleges a szintvonal érintőjére!

8.124. Írjuk fel az $f(x,y)=\operatorname{sgn} x \operatorname{sgn} y$ függvény gradiensét azokban a pontokban, ahol létezik!

Egy terepasztal felületét az $f(x,y)$ függvény adja meg. Tegyük fel, hogy az x tengely kelet felé, az y tengely pedig észak felé mutat. Határozzuk meg a $\mathbf{p}$ ponton átmenő, észak-északnyugati irányban induló ösvény meredekségét a $\mathbf{p}$ pontban!

8.125. $f(x,y)=x^2-y^2 \quad \mathbf{p}=(1,2,-3)$

8.126. $x^3+y^3-9xy \quad \mathbf{p}=(2,0,8)$

8.127. Legyen $f(x,y)=\begin{cases}xy\dfrac{x^2-y^2}{x^2+y^2}, & \text{ha } x^2+y^2\neq 0\\ 0, & \text{ha } x^2+y^2=0\end{cases}$

(a) Mennyi $f'_x(0,0)$ és $f'_y(0,0)$?

(b) Mennyi $f'_x(0,y)$ ha $y\neq 0$ és mennyi $f'_y(x,0)$ ha $x\neq 0$?

(c) Mennyi $f''_{xy}(0,0)$ és $f''_{yx}(0,0)$?

(d) Miért nincs ez ellentmondásban Young tételével?

(e) Differenciálható-e kétszer f a $(0,0)$-ban?

8.128. Legyen $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ függvény. Melyik állítás igaz és melyik hamis az alábbiak közül? Ha egy állítás hamis, adjunk ellenpéldát!

(a) Ha f folytonos a $\mathbf{p}$ pontban, akkor ott differenciálható.

(b) Ha f differenciálható a $\mathbf{p}$ pontban, akkor f a $\mathbf{p}$ pontban folytonos.

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

(c) Ha f-nek léteznek a parciális deriváltjai a $\mathbf{p}$ pontban, akkor f a $\mathbf{p}$ pontban folytonos.

(d) Ha f-nek léteznek és folytonosak a parciális deriváltjai a $\mathbf{p}$ pontban, akkor f a $\mathbf{p}$ pontban differenciálható.

(e) Ha f-nek léteznek és folytonosak a parciális deriváltjai a $\mathbf{p}$ pontban, akkor f a $\mathbf{p}$ pontban folytonos.

(f) Ha f differenciálható a $\mathbf{p}$ pontban, akkor f-nek $\mathbf{p}$-ben léteznek a parciális deriváltjai.

(g) Ha $\mathbf{p}$-ben f-nek léteznek a másodrendű parciális deriváltjai, akkor f 2-szer differenciálható $\mathbf{p}$-ben.

(h) Ha $\mathbf{p}$-ben f-nek léteznek és folytonosak a másodrendű parciális deriváltjai, akkor f 2-szer differenciálható $\mathbf{p}$-ben.

(i) Ha f a $\mathbf{p}$ pontban 2-szer differenciálható, akkor $\mathbf{p}$-ben léteznek f másodrendű parciális deriváltjai.

(j) Ha f a $\mathbf{p}$ pontban 2-szer differenciálható, akkor $\mathbf{p}$-ben léteznek f parciális deriváltjai, és a parciális deriváltak $\mathbf{p}$-ben folytonosak.

Van-e olyan $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ függvény, amelyre

8.129. $f'_x(x,y) = \sin y,\ f'_y(x,y) = x\cos y$

8.130. $f'_x(x,y) = e^{xy},\ f'_y(x,y) = \cos(x-y)$

Határozzuk meg az alábbi függvényeket a megadott pontokban érintő síkok illetve hipersíkok egyenletét!

8.131. $f(x,y) = x^y$ $\quad \mathbf{p} = (2,3)$

8.132. $f(x,y) = \sin(xy)$ $\quad \mathbf{p} = (1/2, \pi)$

8.133. $f(x,y,z) = xy^2 - z^3$ $\quad \mathbf{p} = (3,2,1)$

8.134. $f(x_1,\dots,x_n) = x_1 \cdot x_2 \cdot \ldots \cdot x_n$ $\quad \mathbf{p} = (1,2,\dots,n)$

Írjuk fel a $G(t) = F(\mathbf{r}(t))$ összetett függvényt! Határozzuk meg $G'(t)$-t közvetlenül a képletből, és a láncszabály segítségével is!

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

8.135. $F(x,y) = x^2 + y^2$ $\quad \mathbf{r}(t) = \cos t \cdot \mathbf{i} + \sin t \cdot \mathbf{j}$ $\quad t \in [0, 2\pi]$

8.136. $F(x,y) = x^2 - y^2$ $\quad \mathbf{r}(t) = \cos t \cdot \mathbf{i} + \sin t \cdot \mathbf{j}$ $\quad t \in [0, 2\pi]$

8.137. $F(x,y) = x^2 + y^2$ $\quad \mathbf{r}(t) = t \cdot \mathbf{i} + 3t \cdot \mathbf{j}$ $\quad t \in [0, 10]$

Írjuk fel a következő összetett leképezések Jacobi-mátrixát.

8.138. $g(t) = (\sin t, \cos t), \quad f(x,y) = x + y, \quad h = f \circ g.$

8.139. $f(u,v) = (\sin uv, \cos uv), \quad g(x,y) = x^2 + y^2, \quad h = g \circ f$

8.140. $f(u,v) = \left(u^2v^2, \dfrac{1}{uv}\right), \quad g(x,y) = \ln x + \ln y, \quad h = g \circ f.$

Adjuk meg a következő síkbeli leképezések Jacobi-mátrixát!

8.141. $\mathbf{v} = \sin xy \cdot \mathbf{i} + x \cos y \cdot \mathbf{j}$

8.142. $\mathbf{v} = \dfrac{xy}{1+x^2} \cdot \mathbf{i} + \dfrac{x}{x^2+y^2} \cdot \mathbf{j}$

8.143. $\mathbf{v} = (\ln x + \ln y) \cdot \mathbf{i} + x^2 \cdot \mathbf{j}$

8.144. $\mathbf{v} = \sin(x + 3y^2) \cdot \mathbf{i} + e^{xy} \cdot \mathbf{j}$

8.145. Legyen $F(x,y) = xy$, és legyenek $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, $g : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ differenciálható függvények! Írjuk fel az $F(f,g)$ összetett függvény deriváltját a láncszabály segítségével!

8.146. Legyen $\mathbf{r} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$ differenciálható, és legyen $f(x,y) = x + y$. Írjuk fel $f \circ \mathbf{r}$ deriváltját a láncszabály segítségével!

Írjuk fel a következő függvények P ponton áthaladó szintvonalainak érintőjét a P pontban!

8.147. $f(x,y) = x^y, \qquad P(3,5)$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

8.148. $f(x,y) = x^2 - y^2$ $P(5,3)$

8.5. Többváltozós szélsőérték

Van-e abszolút szélsőértékük a következő függvényeknek az adott halmazokon? Indokoljuk a válaszokat!

8.149. $f(x) = \dfrac{1}{x}$ $H = \{(x) : x \neq 0\}$

8.150. $f(x) = \sin^2 \sqrt[7]{x^3}$ $H = \{(x) : x \in \mathbb{R}\}$

8.151. $f(x,y) = \dfrac{y}{x}$ $H = \{(x,y) : x \neq 0\}$

8.152. $f(x,y) = x^2 + e^y \sin\left(x^3y^2\right)$ $H = \{(x,y) : x^2 + y^2 \leq 1\}$

8.153. $f(x,y) = x^2 + y^2$ $H = \{(x,y) : x^2 + y^2 < 1\}$

8.154. $f(x,y) = x + y$ $H = \{(x,y) : 0 < x < 1, 0 < y < 1\}$

8.155. $f(x,y) = xy$ $H = \{(x,y) : 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$

8.156. $f(x,y,z) = xyz$ $H = \{(x,y,z) : (x-1)^2 + (y+2)^2 + (z-3)^2 \leq 4\}$

Határozzuk meg a következő függvények abszolút szélsőértékeit a megadott halmazokon!

8.157. $f(x,y) = x^3y^2(1-x-y)$ $H = \{(x,y) : 0 \leq x, 0 \leq y, x + y \leq 1\}$

8.158. $f(x,y) = x^2 + y^2 + (x+y+1)^2$ $H = \mathbb{R}^2$

8.159. $f(x,y) = x - y - 3$ $H = \{(x,y) : x^2 + y^2 \leq 1\}$

8.160. $f(x,y) = \ln x \cdot \ln y + \dfrac{1}{2}\ln x + \dfrac{1}{2}\ln y$
$H = \{(x,y) : \dfrac{1}{e} \leq x \leq e, \dfrac{1}{e} \leq y \leq e\}$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

8.161. $f(x,y) = \sin x + \sin y + \sin(x+y)$
$H = \{(x,y) : 0 \le x \le \frac{\pi}{2}, 0 \le y \le \frac{\pi}{2}\}$

8.162. $f(x,y) = x^2 - 2xy + 2y^2 - 2x + 4y$
$H = \{(x,y) : |x| \le 3, |y| \le 3\}$

Keressük meg a következő függvények lokális szélsőértékhelyeit, ha vannak!

8.163. $f(x,y) = 3x^2 + 5y^2$

8.164. $f(x,y) = (2x - 5y)^2$

8.165. $f(x,y) = 2x^2 - 3y^2$

8.166. $f(x,y) = 2x^2 - y^2 + 4x + 4y - 3$

8.167. $f(x,y) = x^2 + y^2 - 6x + 8y + 35$

8.168. $f(x,y) = 3 - \sqrt{2 - (x^2 + y^2)}$

8.169. $f(x,y) = -y^2 + \sin x$

8.170. $f(x,y) = e^{-(x^2+y^2)}$

8.171. $f(x,y) = (x - y^2)(2x - y^2)$

8.172. $f(x,y) = -2x^2 - 2xy - 2y^2 + 36x + 42y - 158$

8.173. Van-e olyan egyváltozós polinom, amelynek értékkészlete $(0,\infty)$? Ha igen, adjunk rá példát! Van-e olyan kétváltozós polinom, amelynek értékkészlete $(0,\infty)$? Ha igen, adjunk rá példát!

8.174. Adjunk meg olyan kétváltozós függvényt, amelyiknek végtelen sok szigorú lokális maximuma van, de nincs lokális minimuma!

8.175. Határozzuk meg a $2x+3y+4z$ függvény maximumát és minimumát az origó középpontú 1 sugarú gömb felszínén!

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

8.176. Határozzuk meg a $\mathbf{p}(t) = 2t \cdot \mathbf{i} + t \cdot \mathbf{j} + (1-t) \cdot \mathbf{k}$ és a $\mathbf{q}(t) = 3t \cdot \mathbf{i} + t \cdot \mathbf{j} + (2t-1) \cdot \mathbf{k}$ egyenesek távolságát!

8.177. Igazak-e a következő állítások?

(a) Ha $f'_x(x_0, y_0) = 0$, akkor f-nek az (x_0, y_0) pontban lokális szélsőértékhelye van.

(b) Ha $f'_x(x_0, y_0) = 0$ és $f'_y(x_0, y_0) = 0$, akkor f-nek az (x_0, y_0) pontban lokális szélsőértékhelye van.

(c) Ha $f''_{xy}(x_0, y_0) = 0$ és $f''_{yx}(x_0, y_0) = 0$, akkor f-nek az (x_0, y_0) pontban lokális szélsőértékhelye van.

(d) Ha $f''_{xx}(x_0, y_0) f''_{yy}(x_0, y_0) - (f''_{xy}(x_0, y_0))^2 < 0$, akkor f-nek az (x_0, y_0) pontban nincs lokális szélsőértékhelye.

(e) Ha $f''_{xx}(x_0, y_0) f''_{yy}(x_0, y_0) - (f''_{xy}(x_0, y_0))^2 \leq 0$, akkor f-nek az (x_0, y_0) pontban nincs lokális szélsőértékhelye.

(f) Ha $f''_{xx}(x_0, y_0) < 0$, akkor f-nek az (x_0, y_0) pontban nincs lokális minimumhelye.

Mely $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ pontokban nulla az $f(x, y)$ függvény mindkét parciális deriváltja? Mely $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ pontokban van az $f(x, y)$ függvénynek lokális szélsőértékhelye?

8.178. $f(x, y) = x^3$

8.179. $f(x, y) = x^2$

8.180. $f(x, y) = x^2 - y^2$

8.181. $f(x, y) = x^2 + y^2$

8.182. $f(x, y) = (x + y)^2$

8.183. $f(x, y) = x^3 + y^3$

8.184. $f(x, y) = e^{-(x^2+y^2)}$

8.185. $f(x, y) = x^2 + \sin y$

8.186. $f(x, y) = 3x^2 + 5y^2$

8.187. $f(x, y) = \frac{2}{3}x^3 + y^4 + xy$

8.188. $f(x, y) = xy$

8.189. $f(x, y) = e^{y^2 - x^2}$

8.190. $f(x, y, z) = xyz + x^2 + y^2 + z^2$

8.191. $f(x, y) = x^3 - y^3$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

8.192. $f(x,y) = x^4 + y^4$

8.193. $f(x,y) = -2x^2 - y^4$

8.194. $f(x,y) = (2x-5y)^2$

8.195. $f(x,y) = (1+e^y)\cos x - ye^y$

Egy hegy felületét az $F(x,y) = 30 - \frac{x^2}{100} - \frac{y^2}{100}$ függvény írja le. Adjuk meg a kiránduló ösvény legmagasabb pontját, ha az ösvény pontjainak koordinátái kielégítik a következő feltételeket:

8.196. $3x + 3y = \pi \sin x + \pi \sin y$

8.197. $4x^2 + 9y^2 = 36$

8.198. $y = \dfrac{1}{1+x^2}$

8.199. $x^2 + y^2 = 25$

Határozzuk meg f maximumát a megadott feltétel mellett!

8.200. $f(x,y) = xy$, $x^2 + y^2 = 1$

8.201. $f(x,y,z) = x - y + 3z$, $x^2 + \dfrac{y^2}{2} + \dfrac{z^2}{3} = 1$

8.202. $f(x,y,z) = xyz$, $x^2 + y^2 + z^2 = 3$

8.203. $f(x,y) = xy$, $x + y + z = 5$

8.204. $f(x,y) = xyz$, $xy + yz + xz = 8$

8.205. $f(x,y) = xyz$, $xy + yz + xz = 8$, $x, y, z \geq 0$

8.206. Egy részecske az $x^2 + y^2 = 25$ körpályán mozoghat azon a síkon, ahol az (x,y) pontban az energiája $E(x,y) = x^2 + 24xy + 8$. Van-e a részecskének stabil egyensúlyi helyzete?

8.207. Egy üzemben a gyártott termék mennyisége az x és y paraméterektől függ:
$M(x,y) = xy$. A termelési költség $C(x,y) = 2x + 3y$. Legfeljebb mennyi terméket gyárthat az üzem, ha $C(x,y) = 10$ egységnyi pénze van a termelés költségeire?

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

8.208. Adott térfogatú téglák közül melyiknek a legkisebb a felszíne?

8.209. Határozzuk meg annak a háromszögnek a szögeit, amelynek a kerülete K, és a területe maximális!

8.210. Határozzuk meg a $3x^2+2y^2+z^2=9$ egyenletű ellipszoidot az $(1,-1,2)$ pontban érintő sík egyenletét!

8.211. Legyen $P=(3,-7,-1)$, $Q=(5,-3,5)$, S pedig az a Q-n átmenő sík, amelyik merőleges a PQ szakaszra!

(a) Írjuk fel az S sík egyenletét!

(b) Írjuk fel a sík egy pontjának és az origónak a távolságát!

(c) Melyik pontja van az S síknak legközelebb az origóhoz?

(d) Mutassuk meg, hogy az előbb kapott pontot az origóval összekötő szakasz merőleges az S síkra! Magyarázzuk meg geometriailag is, hogy ez miért van így!

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

9. fejezet
Többváltozós Riemann-integrál

9.1. Jordan-mérhető halmazok tulajdonságai.

— Ha $A \subset \mathbb{R}^n$ korlátos, akkor $b(A) = b(\operatorname{int} A),\ k(A) = k\left(\overline{A}\right)$.

— Az $A \subset \mathbb{R}^n$ korlátos halmaz akkor és csak akkor Jordan-mérhető, ha határa nullmértékű.

— Ha $A \subset \mathbb{R}^n$ Jordan-mérhető, és $f : A \to \mathbb{R}$ korlátos, akkor f pontosan akkor integrálható, ha $\operatorname{graf} f \subset \mathbb{R}^{n+1}$ nullmértékű.

9.2. Az integrál tulajdonságai.

— Ha A Jordan-mérhető halmaz, akkor $t(A) = \int\limits_A \chi_A$, ahol χ_A az A halmaz **karakterisztikus függvénye**,

$$\chi_A(x) = \begin{cases} 1 & \text{ha } x \in A \\ 0 & \text{ha } x \notin A \end{cases}$$

— Ha A és B két korlátos halmaz, $\operatorname{int} A \cap \operatorname{int} B = \emptyset$ (**egymásba nem nyúló halmazok**), f integrálható A-n és B-n is, akkor f integrálható a $C = A \cup B$ halmazon és

$$\int\limits_C f = \int\limits_A f + \int\limits_B f.$$

— Mérhető zárt halmazon folytonos függvény integrálható.

— Ha f és g egy nullmértékű halmazt kivéve megegyezik a mérhető A halmazon, és f integrálható A-n, akkor g is integrálható A-n, és

$$\int\limits_A f = \int\limits_A g.$$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

— Ha f és g integrálható az A halmazon, c pedig egy tetszőleges valós szám, akkor $f+g$ és $c\cdot f$ is integrálható, és

$$\int_A (f+g) = \int_A f + \int_A g, \qquad \int_A (c\cdot f) = c\int_A f.$$

9.3. Integrálási módszerek.

— **Szukcesszív integrálás - Fubini-tétel.**

Legyen $A \subset \mathbb{R}^{n-1}$ egy zárt Jordan-mérhető halmaz, $B = [a,b]\times A \subset \mathbb{R}^n$ és $f : B \to \mathbb{R}$ folytonos, akkor

$$\iint_B f(x,y)\,dx\,dy = \int_a^b \left(\int_A f(x,y)\,dy \right) dx$$

— **Integrálás normáltartományon.**

Legyen $A \subset \mathbb{R}^{n-1}$ egy zárt Jordan-mérhető halmaz, $\varphi : A \to \mathbb{R}$, $\psi : A \to \mathbb{R}$ két folytonos függvény, $\varphi \le \psi$ az A pontjaiban,

$$N = \{(x,y) : x \in A, \varphi(x) \le y \le \psi(x)\} \subset \mathbb{R}^n, \qquad f : N \to \mathbb{R}$$

folytonos függvény. Ekkor N Jordan-mérhető, f integrálható N-en, és

$$\iint_N f(x,y)\,dx\,dy = \int_A \left(\int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} f(x,y)\,dy \right) dx.$$

— **Integráltranszformáció.**

Legyen $A \subset \mathbb{R}^n$ zárt Jordan-mérhető halmaz, $\Phi : A \to \mathbb{R}^n$ folytonos, int A-n egy-egy értelmű és folytonosan deriválható, $B = \{\Phi(x) : x \in A\} = \Psi(A)$, valamint $f : B \to \mathbb{R}$ folytonos függvény. Ekkor B (zárt) Jordan-mérhető halmaz, és

$$\int_B f(y)\,dy = \int_A |J|\, f(\Psi(x))\,dx,$$

ahol $J = \det(\Psi')$ a Ψ leképezés **Jacobi-determinánsa**.

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

9.1. Jordan-mérték

Van-e területe a következő síkbeli halmazok határának? Ha igen, határozzuk meg a területét!

9.1. $H = \{(x, y) : 0 \leq x < 1, 0 < y \leq 1\}$

9.2. $H = \{(x, y) : x \in \mathbb{Q}, y \in \mathbb{Q}, 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$

Van-e térfogata a következő térbeli halmazok határának? Ha igen, határozzuk meg a térfogatát!

9.3. $H = \{(x, y, z) : 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, 0 \leq z \leq 1\}$

9.4. $H = \{(x, y, z) : x \in \mathbb{Q}, y \in \mathbb{Q}, z \in \mathbb{Q}, 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, 0 \leq z \leq 1\}$

Határozzuk meg a következő síkbeli halmazok külső és belső területét! Melyik halmaz mérhető?

9.5. $H = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$

9.6. $H = \{(x, y) : 0 \leq x < 1, 0 < y \leq 1\}$

9.7. $H = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x\}$

9.8. $H = \{(x, y) : x \in \mathbb{Q}, y \in \mathbb{Q}, 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$

Határozzuk meg a következő térbeli halmazok külső és belső mértékét! Melyik halmaz mérhető?

9.9. $H = \{(x, y, z) : 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, 0 \leq z \leq 1\}$

9.10. $H = \{(x, y, z) : 0 \leq x < 1, 0 < y < 1, 0 < z < 1\}$

9.11. $H = \{(x, y, z) : 0 < x < 1, 0 < y < 1, 0 < z < x + y\}$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

9.12. $H = \{(x, y, z) : x \in \mathbb{Q}, y \in \mathbb{Q}, z \in \mathbb{Q}, 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, 0 \leq z \leq 1\}$

9.13. Bizonyítsuk be, hogy egy korlátos halmaz pontosan akkor mérhető, ha a határának a mértéke 0.

9.14. Bizonyítsuk be, hogy ha a H_1 és H_2 halmazok mérhetők, akkor a $H_1 \cup H_2, H_1 \setminus H_2, H_1 \cap H_2$ halmazok is mérhetők!

9.15. Van-e olyan korlátos A és B síkbeli halmaz, amelyikre teljesül, hogy

(a) $b(A \cup B) > b(A) + b(B)$? **(b)** $k(A \cup B) < k(A) + k(B)$?

9.16. Van-e olyan korlátos és diszjunkt A és B síkbeli halmaz, amelyikre teljesül, hogy

(a) $b(A \cup B) > b(A) + b(B)$? **(b)** $k(A \cup B) < k(A) + k(B)$?

9.17. Tegyük fel, hogy a korlátos H halmaz határának a területe 0. Következik-e ebből, hogy a H halmaz belseje üres?

9.18. Tegyük fel, hogy a korlátos H halmaz belseje üres. Következik-e ebből, hogy a H halmaz mérhető?

9.19. Legyen R egy tengelypárhuzamos tégla, és legyen $H \subset R$ tetszőleges halmaz. Bizonyítsuk be, hogy $b(H) + k(R \setminus H) = t(R)$!

9.20. Legyen R egy tengelypárhuzamos tégla, és legyen $H \subset R$ tetszőleges halmaz. Bizonyítsuk be, hogy H pontosan akkor mérhető, ha $k(H) + k(R \setminus H) = t(R)$!

9.21. Van-e olyan korlátos H halmaz, amelyikre teljesül, hogy

(a) $k(H) > b(H)$ **(b)** $k(H) < b(H)$

(c) $t(\partial H) > b(H)$ **(d)** $t(\partial H) > k(H)$?

9.22. Van-e olyan mérhető H halmaz, amelyikre teljesül, hogy

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

(a) $k(H) > b(H)$ **(b)** $t(\partial H) = 1$?

9.23. Tegyük fel, hogy H korlátos halmaz. Igaz-e, hogy ha H mérhető, akkor $H \cup \partial H$ is mérhető?

9.24. Legyen K_n az origó középpontú, $1/n$ sugarú körvonal a síkban! Határozzuk meg az $\bigcup_{n=1}^{\infty} K_n$ halmaz területét!

9.25. Legyen K_n az $(1/n, 1/n)$ középpontú, $1/n$ sugarú körvonal a síkban! Határozzuk meg az $\bigcup_{n=1}^{\infty} K_n$ halmaz területét!

9.26. Legyen $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ korlátos függvény, és $G_f = \{(x, y) : a \leq x \leq b, y = f(x)\}$, a függvény grafikonja. Bizonyítsuk be, hogy G_f pontosan akkor Jordan-mérhető, ha f integrálható!

9.27. Számoljuk ki az egységnégyzet racionális pontjaiból álló halmaz belső, illetve külső mértékét.

9.28. Adjunk meg a síkban egy korlátos nyílt halmazt, amelynek nincs Jordan-területe.

9.29. Adjunk meg a síkban korlátos zárt halmazt, amelynek nincs Jordan-területe.

9.30. Bizonyítsuk be, hogy tetszőleges korlátos $A \subset \mathbb{R}^n$ halmazra

$$b(A) = 0 \iff \operatorname{int} A = \emptyset.$$

9.31. Bizonyítsuk be, hogy ha $A \subset \mathbb{R}^n$ Jordan-mérhető, akkor $\forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, K \subset A$ zárt, és $\exists\, G \supset A$ nyílt mérhető halmaz úgy, hogy

$$t(A) - \varepsilon < t(K) \leq t(A) \leq t(G) < t(A) + \varepsilon.$$

9.32. Legyen $C \subset \mathbb{R}$ a Cantor-halmaz. $H = C \times [0, 1] \subset \mathbb{R}^2$. Jordan-mérhető-e H, és ha igen, mennyi a területe?

9.33. Legyen $H = \bigcup_{n=1}^{\infty} K_n$, ahol K_n az origó középpontú, $1/n$ sugarú körvonal.

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

(a) Mérhető halmaz H?
(b) Van-e olyan $S \subset \mathbb{R}^2$ (mérhető) halmaz, amelyre $\partial S = H$?
(c) Van-e olyan $S \subset \mathbb{R}^2$ (mérhető) halmaz, amelyre $\partial S \supset H$?

9.2. Többváltozós Riemann-integrál

9.34. Legyen $H = [-1,1] \times [0,1]$, és

$$f(x,y) = \begin{cases} |x|, & \text{ha } y \in \mathbb{Q} \\ 0, & \text{ha } y \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

Mutassuk meg, hogy $\int_0^1 \left(\int_{-1}^1 f(x,y)\,dx \right) dy = 0$, és hogy f nem integrálható H-n!

9.35. Legyen $H = \{x^2 + y^2 \leq 1\}$, és

$$f(x,y) = \begin{cases} 1, & \text{ha } x \geq 0 \\ -1, & \text{ha } x < 0 \end{cases}$$

Számítsuk ki f alsó és felső integrálját a H halmazon! Integrálható-e f a H halmazon?

Integrálhatók-e az $N = [0,1] \times [0,1]$ egységnégyzeten a következő függvények? Ha igen, számítsuk ki az integrál értékét!

9.36. $f(x,y) = \begin{cases} 0, & \text{ha } y > x \\ 1, & \text{ha } y \leq x \end{cases}$

9.37. $f(x,y) = \begin{cases} 1, & \text{ha } y \geq x \\ 0, & \text{ha } y < x \end{cases}$

9.38. $f(x,y) = \begin{cases} 0, & \text{ha } xy \neq 0 \\ 1, & \text{ha } xy = 0 \end{cases}$

9.39. $f(x,y) = \begin{cases} 1, & \text{ha } x,y \in \mathbb{Q} \\ 0, & \text{egyébként} \end{cases}$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

9.40. $f(x,y) = \begin{cases} 1, & \text{ha } x \geq 1/2 \\ 2, & \text{ha } x < 1/2 \end{cases}$

9.41. $f(x,y) = \begin{cases} 1, & \text{ha } y \geq 1/2 \\ 2, & \text{ha } y < 1/2 \end{cases}$

9.42. $f(x,y) = D(x)D(y)$, ahol $D(t) = \begin{cases} 1, & \text{ha } t \in \mathbb{Q} \\ 0, & \text{ha } t \notin \mathbb{Q} \end{cases}$ a Dirichlet-függvény.

9.43. Legyen $f(x,y) = \begin{cases} n & \text{ha } x+y = 1/n,\ n \in \mathbb{N}^+ \\ 0 & \text{egyébként} \end{cases}$.

Mutassuk meg, hogy f nem integrálható az N egységnégyzeten, de

$$\int_0^1 \left(\int_0^1 f(x,y)\,dx \right) dy = 0 \text{ és } \int_0^1 \left(\int_0^1 f(x,y)\,dy \right) dx = 0.$$

Számítsuk ki az $N = [0,1] \times [0,1]$ halmazon a következő területi integrálokat! Alkalmazzuk Fubini tételét!

9.44. $\iint_N \sin x\,dx\,dy$

9.45. $\iint_N \sin y\,dx\,dy$

9.46. $\iint_N \sin(x+y)\,dx\,dy$

9.47. $\iint_N \sin xy\,dx\,dy$

9.48. $\iint_N e^{2x+y}\,dx\,dy$

9.49. $\iint_N xy\,dx\,dy$

Legyen $N = [0,1]^2 \subset \mathbb{R}^2$ az egységnégyzet. Integráljuk N-en a következő $f(x,y)$ függvényeket:

9.50. $f(x,y) = x$

9.51. $f(x,y) = x^3 - x^2y + \sqrt{y}$

9.52. $f(x,y) = e^{x+2y}$

9.53. $f(x,y) = xe^{xy}$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

9.54. $f(x,y) = \begin{cases} 1 & \text{ha } x = y \\ 0 & \text{ha } x \neq y \end{cases}$ **9.55.** $f(x,y) = \begin{cases} 1 & \text{ha } x = y \\ 0 & \text{ha } x < y \end{cases}$

9.56. $f(x,y) = \begin{cases} 1 & \text{ha } x + y = 1 \\ 0 & \text{egyébként} \end{cases}$

9.57. $f(x,y) = \begin{cases} 1 & \text{ha } x = 1/n,\ n \in \mathbb{N}^+ \\ 0 & \text{egyébként} \end{cases}$

Határozzuk meg a következő területi integrálokat a megadott téglalapokon:

9.58. $\iint\limits_T (x+y)\,dx\,dy$ $\quad T:\ 0 \le x \le 1,\ 1 \le y \le 3$

9.59. $\iint\limits_T xy\,dx\,dy$ $\quad T:\ 0 \le x \le 1,\ 1 \le y \le 3$

9.60. $\iint\limits_T e^{x+y}\,dx\,dy$ $\quad T:\ 0 \le x \le 1,\ 0 \le y \le 1$

9.61. $\iint\limits_T xe^{y}\,dx\,dy$ $\quad T:\ 1 \le x \le 2,\ 3 \le y \le 4$

9.62. $\iint\limits_T \frac{x}{y}\,dx\,dy$ $\quad T:\ 1 \le x \le 2,\ 3 \le y \le 4$

9.63. $\iint\limits_T x \sin y\,dx\,dy$ $\quad T:\ 0 \le x \le 1,\ 2 \le y \le 3$

Számítsuk ki a $H = \{(x,y) : 0 \le x \le \pi/2, 0 \le y \le \sin x\}$ halmazon a következő területi integrálokat! Alkalmazzuk Fubini tételét!

9.64. $\iint\limits_H (x-y)\,dx\,dy$ **9.65.** $\iint\limits_H xy\,dx\,dy$

9.66. $\iint\limits_H y \sin x\,dx\,dy$ **9.67.** $\iint\limits_H \frac{x}{\sqrt{1+y^2}}\,dx\,dy$

Határozzuk meg a következő területi integrálokat a megadott halmazokon:

© Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

9.68. $\iint_T (x+y)\,dx\,dy \qquad T:\ x^2+y^2\le 1$

9.69. $\iint_T xy\,dx\,dy \qquad T:\ (x-1)^2+(y+1)^2\le 4$

9.70. $\iint_T xy\,dx\,dy \qquad T:\ \begin{matrix}(x-1)^2+y^2=1\\(x-2)^2+y^2=4\end{matrix}$ körök által határolt tartomány.

9.71. $\iint_T (x-xy)\,dx\,dy \qquad T:\ (x-2)^2+(y+3)^2\le 4$

9.72. $\iint_T e^{-x^2}\,dx\,dy \qquad T:\ 0\le x\le 1, 0\le y\le x$

9.73. $\iint_T (x^2+y^2)^{3/2}\,dx\,dy \qquad T:\ x^2+y^2\le 1$

Legyen $T=[0,1]\times[0,2]\times[0,3]\subset\mathbb{R}^3$. Számoljuk ki a következő térfogati integrálokat a T téglán:

9.74. $\iiint_T (x+y+z)\,dx\,dy\,dz$

9.75. $\iiint_T xyz\,dx\,dy\,dz$

9.76. $\iiint_T e^{x+y+z}\,dx\,dy\,dz$

9.77. $\iiint_T (xz+y^2)\,dx\,dy\,dz$

Határozzuk meg a következő görbék által határolt síkidomok területét!

9.78. $y=x^2,\quad x=y^2$

9.79. $y=2x-x^2,\quad y=x^2$

9.80. $2y=x^2,\quad y=x$

9.81. $4y=x^2-4x,\quad x-y-3=0$

9.82. $y=x^2,\ y=2x^2,\ xy=1,\ xy=2$

9.83. $x^2-y^2=1,\ x^2-y^2=4,\ xy=1,\ xy=2$


www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó


9.84. Határozzuk meg a $H = \{(x, y) : -1 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq \sqrt{1 - x^2}\}$ halmaz területét!

9.85. Számoljuk ki az $y = x^2$, $y = 2x^2$ parabolák és az $x = 1$ egyenes által határolt síkidom területét.

9.86. Számoljuk ki az $x^2 + y^2 = 1$ hengerpalást és az $x+y+z = 2$, $z = 0$ síkok által határolt test térfogatát. A keresett test:



9.87. Számoljuk ki az $x^2 + y^2 = 1$ hengerpalást és az $x+y+z = 1$, $z = 0$ síkok által határolt test térfogatát. A keresett test:



9.88. Számítsuk ki az $f(x, y) = 1 - \frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2}$ függvény grafikonja alatti test térfogatát a H halmaz felett, ha $H = [0, 1] \times [0, 1]$!

9.89. Számítsuk ki az $f(x, y) = x+y$ függvény grafikonja alatti test térfogatát a H halmaz felett, ha $H = \{0 \leq x + y \leq 1, 0 \leq x, 0 \leq y\}$!

Rajzoljuk le azt a testet, amelyiknek a térfogatát az adott integrállal számolhatjuk ki! Számítsuk ki a térfogatokat!

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

9.90. $\displaystyle\iint\limits_{|x|+|y|\le 1} (x^2+y^2)\,dy\,dx$ **9.91.** $\displaystyle\int_0^1 \left(\int_0^{1-x} (x^2+y^2)\,dy \right) dx$

Számítsuk ki a következő felületek által határolt testek térfogatát!

9.92. $x+y+z=6, \quad x=0, \quad z=0, \quad x+2y=4$

9.93. $x-y+z=6, \quad x+y=2, \quad x=y, \quad y=0, \quad z=0$

9.94. $z=1-x^2-y^2, \quad x^2+y^2\le 1$

9.95. $z=\cos x\cos y, \quad |x+y|\le \dfrac{\pi}{2}, \quad z=0$

Számítsuk ki a következő testek térfogatát!

9.96. gömb **9.97.** ellipszoid

9.98. körhenger **9.99.** forgáskúp

Tegyük fel, hogy a H síkbeli tartományt $\varrho(x,y)$ sűrűségű anyag tölti ki. Ekkor a test tömege:

$$M=\iint\limits_H \varrho(x,y)\,dx\,dy,$$

a test tömegközéppontjának a koordinátái pedig

$$S_x=\frac{1}{M}\iint\limits_H x\varrho(x,y)\,dx\,dy, \quad S_y=\frac{1}{M}\iint\limits_H y\varrho(x,y)\,dx\,dy.$$

Határozzuk meg a tömegközéppont koordinátáit, ha $H=[0,1]\times[0,1]$ és,

9.100. $\varrho(x,y)=x^2$ **9.101.** $\varrho(x,y)=x+y$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

9.102. $\varrho(x,y) = xy$

9.103. $\varrho(x,y) = x^2 + y^2$

Határozzuk meg annak a kétdimenziós testnek a tömegközéppontját, amelyiket az $y = 0$, $x = 2$, $y = 1, y = x$ egyenesek határolnak, és amelyiknek a sűrűsége

9.104. $\varrho(x,y) = 1$

9.105. $\varrho(x,y) = x$

9.106. $\varrho(x,y) = y$

9.107. $\varrho(x,y) = xy$

9.108. $\varrho(x,y) = \dfrac{1}{x+y^3}$

9.109. $\varrho(x,y) = e^{x+y}$

Az xy síkban levő test tehetetlenségi nyomatéka a z tengelyre nézve

$$\Theta = \iint_H r^2(x,y)\varrho(x,y)\,dx\,dy,$$

ahol $r(x,y)$ az (x,y) pont távolsága a z tengelytől. Határozzuk meg a ϱ sűrűségű, egységoldalú négyzet z tengelyre vonatkozó tehetetlenségi nyomatékát, ha a négyzet egyik csúcsa ér hozzá a z tengelyhez!

9.110. $\varrho(x,y) = 1$

9.111. $\varrho(x,y) = xy$

9.112. Határozzuk meg az előző két feladatban szereplő négyzetek tehetetlenségi nyomatékát az z tengelyre vonatkozóan, ha a négyzet egyik oldalának a felezőpontja ér hozzá a z tengelyhez!

9.113. Egy vékony lemezt az $y = 0, x = 1$ és az $y = 2x$ egyenesek határolnak. A lemez sűrűsége
$\varrho(x,y) = 6x + 6y + 6$. Határozzuk meg a test tömegét és tömegközéppontjának koordinátáit!

9.114. Egy test az első térnyolcadban van, a koordinátasíkok és az $x+y+z = 2$ sík határolja, a sűrűsége pedig $\varrho(x,y,z) = 2x$. Határozzuk meg a test tömegét és tömegközéppontjának koordinátáit!

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

9.115. Egy 1 méter mély gödörből a felszínre szivattyúzzuk a vizet. Mennyi munkát végzünk a gravitáció ellenében, ha a gödör

(a) kocka alakú, **(b)** félgömb alakú?

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

10. fejezet
Vonalintegrál és primitív függvény

10.1. Érintőegyenes. Az $\mathbf{r}(t)$ térgörbe érintőjének egyenlete az $\mathbf{r}_0 = \mathbf{r}(t_0)$ pontban

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}_0 + \mathbf{v} \cdot t,$$

ahol $\mathbf{v} = \dot{\mathbf{r}}(t_0)$ az érintőegyenes irányvektora.

10.2. Sík és térgörbe ívhossza.

— Ha az $\mathbf{r} : [a,b] \to \mathbb{R}^2$ síkgörbe folytonosan deriválható, akkor rektifikálható, és ívhossza

$$L = \int_a^b |\dot{\mathbf{r}}|\, dt = \int_a^b \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}\, dt.$$

— Ha $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ folytonosan deriválható, akkor grafikonja rektifikálható, és ívhossza

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + (f')^2}\, dx.$$

— Ha az $\mathbf{r} : [a,b] \to \mathbb{R}^3$ térgörbe folytonosan deriválható, akkor rektifikálható, és ívhossza

$$L = \int_a^b |\dot{\mathbf{r}}|\, dt = \int_a^b \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2}\, dt.$$

10.3. Érintősík. Az $\mathbf{r}(u,v)$ felület érintősíkjának egyenlete az $\mathbf{r}_0 = \mathbf{r}(u_0, v_0)$ pontban

$$\mathbf{n} \cdot \mathbf{r} = \mathbf{n} \cdot \mathbf{r}_0$$

ahol $\mathbf{n} = \mathbf{r}'_u(u_0, v_0) \times \mathbf{r}'_v(u_0, v_0)$ az érintősík normálisa.

© Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

Speciálisan a $z = f(x, y)$ grafikonjának érintősíkja az (x_0, y_0) pont felett

$$z = f(x_0, y_0) + f'_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f'_y(x_0, y_0)(y - y_0)$$

10.4. Felszín. Ha az $\mathbf{r} : A \to \mathbb{R}^3$ felület folytonosan deriválható, akkor a felületnek van (véges) felszíne, és

$$S = \iint_A |\mathbf{r}'_u \times \mathbf{r}'_v| \, du \, dv.$$

Speciálisan a $z = f(x, y)$ folytonosan deriválható függvény grafikonjának felszíne az A mérhető síkidom felett

$$S = \iint_A \sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2} \, dx \, dy.$$

10.5. Vonalintegrál kiszámolása. Ha $\mathbf{v} = v_1(x, y, z) \cdot \mathbf{i} + v_2(x, y, z) \cdot \mathbf{j} + v_3(x, y, z) \cdot \mathbf{k}$ vektormező folytonos a G tartományon, $\mathbf{r} : [a, b] \to G$, $\mathbf{r}(t) = x(t) \cdot \mathbf{i} + y(t) \cdot \mathbf{j} + z(t) \cdot \mathbf{k}$ folytonosan deriválható, akkor $\mathbf{v}$ vonalmenti integrálja létezik a $\Gamma : \mathbf{r}(t)$ görbe mentén, és

$$\int_\Gamma v \, d\mathbf{r} = \int_a^b \mathbf{v}(\mathbf{r}(t)) \cdot \dot{\mathbf{r}}(t) \, dt.$$

Koordinátákkal kiírva

$$\int_\Gamma v_1(x, y, z) \, dx + v_2(x, y, z) \, dy + v_3(x, y, z) \, dz =$$
$$= \int_a^b [v_1(x, y, z)\dot{x} + v_2(x, y, z)\dot{y} + v_3(x, y, z)\dot{z}] \, dt.$$

Hasonlóan, síkbeli vektormező és görbe esetén

$$\int_\Gamma v_1(x, y) \, dx + v_2(x, y) \, dy = \int_a^b [v_1(x, y)\dot{x} + v_2(x, y)\dot{y}] \, dt.$$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

10.6. Konzervatív vektortér.

— A $\mathbf{v}$ vektormező pontosan akkor konzervatív a G tartományon, ha minden G-ben fekvő zárt rektifikálható Γ görbén

$$\oint_{\Gamma} \mathbf{v}\, d\mathbf{r} = 0,$$

azaz minden körintegrál nulla.

— **Newton-Leibniz-formula** vonalintegrálokra.

Ha a $\mathbf{v}$ vektortér konzervatív a G tartományon és $U(\mathbf{r})$ egy primitív függvénye G-n, Γ egy folytonosan deriválható G-beli görbe az $\mathbf{a}$ kezdő és $\mathbf{b}$ végpontokkal, akkor

$$\int_{\Gamma} \mathbf{v}\, d\mathbf{r} = U(\mathbf{b}) - U(\mathbf{a}).$$

— Ha a $\mathbf{v}$ vektormező konzervatív és folytonosan deriválható a G tartományon, akkor

$$\operatorname{rot} \mathbf{v} = \mathbf{0},$$

azaz a keresztbe vett deriváltak megegyeznek, **örvénymentes** a vektormező.

— Ha a $\mathbf{v}$ vektormező folytonosan deriválható az **egyszeresen összefüggő** G tartományon, és G pontjaiban $\operatorname{rot} \mathbf{v} = \mathbf{0}$, akkor $\mathbf{v}$ konzervatív.

10.1. Sík és térgörbék

Ábrázoljuk a következő síkgörbéket!

10.1. $\mathbf{r} = t \cdot \mathbf{i} + t^2 \cdot \mathbf{j}$, $t \in [0, 4]$

10.2. $\mathbf{r} = t^2 \cdot \mathbf{i} + t \cdot \mathbf{j}$, $t \in [0, 16]$

10.3. $\mathbf{r} = \sqrt{t} \cdot \mathbf{i} + t \cdot \mathbf{j}$, $t \in [0, 16]$

10.4. $\mathbf{r} = t \cdot \mathbf{i} + \sqrt{t} \cdot \mathbf{j}$, $t \in [0, 4]$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

10.5. $\mathbf{r} = 2t \cdot \mathbf{i} + 4t^2 \cdot \mathbf{j}$, $t \in [0, 2]$

10.6. $\mathbf{r} = t^2 \cdot \mathbf{i} + t^2 \cdot \mathbf{j}$, $t \in [0, 4]$

10.7. $\mathbf{r} = \cos t \cdot \mathbf{i} + \sin t \cdot \mathbf{j}$, $t \in [0, 2\pi]$

10.8. $\mathbf{r} = \cos t \cdot \mathbf{i} + \sin t \cdot \mathbf{j}$, $t \in [0, \pi]$

10.9. $\mathbf{r} = \cos t \cdot \mathbf{i} + \sin t \cdot \mathbf{j}$, $t \in [-\pi/2, \pi/2]$

10.10. $\mathbf{r} = 2\cos t \cdot \mathbf{i} + 4\sin t \cdot \mathbf{j}$, $t \in [0, 2\pi]$

10.11. $\mathbf{r} = 4\cos t \cdot \mathbf{i} + 2\sin t \cdot \mathbf{j}$, $t \in [\pi/2, 3\pi/2]$

10.12. $\mathbf{r} = \cos t \cdot \mathbf{i} + t\sin t \cdot \mathbf{j}$, $t \in [0, 2\pi]$

10.13. $\mathbf{r} = t\cos t \cdot \mathbf{i} + \sin t \cdot \mathbf{j}$, $t \in [0, 6\pi]$

10.14. $\mathbf{r} = t\cos t \cdot \mathbf{i} + t\sin t \cdot \mathbf{j}$, $t \in [0, 4\pi]$

Ábrázoljuk a következő térgörbéket!

10.15. $\mathbf{r} = t \cdot \mathbf{i} + 2t \cdot \mathbf{j} + 3t \cdot \mathbf{k}$, $t \in [2, 4]$

10.16. $\mathbf{r} = -2t \cdot \mathbf{i} + t \cdot \mathbf{j} - (t/3) \cdot \mathbf{k}$, $t \in [2, 4]$

10.17. $\mathbf{r} = \cos t \cdot \mathbf{i} + \sin t \cdot \mathbf{j} + t \cdot \mathbf{k}$, $t \in [0, 6\pi]$

10.18. $\mathbf{r} = t \cdot \mathbf{i} + \sin t \cdot \mathbf{j} + \cos t \cdot \mathbf{k}$, $t \in [0, 6\pi]$

10.19. $\mathbf{r} = 2\sin t \cdot \mathbf{i} - t^2 \cdot \mathbf{j} + \cos t \cdot \mathbf{k}$, $t \in [2, 6\pi]$

10.20. $\mathbf{r} = t\cos t \cdot \mathbf{i} + t\sin t \cdot \mathbf{j} + t \cdot \mathbf{k}$, $t \in [2, 6\pi]$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

10.21. Adjunk meg olyan görbét, amelyik

(a) egy hengerre felcsavarodó spirál;

(b) egy kúpra felcsavarodó spirál!

10.22. Számoljuk ki az előző görbék ívhosszát, ha adott a henger, illetve kúp alapkörének a sugara, továbbá a henger és a kúp magassága!

Vázoljuk a következő síkgörbéket! Írjuk fel az érintők egyenletét $t = \pi/4$-ben!

10.23. $\mathbf{r}(t) = 2\cos t \cdot \mathbf{i} + 3\sin t \cdot \mathbf{j} \qquad t \in [0, 8\pi]$

10.24. $\mathbf{r}(t) = t\cos t \cdot \mathbf{i} + t\sin t \cdot \mathbf{j} \qquad t \in [0, 8\pi]$

Írjuk fel a következő síkgörbék érintőit a megadott P pontokban!

10.25. $x^2 - xy^3 + y^5 = 17 \qquad P(5, 2)$

10.26. $(x^2 + y^2)^2 = 3x^2y - y^3 \qquad P(0, 0)$

Számoljuk ki a következő térgörbék érintőinek egyenletét a megadott helyeken:

10.27. $\mathbf{r}(t) = (t-3)\cdot\mathbf{i} + (t^2+1)\cdot\mathbf{j} + t^2\cdot\mathbf{k} \quad t = 2$

10.28. $\mathbf{r}(t) = \sin t \cdot \mathbf{i} + \cos t \cdot \mathbf{j} + \dfrac{1}{\cos t}\cdot\mathbf{k} \quad \mathbf{p} = \mathbf{j} + \mathbf{k}$

Határozzuk meg az alábbi síkgörbék ívhosszát:

10.29. (ciklois)

$x = r(t - \sin t) \qquad 0 \le t \le 2\pi$
$y = r(1 - \cos t)$

10.30. (arkhimédészi spirális)

$r = a\varphi \qquad 0 \le \varphi \le 2\pi$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

10.31. $y = \sqrt{x}$ $0 \le x \le a$

10.2. Skalár-, és vektormezők, differenciáloperátorok

10.32. Milyen geometriai transzformációnak felel meg a síkon az

$$f(x,y) = \left(\frac{x}{x^2+y^2}, -\frac{y}{x^2+y^2}\right)$$

leképezés?

Adjunk meg olyan $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ leképezéseket, amelyeknek H az értelmezési tartománya, és K az értékkészlete!

10.33. $H = \{(x,y) : 0 < x < 1, 0 < y < 1\}$
$K = \{(x,y) : 0 < x < 2, 0 < y < 4\}$

10.34. $H = \{(x,y) : 0 < x < 1, 0 < y < 1, x + y < 1\}$
$K = \{(x,y) : 0 < x < 1, 0 < y < 1\}$

10.35. $H = \{(x,y) : 0 < x \le 1, y = 0\}$
$K = \{(x,y) : x^2 + y^2 = 1\}$

10.36. $H = \{(x,y) : 0 < x < 1, 0 < y < 2\}$
$K = \{(x,y) : x^2 + y^2 < 1\}$

Határozzuk meg grad $f = \nabla f$-et, ha

10.37. $f(x,y) = x^2 - y^2$ **10.38.** $f(x,y) = x^2 + y^2$

10.39. $f(x,y) = x^4 - 6x^2y^2 + y^4$ **10.40.** $f(x,y) = \sqrt{x^2+y^2}$

Írjuk fel a következő függvények gradiensét a megadott pontokban!

10.41. $f(x,y) = x^2 \sin y$ $\mathbf{p} = (\pi/3, -\pi/4)$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

10.42. $f(x,y) = \sqrt{x}\ln xy$ $\quad \mathbf{p} = (e^2, e^4)$

10.43. $f(x,y,z) = x + xy^2 + x^2z^3$ $\quad \mathbf{p} = (2,-1,1)$

10.44. $f(x,y,z) = x\sin y + z^2\cos y$ $\quad \mathbf{p} = (\pi/2, \pi/6)$

Számoljuk ki a következő skalármezők gradiensét, itt 'a' egy rögzített állandó vektort jelöl, 'r' pedig egy térbeli vektorváltozót:

10.45. $U(\mathbf{r}) = \mathbf{a}\cdot\mathbf{r}$

10.46. $U(\mathbf{r}) = |\mathbf{a}\times\mathbf{r}|$

10.47. $U(\mathbf{r}) = \mathbf{r}^2 + \dfrac{1}{\mathbf{r}^2}$

10.48. $U(\mathbf{r}) = \dfrac{\mathbf{a}^2}{\mathbf{r}^2}$

Határozzuk meg az alábbi felületek érintősíkját az adott helyeken:

10.49. $\mathbf{r} = (u^2 - v)\cdot\mathbf{i} + (u - v^3)\cdot\mathbf{j} - (u + v\cdot)\mathbf{k}\,;$ $\quad u = 1,\ v = 2$

10.50. $z = x^2 + y^2;$ $\quad x = 1,\ y = 2$

Számoljuk ki az alábbi felületdarabok felszínét:

10.51. $\mathbf{r} = u\cos v\cdot\mathbf{i} + u\sin v\cdot\mathbf{j} + u\cdot\mathbf{k}$ $\quad 0 \le u \le 1;\ 0 \le v \le \pi$

10.52. $z = \dfrac{x^2}{2y}$ $\quad 0 \le x \le 1; 1 \le y \le 2$

10.3. Vonalintegrál

Legyen $\mathbf{v} = (x+y)\cdot\mathbf{i} + (x-y)\cdot\mathbf{j}$. Számítsuk ki $\mathbf{v}$ vonalintegrálját a következő síkgörbéken!

10.53. $\Gamma : t\cdot\mathbf{i}$ $\quad t \in [0,1]$

10.54. $\Gamma : \begin{cases} t\cdot\mathbf{i} + (t+1)\cdot\mathbf{j}, & \text{ha } t \in [-1,0] \\ t\cdot\mathbf{i} + (-t+1)\cdot\mathbf{j}, & \text{ha } t \in (0,1] \end{cases}$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

10.55. $\Gamma : \cos t \cdot \mathbf{i} + \sin t \cdot \mathbf{j} \qquad t \in [0, \pi]$

10.56. $\Gamma : \begin{cases} (1+\cos t) \cdot \mathbf{i} + \sin t \cdot \mathbf{j}\,, & \text{ha } t \in [0,\pi] \\ \dfrac{t-\pi}{\pi} \cdot \mathbf{i}\,, & \text{ha } t \in (\pi, 2\pi] \end{cases}$

Legyen $\mathbf{v} = (x^2 - 2xy) \cdot \mathbf{i} + (y^2 - 2xy) \cdot \mathbf{j}$. Számítsuk ki $\mathbf{v}$ vonalintegrálját a következő görbéken!

10.57. $\Gamma : t \cdot \mathbf{i} + t^2 \cdot \mathbf{j} \qquad t \in [-1, 1]$

10.58. $\Gamma : t \cdot \mathbf{i} + \mathbf{j} \qquad t \in [-1, 1]$

Legyen a Γ_1 görbe az $A(0,0)$ és $B(1,1)$ pontokat összekötő egyenes szakasz, Γ_2 pedig az $A(0,0)$ és $B(1,1)$ pontokat összekötő parabolaív, mégpedig az $y = x^2$ függvény grafikonja 0 és 1 között. Számítsuk ki ezeken a görbéken a következő leképezések vonalintegrálját!

10.59. $\mathbf{v} = (x - y) \cdot \mathbf{i} + (x + y) \cdot \mathbf{j}$

10.60. $\mathbf{v} = x \cdot \mathbf{i} + y \cdot \mathbf{j}$

10.61. $\mathbf{v} = y \cdot \mathbf{i} + x \cdot \mathbf{j}$

10.62. $\mathbf{v} = (x^2 + y^2) \cdot \mathbf{i} + (x^2 - y^2) \cdot \mathbf{j}$

Legyen a Γ görbe az $A(0,0)$, $B(1,0)$ és a $C(0,1)$ pontokat összekötő töröttvonal. Számítsuk ki ezen a görbén a következő leképezések vonalintegrálját!

10.63. $\mathbf{v} = -2x \cdot \mathbf{i} + y \cdot \mathbf{j}$

10.64. $\mathbf{v} = \mathbf{i} + x^2 \cdot \mathbf{j}$

10.65. $\mathbf{v} = y^2 \cdot \mathbf{i} - \mathbf{j}$

10.66. $\mathbf{v} = xy \cdot \mathbf{i} + (x + y) \cdot \mathbf{j}$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

10.67. Legyen a Γ görbe az $A(-2,0)$ és a $B(1,0)$ pontokat összekötő egyenes szakasz. Számítsuk ki ezen a görbén az

$$\mathbf{v} = \frac{2x^3 - 3x}{x^2+y^2} \cdot \mathbf{i} + \frac{1}{x^2+y^2} \cdot \mathbf{j}$$

leképezés vonalintegrálját!

Legyen $\mathbf{v} = (x+y)\cdot\mathbf{i} + (y+z)\cdot\mathbf{j} + (z+x)\cdot\mathbf{k}$. Számítsuk ki $\mathbf{v}$ vonalintegrálját a következő görbéken!

10.68. $\Gamma : t\cdot\mathbf{i} + 2t\cdot\mathbf{j} + 3t\cdot\mathbf{k}$ $\quad t \in [0,1]$

10.69. $\Gamma : t\cdot\mathbf{i} + t^2\cdot\mathbf{j}$ $\quad t \in [1,2]$

10.70. $\Gamma : \cos t\cdot\mathbf{i} + \sin t\cdot\mathbf{j} + t\cdot\mathbf{k}$ $\quad t \in [0,\pi]$

10.71. $\Gamma : \cos t\cdot\mathbf{i} + \sin t\cdot\mathbf{j} + t\cdot\mathbf{k}$ $\quad t \in [\pi,2\pi]$

Legyen a Γ görbe az $A(0,0,0)$ és $B(1,1,1)$ pontokat összekötő egyenes szakasz. Számítsuk ki ezen a görbén a következő leképezések vonalintegrálját!

10.72. $\mathbf{v} = xz\cdot\mathbf{i} + yx\cdot\mathbf{j} + xy\cdot\mathbf{k}$

10.73. $\mathbf{v} = (x-y)\cdot\mathbf{i} + (x+y)\cdot\mathbf{j} + z\cdot\mathbf{k}$

10.74. $\mathbf{v} = xy\cdot\mathbf{i} + yz\cdot\mathbf{j} + xz\cdot\mathbf{k}$

10.75. $\mathbf{v} = y^2\cdot\mathbf{i} + z^2\cdot\mathbf{j} + x^2\cdot\mathbf{k}$

10.76. Legyen a Γ görbe az $A(-2,0,1)$ és a $B(1,0,3)$ pontokat összekötő egyenes szakasz. Számítsuk ki ezen a görbén a

$$\mathbf{v} = \frac{x}{x^2+y^2+z^2} \cdot \mathbf{i} + \frac{1}{x^2+y^2+z^2} \cdot \mathbf{j} + \frac{z}{x^2+y^2+z^2} \cdot \mathbf{k}$$

leképezés vonalintegrálját!

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

Határozzuk meg az alábbi vonalintegrálokat:

10.77. $\displaystyle\int_C (x^2-2xy)\,dx+(y^2-2xy)\,dy \qquad \Gamma:\ y=x^2 \quad (-1\le x\le 1)$

10.78. $\displaystyle\oint_C (x+y)\,dx+(x-y)\,dy \qquad \Gamma:\ \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$

10.79. $\displaystyle\int_C y\,dx+z\,dy+x\,dz \qquad C:\begin{cases} x=a\cos t \\ y=a\sin t \\ z=bt \end{cases} \quad 0\le t\le 2\pi$

Van-e a következő síkbeli vektormezőknek primitív függvénye? Ha igen, határozzuk meg őket!

10.80. $\mathbf{v}=y\cdot\mathbf{i}+x\cdot\mathbf{j}$

10.81. $\mathbf{v}=x\cdot\mathbf{i}+y\cdot\mathbf{j}$

10.82. $\mathbf{v}=(x-y)\cdot\mathbf{i}+(y-x)\cdot\mathbf{j}$

10.83. $\mathbf{v}=(x^4+4xy^3)\cdot\mathbf{i}+(6x^2y^2-5y^4)\cdot\mathbf{j}$

10.84. $\mathbf{v}=(x+y)\cdot\mathbf{i}+(x-y)\cdot\mathbf{j}$

10.85. $\mathbf{v}=e^x\cdot\mathbf{i}+e^y\cdot\mathbf{j}$

10.86. $\mathbf{v}=e^y\cdot\mathbf{i}+e^x\cdot\mathbf{j}$

10.87. $\mathbf{v}=e^x\cos y\cdot\mathbf{i}-e^x\sin y\cdot\mathbf{j}$

10.88. $\mathbf{v}=(x^2+y)\cdot\mathbf{i}+(x+\operatorname{ctg} y)\cdot\mathbf{j}$

10.89. $\mathbf{v}=\sin y\cdot\mathbf{i}+\sin x\cdot\mathbf{j}$

10.90. $\mathbf{v}=\cos xy\cdot\mathbf{i}+\sin xy\cdot\mathbf{j}$

10.91. $\mathbf{v}=y\sin xy\cdot\mathbf{i}+x\sin xy\cdot\mathbf{j}$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

10.92. $\mathbf{v} = \dfrac{x}{x^2+y^2}\cdot\mathbf{i} + \dfrac{y}{x^2+y^2}\cdot\mathbf{j}$

10.93. $\mathbf{v} = \dfrac{x}{x^2+y^2}\cdot\mathbf{i} - \dfrac{y}{x^2+y^2}\cdot\mathbf{j}$

10.94. $\mathbf{v} = \dfrac{y}{x^2+y^2}\cdot\mathbf{i} + \dfrac{x}{x^2+y^2}\cdot\mathbf{j}$

10.95. $\mathbf{v} = \dfrac{y}{x^2+y^2}\cdot\mathbf{i} - \dfrac{x}{x^2+y^2}\cdot\mathbf{j}$

10.96. $\mathbf{v} = \dfrac{y}{(x^2+y^2)^2}\cdot\mathbf{i} + \dfrac{x}{(x^2+y^2)^2}\cdot\mathbf{j}$

10.97. $\mathbf{v} = -\dfrac{y}{(x^2+y^2)^2}\cdot\mathbf{i} + \dfrac{x}{(x^2+y^2)^2}\cdot\mathbf{j}$

Számítsuk ki a 10.80. és 10.97. közötti feladatokban szereplő leképezések vonalintegrálját

10.98. az origó körüli egységsugarú körön pozitív irányban haladva;

10.99. azon a négyzeten, amelynek csúcspontjai $A(-1,-1), B(1,-1), C(1,1)$ és $D(-1,1)$, pozitív irányban haladva végig a négyzet teljes kerületén.

Konzervatívak-e következő erőterek az egész síkon? Ha igen, adjunk meg egy potenciálfüggvényt!

10.100. $\mathbf{E} = 9,81\cdot\mathbf{j}$

10.101. $\mathbf{E} = (y+x)\cdot\mathbf{i} + x\cdot\mathbf{j}$

10.102. $\mathbf{E} = (y+\operatorname{sgn} x)\cdot\mathbf{i} + x\cdot\mathbf{j}$

10.103. $\mathbf{E} = (x+y)\cdot\mathbf{i} + (x+[y])\cdot\mathbf{j}$

10.104. $\mathbf{E} = x\cdot\mathbf{i} + 2y\cdot\mathbf{j}$

10.105. $\mathbf{E} = (x^2-2xy)\cdot\mathbf{i} + (y^2-2xy)\cdot\mathbf{j}$

10.106. $\mathbf{E} = -\dfrac{y}{x^2+y^2}\cdot\mathbf{i} + \dfrac{x}{x^2+y^2}\cdot\mathbf{j}$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

10.107. $\mathbf{E} = \dfrac{x}{(x^2+y^2)^{3/2}} \cdot \mathbf{i} + \dfrac{y}{(x^2+y^2)^{3/2}} \cdot \mathbf{j}$

Van-e a következő térbeli vektormezőknek primitív függvénye? Ha igen, határozzuk meg őket!

10.108. $\mathbf{v} = yz \cdot \mathbf{i} + xz \cdot \mathbf{j} + xy \cdot \mathbf{k}$

10.109. $\mathbf{v} = xy \cdot \mathbf{i} + yz \cdot \mathbf{j} + xz \cdot \mathbf{k}$

10.110. $\mathbf{v} = (x+y) \cdot \mathbf{i} + (z-y) \cdot \mathbf{j} + xz \cdot \mathbf{k}$

10.111. $\mathbf{v} = \dfrac{-x^2+y^2+z^2}{x^2+y^2+z^2} \cdot \mathbf{i} + \dfrac{x^2-y^2+z^2}{x^2+y^2+z^2} \cdot \mathbf{j} + \dfrac{x^2+y^2-z^2}{x^2+y^2+z^2} \cdot \mathbf{k}$

10.112. $\mathbf{v} = 2xy^3z^4 \cdot \mathbf{i} + 3x^2y^2z^4 \cdot \mathbf{j} + 4x^2y^3z^3 \cdot \mathbf{k}$

10.113. $\mathbf{v} = 3xy^3z^4 \cdot \mathbf{i} + 3x^2y^2z^4 \cdot \mathbf{j} + x^2y^3z^3 \cdot \mathbf{k}$

10.114. $\mathbf{v} = \sin y \cdot \mathbf{i} + x\cos y \cdot \mathbf{j} + 2z \cdot \mathbf{k}$

10.115. $\mathbf{v} = e^x z \sin y \cdot \mathbf{i} + e^x z \cos y \cdot \mathbf{j} + e^x \sin y \cdot \mathbf{k}$

10.116. A 10.108. és 10.115. közötti feladatokban szereplő leképezések közül melyeknek lesz biztosan 0 a vonalintegrálja bármely $(3,4,5)$ középpontú, 1 sugarú körvonalon?

10.117. Határozzuk meg az alábbi vonalintegrált, és ellenőrizzük, hogy a keresztbe vett deriváltak megegyeznek:

$$\oint_C \frac{y\,dx - x\,dy}{x^2+y^2}, \qquad \Gamma:\ x^2+y^2=R^2.$$

Határozzuk meg a $z(x,y)$ primitív függvényt:

10.118. $dz = (x^2+2xy-y^2)\,dx + (x^2-2xy-y^2)\,dy$

10.119. $dz = \dfrac{y\,dx - x\,dy}{3x^2-2xy+3y^2}$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

10.120. $dz = \dfrac{(x^2+2xy+5y^2)\,dx + (x^2-2xy+y^2)\,dy}{(x+y)^3}$

Határozzuk meg az $u(x,y,z)$ primitív függvényt:

10.121. $du = (x^2-2yz)\,dx + (y^2-2xz)\,dy + (z^2-2xy)\,dz$

10.122. $du = \left(1-\dfrac{1}{y}+\dfrac{y}{z}\right)dx + \left(\dfrac{x}{z}+\dfrac{x}{y^2}\right)dy - \dfrac{xy}{z^2}\,dz$

10.123. $du = \dfrac{(x+y)\,dx + (x+y)\,dy + z\,dz}{x^2+y^2+z^2+2xy}$

Az origóban elhelyezett M tömegpont az (x,y,z) pontban levő m tömegpontra

$$c\frac{Mm}{x^2+y^2+z^2}$$

gravitációs vonzóerővel hat, ahol c egy állandó. Az erő iránya megegyezik az (x,y,z) pontból az origóba mutató vektor irányával. Számítsuk ki a gravitációs erő munkáját, ha az m tömegű test a következő görbéken mozog:

10.124. $\Gamma : \cos t \cdot \mathbf{i} + \sin t \cdot \mathbf{j} \quad t \in [0, 2\pi]$

10.125. $\Gamma : \cos t \cdot \mathbf{i} + \sin t \cdot \mathbf{j} \quad t \in [0, \pi]$

10.126. $\Gamma : t \cdot \mathbf{i} + 2t \cdot \mathbf{j} + 3t \cdot \mathbf{k} \quad t \in (0, 1]$

10.127. Γ : az a négyzet, amelynek csúcspontjai $A(-1,-1,0)$, $B(1,-1,0)$, $C(1,1,0)$, $D(-1,1,0)$ pozitív irányban végighaladva a négyzet teljes kerületén.

10.128. Határozzuk meg az előző feladatokban szereplő gravitációs erő potenciálfüggvényét!

Az origóban elhelyezett Q pontszerű töltés az (x,y,z) pontban levő, q pontszerű töltésre

$$c\frac{Mm}{x^2+y^2+z^2}$$

taszító erővel hat, ahol c egy állandó, és az erő iránya ellentétes az (x,y,z) pontból az origóba mutató vektor irányával.

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

10.129. Mekkora munkát végez ez az elektrosztatikus erő, amikor a q töltést az $(1, 2, 3)$ pontból az $(5, 6, 7)$ pontba viszi? Függ-e a végzett munka az útvonaltól?

10.130. Mekkora munkát végez ez az elektrosztatikus erő, amikor a q töltést az $(1, 2, 3)$ pontból a végtelen távoli pontba viszi? Függ-e a végzett munka az útvonaltól?

10.131. Határozzuk meg az előző feladatokban szereplő elektrosztatikus erő potenciálfüggvényét!

10.132. Az asztal lapján csúszó m tömegű testre az asztal lapja $c \cdot m$ súrlódási erővel hat, ahol c egy állandó. Az erő iránya mindig ellentétes az elmozdulás irányával. Mekkora munkát végez a súrlódási erő, amikor a testet a $(0, 0)$ pontból egy egyenes szakasz mentén a $(3, 4)$ pontba csúsztatjuk? Mekkora munkát végez a súrlódási erő, amikor a testet a $(0, 0)$ pontból először egy egyenes szakasz mentén a $(3, 0)$, majd egy csatlakozó egyenes szakasz mentén a $(3, 4)$ pontba csúsztatjuk? Függ-e végzett munka az útvonaltól?

10.133. Van-e az előző feladatban szereplő súrlódási erőnek potenciálfüggvénye?

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

11. fejezet
Komplex függvények

11.1. Cauchy-Riemann differenciálegyenletek. Ha az $f(z) = f(x+iy) = u(x,y) + i \cdot v(x,y)$ deriválható a $z_0 = x_0 + iy_0$ pontban, akkor

$$u'_x(x_0,y_0) = v'_y(x_0,y_0), \qquad u'_y(x_0,y_0) = -v'_x(x_0,y_0).$$

Megfordítva, ha teljesülnek a fenti egyenletek az (x_0,y_0) pontban és ebben a pontban u és v totálisan deriválható (mint kétváltozós valós függvények), akkor az $f(z)$ komplex függvény (komplex értelemben) deriválható z_0-ban.

11.2. Cauchy-féle integráltétel. Ha f analitikus a Γ egyszerű zárt görbe belsejében, Ω-ban, a Γ pontjaiban folytonos, akkor

$$\oint_\Gamma f(z)\,dz = 0.$$

11.3. Cauchy-féle integrálformulák. Ha f analitikus a-ban, Γ pozitív irányítású zárt körvonal a körül az f regularitási tartományában, akkor

$$f^{(n)}(a) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_\Gamma \frac{f(z)}{(z-a)^{n+1}}\,dz.$$

11.4. Holomorf függvények.

— **Maximum elv.** Egyszeresen összefüggő tartományon holomorf függvény abszolút-értékének nincs (lokális) maximuma a tartomány pontjaiban.

— **Liouville tétele.** Az egész komplex síkon holomorf korlátos függvény konstans.

— **Rouché tétele.** Legyen Γ egyszerű zárt görbe a komplex síkon, belseje Ω, f és g két folytonos komplex függvény $\overline{\Omega} = \Omega \cup \Gamma$-n, f és g holomorf Ω-n, valamint tegyük fel, hogy minden $z \in \Gamma$ esetén

$$|g(z)| > |f(z) - g(z)|\,.$$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

Ekkor a két függvénynek, multiplicitással számolva, ugyanannyi gyöke van Ω-ban.

11.5. Meromorf függvények.

— Ha $f(z)$ Laurent-sorba fejthető a körül,

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n (z-a)^n,$$

akkor

$$\operatorname{Res}(f,a) = a_{-1} = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\Gamma} f(z)\,dz,$$

ahol Γ egy pozitív irányítású körvonal a körül, amelynek sugara kisebb a Laurent-sor konvergenciasugaránál.

— **Residuum tétel.** Ha $D \subset \mathbb{C}$ egyszeresen összefüggő tartomány, f meromorf D-ben, Γ pedig D-beli egyszerű zárt görbe pozitív irányítással, amely nem megy át póluson, akkor

$$\oint_{\Gamma} f(z)\,dz = 2\pi i \sum \{\operatorname{Res}(f,a) : a \in \Omega\}$$

ahol Ω a Γ görbe belseje.

11.1. Bizonyítsuk be, hogy a z komplex szám konjugáltjának reciproka megegyezik z reciprokának konjugáltjával!

11.2. Tegyük fel, hogy $|z| < 1$ és $|\alpha| < 1$. Bizonyítsuk be, hogy ekkor $\left|\dfrac{z-\alpha}{1-z\overline{\alpha}}\right| < 1$.

Ellenőrizzük, hogy teljesülnek-e a Cauchy-Riemann differenciálegyenletek a következő komplex függvények esetében!

11.3. $f(z) = z^2$

11.4. $f(z) = z^n, \quad n \in \mathbb{N}^+$

11.5. $f(z) = \dfrac{1}{z}, \quad z \neq 0$

11.6. $f(z) = \dfrac{1}{z^2+1}$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

11.7. Teljesülnek-e a Cauchy-Riemann differenciálegyenletek az $f(z) = \sqrt{|xy|}$ függvényre, ahol x a z komplex szám valós, y pedig a képzetes része? Differenciálható-e az előző függvény $z = 0$-ban?

11.8. Bizonyítsuk be, hogy az $f(z) = 2x^2 + 3y^2 + xy + 2x + i(4xy + 5y)$ függvény a sík egyetlen tartományán sem differenciálható!

Keressük meg azokat a pontokat, ahol f differenciálható!

11.9. $f(x + iy) = xy + iy$

11.10. $f(x + iy) = \left(2x^2 - y\right) + i\left(x^2 + y^2\right)$

Határozzuk meg a differenciálható $f(x + iy) = u(x, y) + iv(x, y)$ függvényt a következő feltételek mellett!

11.11. $u(x, y) = x^2 - y^2 + xy, \quad f(0) = 0$

11.12. $v(x, y) = \dfrac{x^2}{x^2 + y^2}, \quad f(2) = 0$

Határozzuk meg a következő hatványsorok konvergenciasugarát!

11.13. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}(z - i)^n$

11.14. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} 2^n(z + i)^n$

11.15. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} n^2(z - 2 - 2i)^n$

11.16. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n-1)!}{n!} z^n$

11.17. $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n^2)!}{3^{n!}} z^n$

11.18. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \ln(n!) z^n$

11.19. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} z^n$

11.20. $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{in}{n+1}\right)^{n^2} z^n$

Adjuk meg a következő hatványsorok konvergenciasugarát és összegfüggvényét!

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

11.21. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} z^n$

11.22. $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} i^n z^n$

11.23. $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} (n+1) z^n$

11.24. $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1) z^n$

Bizonyítsuk be a megfelelő hatványsorok felhasználásával az Euler-féle összefüggéseket:

11.25. $e^{iz} = \cos z + i \sin z$

11.26. $e^{-iz} = \cos z - i \sin z$

11.27. $\cos z = \dfrac{1}{2}\left(e^{iz} + e^{-iz}\right)$

11.28. $\sin z = \dfrac{1}{2i}\left(e^{iz} - e^{-iz}\right)$

11.29. Bizonyítsuk be az Euler-féle összefüggések segítségével, hogy az e^z exponenciális függvény $2\pi i$ szerint periodikus!

11.30. Bizonyítsuk be, hogy a $\sin z$ és $\cos z$ függvényeknek pontosan ugyanazok a zérushelyei, mint a valós $\sin x$ és $\cos x$ függvényeknek!

Legyen Γ a $|z| = 1$ körvonal, és integráljuk a zárt körvonalon pozitív irányban a következő függvényeket!

11.31. $f(x+iy) = x$

11.32. $f(x+iy) = y$

11.33. $f(x+iy) = x - iy$

11.34. $f(x+iy) = x + iy$

Legyen Γ a $|z| = R$ körvonal, és integráljuk a zárt körvonalon pozitív irányban a következő függvényeket!

11.35. $f(z) = \dfrac{1}{z}$

11.36. $f(z) = \dfrac{1}{z^2}$

Integráljuk az $f(z) = |z|$ függvényt a következő, $z_1 = -1$-ből kiinduló, $z_2 = i$-be érkező görbéken! Függ-e az integrál értéke az útvonaltól?

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

11.37. $\Gamma = \{e^{-it} : t \in [\pi, 3\pi/2]\}$

11.38. $\Gamma = \{t : t \in [-1, 0]\} \bigcup \{it : t \in [0, 1]\}$

11.39. Számítsuk ki a $\int (x^2 - y^2)\,dx - 2xy\,dy$ vonalintegrált az $1 + i$ pontból kiinduló és a $3 + 2i$ pontba érkező szakaszon (valós) primitív függvény segítségével!

11.40. Számítsuk ki a $\int (x^2 - y^2)\,dx - 2xy\,dy$ vonalintegrált az $1 + i$ pontból kiinduló és a $3 + 2i$ pontba érkező szakaszon a Cauchy-féle integráltétel segítségével!

Legyen $\Gamma : z(t) = 1 + it, t \in [0, 1]$. Integráljuk a Γ görbén a Cauchy-féle integráltétel segítségével a következő függvényeket!

11.41. $f(z) = 3z^2$

11.42. $f(z) = \dfrac{1}{z}$

11.43. $f(z) = e^z$

11.44. $f(z) = ze^{z^2}$

Határozzuk meg az $\displaystyle\int_\Gamma \frac{1}{z^2 + 1}\,dz$ integrált a következő zárt görbéken!

11.45. $\Gamma : \ |z| = 1/2$

11.46. $\Gamma : \ |z| = 3$

11.47. $\Gamma : \ |z - i| = 1$

11.48. $\Gamma : \ |z + i| = 1$

Írjuk fel a következő függvények adott a pont körüli hatványsorát!

11.49. $\dfrac{1}{(1 - z)^2}, \quad a = 3$

11.50. $\dfrac{1}{(z - 2)(z - 3)}, \quad a = 5$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

11.51. $\dfrac{1}{1-z+z^2}, \quad a=0$

11.52. $\dfrac{3z-6}{(z-4)(z+25)}, \quad a=10$

Számítsuk ki az $f(z)$ függvény $z_0=0$ pontbeli reziduumát!

11.53. $f(z)=\dfrac{e^z}{z^2}$

11.54. $f(z)=\dfrac{\cos z}{\sin z}$

Számítsuk ki az $f(z)=\dfrac{1}{z^3-z^5}$ függvény z_0 pontbeli reziduumát!

11.55. $z_0=0$

11.56. $z_0=1$

11.57. $z_0=-1$

11.58. $z_0=i$

Számítsuk ki az $f(z)=\dfrac{z^2}{(z^2+1)^2}$ függvény z_0 pontbeli reziduumát!

11.59. $z_0=i$

11.60. $z_0=-i$

Határozzuk meg az $\displaystyle\oint_{|z|=4} f(z)\,dz$ körintegrált, ahol

11.61. $f(z)=\dfrac{e^z\sin z}{z-1}$

11.62. $f(z)=\dfrac{e^{\sin z}}{z^2}$

11.63. $f(z)=\dfrac{e^{\sin z}}{z-2}$

11.64. $f(z)=\dfrac{e^{\sin z}}{(z-1)(z-2)}$

11.65. $f(z)=\dfrac{e^z\cos z}{z-\pi}$

11.66. $f(z)=\dfrac{e^{\sin z}}{z^2-1}$

Legyen $\Gamma: z(t)=t+it, t\in[0,1]$. Integráljuk a Γ görbén a következő függvényeket!

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

11.67. $f(z) = z^2$ **11.68.** $f(z) = e^z$

Legyen Γ az $|z - 2i| = 1$ körvonal, és pozitív körüljárási irányban integráljuk a Γ görbén a következő függvényeket!

11.69. $f(z) = z^2$ **11.70.** $f(z) = \dfrac{1}{z}$

11.71. $f(z) = z^2 + \dfrac{1}{z}$ **11.72.** $f(z) = z + \dfrac{1}{z}$

Hány gyöke van a következő egyenleteknek az $|z| < 1$ körben? (Segítség: alkalmazzuk Rouché tételét.)

11.73. $z^6 - 6z + 10 = 0$ **11.74.** $z^4 - 5z + 1 = 0$

11.75. Számítsuk ki az $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{(x^2+1)^2}\,dx$ integrált a komplex számsíkon görbe menti integrálással!

11.76. Hova képezi az $f(z) = \dfrac{az+b}{cz+d}$ függvény az origó középpontú, egységsugarú kört?

11.77. Adjunk meg olyan komplex függvényt, amelyik a felső félsíkot az origó középpontú, egységsugarú körbe viszi!

Milyen görbéket vagy tartományokat határoznak meg a következő feltételek?

11.78. $|z - 2| < |z|$ **11.79.** $\left|z^2 - 1\right| < 1$

11.80. $\operatorname{Im} \dfrac{1}{z} = 2$ **11.81.** $\operatorname{Re} z = \operatorname{Im} z$

A $w = f(z)$ függvény a $z = x + iy$ síkot a $w = u + iv$ síkba képezi le. Határozzuk meg az adott T tartományok képét!

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

11.82. $w = z^2, \quad T = \{x + iy : x \geq 0, y \geq 0\}$

11.83. $w = e^z, \quad T = \{x + iy : 0 < y < \frac{\pi}{2}\}$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

Megoldások

Alapfogalmak, valós számok


1.1 Elemi feladatok

1.1. A megoldáshalmaz a $(2, 8)$ nyílt intervallum.



1.2. Ugyanaz, mint az előző feladatban.

1.3. A megoldáshalmaz a $(4, 6)$ nyílt intervallum.



1.5. Az eredeti egyenlőtlenség:

$$\frac{1}{5x+6} \geq -1$$

Szorozzuk át az egyenlőtlenséget $5x + 6$-tal. Két esetet kell megkülönböztetnünk:

I. eset: $5x + 6 > 0$, azaz $x > -6/5$. Ekkor az új egyenlőtlenség:

$$1 \geq -(5x+6), \quad 5x \geq -7, \quad x \geq -7/5$$

A vizsgált esetben ez csak akkor lehetséges, ha $x > -6/5$.

II. eset: $5x + 6 < 0$, azaz $x < -6/5$. Ekkor az új egyenlőtlenség megfordul:

$$1 \leq -(5x+6), \quad 5x \leq -7, \quad x \leq -7/5$$

A vizsgált esetben ez csak akkor lehetséges, ha $x \leq -7/5$.

Tehát az összes megoldás egy zárt és egy nyílt félegyenes uniója:

$$x \in (-\infty, -7/5] \cup (-6/5, \infty)$$

1.7. Az eredeti egyenlőtlenség:

$$10x^2 + 17x + 3 \leq 0$$

© Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

A baloldalon szereplő másodfokú polinom főegyütthatója pozitív, ezért a parabola pontjai a két gyök által kapott intervallumban vannak az x tengely alatt. Számoljuk ki a két gyököt:

$$10x^2 + 17x + 3 = 0$$

$$x_1 = -\frac{3}{2}, \quad x_2 = -\frac{1}{5}$$

Tehát a megoldások halmaza:

$$x \in [-3/2, -1/5]$$

1.9. Az eredeti egyenlőtlenség:

$$8x^2 - 30x + 25 \geq 0$$

Számoljuk ki a másodfokú egyenlet gyökeit:

$$8x^2 - 30x + 25 = 0$$

$$x_{1,2} = \frac{30 \pm \sqrt{900 - 800}}{16}, \quad x_1 = \frac{5}{2},\ x_2 = \frac{5}{4}$$

Mivel a főegyüttható pozitív, ezért a másodfokú polinom a két gyök által meghatározott intervallumon kívül pozitív, tehát a megoldások

$$x \in (-\infty, 5/4] \cup [5/2, \infty)$$

1.11. Az eredeti egyenlőtlenség:

$$9x^2 - 24x + 17 \geq 0$$

Számoljuk ki a másodfokú egyenlet gyökeit:

$$9x^2 - 24x + 17 = 0$$

Ennek az egyenletnek a diszkriminánsa negatív (-36), ezért a másodfokú polinom sehol sem nulla. Mivel a főegyüttható pozitív, ezért minden $x \in \mathbb{R}$ esetén

$$9x^2 - 24x + 17 > 0$$

Tehát az egyenlőtlenségnek minden $x \in \mathbb{R}$ megoldása.

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

1.14. Milyen $x \in \mathbb{R}$ esetén lesz $|x+1| + |x-2| \leq 12$?

Három esetet különböztethetünk meg aszerint, hogy $(x+1)$ és $(x-2)$ milyen előjelű.

I. eset: $x < -1$, azaz mindkét tag negatív.

$$-(x+1) - (x-2) \leq 12, \quad -2x \leq 11, \quad x \geq -\frac{11}{2}$$

Ebben az esetben a megoldások:

$$x \in [-11/2; -1)$$

II. eset: $-1 \leq x < 2$, azaz az első tag nem negatív, a második negatív.

$$(x+1) - (x-2) \leq 12, \quad 3 \leq 12, \quad x \text{ tetszőleges}$$

Ebben az esetben a megoldások:

$$x \in [-1; 2)$$

III. eset: $x \geq 2$, azaz egyik tag sem negatív.

$$(x+1) + (x-2) \leq 12, \quad 2x \leq 13, \quad x \leq \frac{13}{2}$$

Ebben az esetben a megoldások:

$$x \in [2; 13/2]$$

Összesítve a három esetet

$$x \in [-11/2; 13/2]$$

az összes megoldás.

1.16. Milyen $x \in \mathbb{R}$ esetén lesz $\left|\dfrac{x+1}{2x+1}\right| > \dfrac{1}{2}$?

I. eset: $x < -1$, azaz a számláló és a nevező is negatív.

$$\frac{x+1}{2x+1} > \frac{1}{2}, \quad 2(x+1) < 2x+1, \quad 2 < 1$$

Ebben az esetben nincs megoldás.

II. eset: $x > -1/2$, azaz a számláló és a nevező is pozitív.

$$\frac{x+1}{2x+1} > \frac{1}{2}, \quad 2(x+1) > 2x+1, \quad 2 > 1$$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

Ebben az esetben a megoldások:

$$x \in (-1/2; \infty)$$

III. eset: $-1 < x < -1/2$, azaz a számláló pozitív a nevező pedig negatív. A negatív nevezővel átszorozva megfordul az egyenlőtlenség:

$$\left|\frac{x+1}{2x+1}\right| = -\frac{x+1}{2x+1} > \frac{1}{2}, \quad -2(x+1) < 2x+1, \quad 4x > -3, \quad x > -\frac{3}{4}$$

Ebben az esetben a megoldások:

$$x \in (-3/4; -1/2)$$

Ha a nevező pozitív, akkor a számláló is az, ezért több eset nincs. Így az összes megoldás:

$$x \in (-3/4; -1/2) \cup (-1/2; \infty)$$

1.18.

$$\sqrt{x+3} + |x-2| = 0$$

Két nem negatív szám összege csak úgy lehet nulla, ha mindkettő nulla. Tehát

$$x + 3 = 0 \text{ és } x - 2 = 0$$

Ez a két egyenlet semmilyen x-re sem teljesül egyszerre, ezért az egyenletnek nincs megoldása.

1.2 Logikai alapfogalmak

1.20.

(a) Van olyan egér, amelyik nem szereti a sajtot.

(b) Valaki másnak vermet ásott és nem esett bele.

(c) Van olyan asszony, aki csak olyat akar tenni, amit szabad.

(d) Minden a-hoz van olyan b, hogy az $a+x = b$ legalább két különböző x-re teljesül.

(e) 3 nagyobb, mint 2, és 5 nem osztója 10-nek.

(f) Zörög a haraszt és nem fúj a szél.

(g) A nagynénémnek kerekei vannak, mégsem ő a miskolci gyorsvonat.

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

1.22. Igen:
(b)+(c) $\implies$ Minden állat vagy emlős, vagy van kopoltyúja.
(b)+(a) $\implies$ Ha egy állat emlős, akkor van kopoltyúja.
Tehát egy állatnak akár emlős akár nem, van kopoltyúja.

1.25. Csak a (b) állítás hamis, a többi igaz.

1.27. Ehhez a „Minden mohikán hazudik” mondathoz nem lehet igazságértéket rendelni, ha csak egy mohikán van.

Ha a mondat igaz lenne, akkor az utolsó mohikán is hazudott, tehát nem igaz a mondat.

Ha a mondat hamis lenne, akkor van igazmondó mohikán. De ha csak egy mohikán van, akkor ő az igazmondó. Ezért igaz amit mondott, tehát igaz a mondat.

1.29. Jelölje x az első, y pedig a harmadik számjegyet. A feltevés miatt $x + y = 5$. Most már az összes számjegy felírható x és y segítségével:

$$x, 6, y,\ x, 6, y,\ x, 6, y,\ x, 6, y,\ x$$

A 12. jegy $y = 4$, és ezért $x = 1$. Tehát a kód:

$$1641641641641$$

Azaz a 13-adik jegy 1.

1.31. Csak a **(c)** állítás következik, sőt a két állítás ekvivalens:

$$(A \implies B) \iff (\neg B \implies \neg A)$$

1.32. $A \implies B$ (mert 5 pozitív), de $B \not\Longrightarrow A$ ha például $x = -6$.

1.34. $B \implies A$, mert az A állítás mindig igaz (ha értelmes a gyökös kifejezés). Fordítva nem igaz a következtetés, például ha $x = 3$.

1.36. Egyikből sem következik a másik (mert $x^2 - x - 6$ gyökei -2 és 3). Például ha $x = -3$ akkor A igaz de B nem, ha pedig $x = 3$ akkor A hamis és B igaz.

1.38. Mindkét állítás hamis, ezért mindegyikből következik a másik (és bármely egyéb állítás).

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

1.40. $A \implies B$, mert a két egyenlőtlenséget összeadva, felhasználva a háromszög egyenlőtlenséget:

$$0,2 = 0,1 + 0,1 > |x-5| + |y-5| = |x-5| + |5-y| \geq \\ \geq |x-5-y+5| = |x-y|$$

$B \not\Longrightarrow A$, például ha $x = y = 0$

1.42. $\exists k \in \mathbb{N}^+ \; 2|k$ jelentése: van páros pozitív egész szám, ez igaz.

Tagadása: $\forall k \in \mathbb{N}^+ \; 2 \nmid k$, azaz minden pozitív egész páratlan. Ez nem igaz, például $k = 2$-re.

1.43. $\forall n \in \mathbb{N}^+ \; \exists k \in \mathbb{N}^+ \; n|k$ jelentése: minden n pozitív egésznek van többszöröse. Ez igaz, minden $n \in \mathbb{N}^+$ esetén legyen $k = 2 \cdot n$

Tagadása: $\exists n \in \mathbb{N}^+ \; \forall k \in \mathbb{N}^+ \; n \nmid k$, azaz van olyan $n \in \mathbb{N}^+$, amelyik egyetlen pozitív egésznek sem osztója. Ez nem igaz (mert az eredeti állítás igaz).

1.45. Nem hazudott. Akkor hazudott volna, hogyha a hó miatt nem járt a busz, Pistike mégis elment az iskolába.

1.47. 2^{98} részhalmaz esetén igaz, $2^{100} - 2^{98} = 3 \cdot 2^{98}$ esetén pedig nem.

1.49. 1 benne van: 2^{99} részhalmaz.

2 nincs benne: 2^{99} részhalmaz.

1 benne van és 2 nincs benne: 2^{98} részhalmaz.

1 benne van a részhalmazban vagy a 2 nincs benne: $2^{99} + 2^{99} - 2^{98} = 3 \cdot 2^{98}$

A komplementer esemény: 2^{98} részhalmaz esetén 1 nincs benne és 2 benne van.

1.51. Az üres halmaz ilyen. Ha $H \neq \emptyset$, legyen $k = \min H$. De akkor $H = \{i : k \leq i \leq n\}$. Tehát $n+1$ ilyen halmaz van.

1.52. Jelölje $\mathcal{A}_n$ az ilyen halmazok halmazát, a_n az $\mathcal{A}_n$ számosságát. Nyilván $a_1 = 2$ és $a_2 = 3$. Ha most $n > 2$, akkor legyen

$$\mathcal{B}_n = \{A \in \mathcal{A}_n : n \notin A\} \text{ és } \mathcal{C}_n = \{A \in \mathcal{A}_n : n \in A \wedge n-1 \notin A\}$$

Könnyen látható, hogy

$$A \in \mathcal{B}_n \iff A \in \mathcal{A}_{n-1} \text{ és } A \in \mathcal{C}_n \iff A \cap A_{n-2} \in \mathcal{A}_{n-2}.$$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

Tehát $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$. Ez az un. Fibonacci-sorozat, pontosabban $a_n = u_{n+2}$.

1.53. Jelölje most $\mathcal{B}_n$ a feltételnek megfelelő halmazok halmazát, $B \in \mathcal{B}$ esetén két lehetőség van:

(1) Minden $x \in B$ esetén $x+1 \notin B$. Ilyen halmaz az előző feladat szerint $a_n = u_{n+2}$ darab van.

(2) Van olyan $x \in B$, amelyre $x+1 \in B$. Ebben az esetben legyen
$$k(B) = \min\{x \in B : x+1 \in B\}.$$
Ha most
$$b_k = |\{B \in \mathcal{B} : k(B) = k\}|,$$
akkor nyilván $b_k = a_{k-2} = u_k$, $k = 1, 2, \ldots, n-1$.

Tehát $|\mathcal{B}_n| = (u_1 + u_2 + \cdots + u_n) + u_{n+2}$. A Fibonacci számok összegére vonatkozó képlet a Fibonacci-sorozatról szóló feladatok közt megtalálható.

1.55. $\neg P \cap \neg Q$

1.57. $P \cap \neg Q$

1.59. $\neg P \cap \neg Q$

1.61. $\neg P \cap Q$

1.63. $\neg(P \Longrightarrow Q) = P \cap \neg Q$

1.65. (b) $\Longrightarrow$ (a), (c) $\Longrightarrow$ (d).
Más következtetés nem igaz.

1.3 Bizonyítási módszerek

1.66. Indirekt módon tegyük fel, hogy van olyan $p, q \in \mathbb{N}^+$, amelyekre $\sqrt{3} = \frac{p}{q}$. Feltehetjük azt is, hogy p és q relatív prím. Átalakítás után:
$$3 = \frac{p^2}{q^2}, \quad 3q^2 = p^2.$$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

Eszerint p^2 osztható 3-mal, de mivel 3 prímszám, ezért p is osztható 3-mal: $p^2 = 9r^2$. Így tehát

$$3q^2 = 9r^2, \quad q^2 = 3r^2.$$

Megismételve az előző gondolatmenetet p helyett q-ra, azt kapjuk, hogy q is osztható 3-mal. ami ellentmond annak, hogy p és q relatív prím.

1.68. Indirekt módon tegyük fel, hogy

$$r = \frac{\frac{\sqrt{2}+1}{2}+3}{4}+5$$

racionális. De akkor

$$(r-5)\cdot 4 = \frac{\sqrt{2}+1}{2}+3$$

is racionális. Tovább folytatva az okoskodást, azt kapjuk, hogy $\sqrt{2}$ racionális. Ez ellentmondás. Azt, hogy $\sqrt{2}$ irracionális, ugyanúgy láthatjuk be, ahogy $\sqrt{3}$ esetén.

1.70.

(a) Nem lehet: ha $x+y$ racionális lenne, akkor $(x+y)-x = y$ is az lenne.

(b) Nem lehet: ha $x-y$ racionális lenne, akkor $x-(x-y) = y$ is az lenne.

(c) Lehet, de csak ha $x = 0$.

(d) Lehet, de csak ha $x = 0$.

1.72.

(a) Igaz.

(b) Nem igaz: például $a = \sqrt{2}, \quad b = -\sqrt{2}$

(c) Nem igaz, $a+b$ irracionális.

(d) Igaz.

1.74. Annak tagadása, hogy 1 a legnagyobb szám az, hogy 1-nél van nagyobb szám, nem pedig az, hogy egy másik szám a legnagyobb szám. A valós (vagy a természetes) számok között nincs legnagyobb!

1.76. Teljes indukcióval:

$n = 1 : 16|16$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

$n+1$-re: Mivel ha $k|a-b$ és $k|b$, akkor $k|a$, ezért elég belátni, hogy

$16|(5^{n+2}-4(n+1)-5)-(5^{n+1}-4n-5)$ azaz, hogy $16|4\cdot(5^{n+1}-1)$. Ez teljesül, ha $4|5^{n+1}-1$. Ezt teljes indukcióval könnyű bizonyítani.

1.77. Indirekt, tegyük fel, hogy $\operatorname{tg} 1^\circ$ racionális. Ekkor teljes indukcióval bebizonyítjuk, hogy minden $n \in \mathbb{N}^+,\ n < 90$ esetén $\operatorname{tg} n^\circ$ racionális. Ez következik a szögek összegére vonatkozó képletből:

$$\operatorname{tg}(n+1)^\circ = \frac{\operatorname{tg} n^\circ + \operatorname{tg} 1^\circ}{1 - \operatorname{tg} n^\circ \cdot \operatorname{tg} 1^\circ}$$

Ennek a racionális kifejezésnek minden eleme racionális, így az eredmény is az. Mivel $\operatorname{tg} 30^\circ$ irracionális, ellentmondásra jutottunk.

1.78. A számtani és mértani közepekre vonatkozó egyenlőtlenség szerint

$$\sqrt[n]{n!} = \sqrt[n]{1\cdot 2\cdots n} \le \frac{1+2+\cdots n}{n} = \frac{n+1}{2}$$

Mindkét oldalt az n-edik hatványra emelve a kívánt egyenlőtlenséget kapjuk.

1.79. Igaz az állítás.

Indirekt módon tegyük fel, hogy minden $a_n \ge 10^{-6}$ és így $a_n^2 \ge d = 10^{-12} > 0$. Ezért $a_{n+1} \le a_n - d$ és általában $a_{n+k} \le a_n - k\cdot d$. Tehát a $k = 10^{12} = \dfrac{1}{d}$ választással $a_{1+k} \le 0,9 - 1 < 0 < 10^{-6}$. Ez ellentmondás.

1.81. (a) Jelölje a keresett összeget s_n, azaz

$$s_n = \frac{1}{1\cdot 2} + \frac{1}{2\cdot 3} + \cdots + \frac{1}{(n-1)\cdot n}.$$

Kiszámoljuk s_n értékét $n = 2,\ 3,\ 4$ esetében.

$$s_2 = \frac{1}{2},\ s_3 = \frac{2}{3},\ s_4 = \frac{3}{4},\ \cdots$$

A sejtés az összegképletre:

$$s_n = \frac{n-1}{n} = 1 - \frac{1}{n}.$$

Bizonyítás teljes indukcióval: $n = 2$-re igaz. Tegyük fel, hogy n-re igaz az állítás.

$$s_{n+1} = \frac{1}{1\cdot 2} + \frac{1}{2\cdot 3} + \cdots + \frac{1}{(n-1)\cdot n} + \frac{1}{n\cdot(n+1)} = s_n + \frac{1}{n\cdot(n+1)} =$$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

$$= \frac{n-1}{n} + \frac{1}{n\cdot(n+1)} = \frac{(n-1)(n+1)+1}{n\cdot(n+1)} = \frac{n}{n+1}$$

Egy másik bizonyítást láthatunk az 1.87. feladat megoldásánál.

(b) Most legyen $s_n = 1+3+\ldots+(2n-1)$ a páratlan számok összege.

$$s_1 = 1,\ s_2 = 4,\ s_3 = 9,\ s_4 = 16,\ \cdots$$

A sejtés: $s_n = n^2$.

Teljes indukcióval: $n = 1$-re igaz. Tegyük fel, hogy n-re igaz az állítás.

$$s_n + 1 = 1+3+\ldots+(2n-1)+(2n+1) =$$
$$= s_n + (2n+1) = n^2 + 2n + 1 = (n+1)^2$$

1.82. A jobb oldalon elvégezve az $(a-b)$-vel való szorzást, két tagot kivéve minden tag kiesik.

1.83. **Első bizonyítás:** Teljes indukcióval. $n = 1$-re az állítás igaz. Ha n-re igaz, akkor

$$(1+2+\cdots+n)+(n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$$

Második bizonyítás: Írjuk egymás alá kétszer az összeget, de másodszor fordított sorrendben:

$$1+\quad 2\quad +\cdots+n$$

$$n+(n-1)+\cdots+1$$

Az így kialakult oszlopokban a számok összege $n+1$ és mivel n darab oszlop van, a keresett összeg kétszerese éppen $n(n+1)$.

1.84. Teljes indukcióval. $n = 1$-re az állítás igaz. Ha n-re igaz az állítás, akkor

$$\left(1^2+2^2+\cdots+n^2\right)+(n+1)^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2 =$$
$$= \frac{(n+1)(n+2)(2(n+1)+1)}{6}$$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

1.85. Teljes indukcióval. $n = 1$-re az állítás igaz. Ha n-re igaz az állítás, akkor

$$\left(1^3 + 2^3 + \cdots + n^3\right) + (n+1)^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2 + (n+1)^3 = \\ = \left(\frac{(n+1)(n+2)}{2}\right)^2$$

1.86. Legyen s_n az egyenlőség baloldalán, t_n pedig a jobboldalán szereplő összeg.

$$s_n = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \cdots - \frac{1}{2n}$$
$$t_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n}$$

Teljes indukcióval. $n = 1$-re az állítás igaz, azaz $s_1 = t_1$. Ha n-re igaz az állítás, akkor

$$s_{n+1} = s_n + \left(\frac{1}{2n+1} - \frac{1}{2n+2}\right) = \\ = \left(1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \cdots - \frac{1}{2n}\right) + \left(\frac{1}{2n+1} - \frac{1}{2n+2}\right) = \\ = \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n}\right) + \left(\frac{1}{2n+1} - \frac{1}{2n+2}\right) = \\ = \frac{1}{n+1} + \left(\frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n}\right) + \left(\frac{1}{2n+1} + \frac{1}{2(n+1)} - \frac{1}{n+1}\right) = \\ = \frac{1}{n+2} + \frac{1}{n+3} + \cdots + \frac{1}{2(n+1)} = t_{n+1}$$

1.87. Felhasználva, hogy $\frac{1}{(k-1)k} = \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}$, un. teleszkopikus összeget kapunk:

$$\frac{1}{1\cdot 2} + \frac{1}{2\cdot 3} + \cdots + \frac{1}{(n-1)\cdot n} = \\ = \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}\right) = 1 - \frac{1}{n}$$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

1.88. Itt két teleszkopikus összegre lehet bontani az eredeti összeget, mivel

$$\frac{1}{k(k+1)(k+2)} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{k} - \frac{2}{k+1} + \frac{1}{k+2}\right) = \\ = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}\right) - \frac{1}{2}\left(\frac{1}{k+1} - \frac{1}{k+2}\right).$$

Tehát:

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+1)(k+2)} = \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}\right) - \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{k+1} - \frac{1}{k+2}\right) = \\ = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2}\right).$$

1.89. A 1.83. és 1.84. feladatokban szereplő képletek felhasználásával:

$$\sum_{k=1}^{n} k(k+1) = \sum_{k=1}^{n} k^2 + \sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + \frac{n(n+1)}{2} = \\ = \frac{n(n+1)(n+2)}{3}$$

1.90. A 1.83. , 1.84. és 1.85. feladatokban szereplő képletek felhasználásával:

$$\sum_{k=1}^{n} k(k+1)(k+2) = \sum_{k=1}^{n} k^3 + 3\sum_{k=1}^{n} k^2 + 2\sum_{k=1}^{n} k = \\ = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2 + 3 \cdot \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + 2 \cdot \frac{n(n+1)}{2} = \\ = \frac{n(n+1)(n^2+5n+6)}{4} = \frac{n(n+1)(n+2)(n+3)}{4}$$

1.92. Teljes indukcióval: $n = 0$ esetén igaz. Tegyük fel, hogy n-re igaz az állítás és, hogy egy k pozitív egész szám osztója u_{n+1}-nek és u_{n+2}-nek is. De akkor k osztója $u_{n+2} - u_{n+1} = u_n$-nek is. Mivel az indukciós feltevés szerint u_n és u_{n+1} relatív prímek, ezért $k = 1$, tehát u_{n+1} és u_{n+2} is relatív prím számok.

1.93. Teljes indukcióval:
Az $n = 1$ és az $n = 2$ eset könnyen ellenőrizhető.

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

Tegyük fel, hogy $n > 2$ és $n-1$-re illetve $n-2$-re igaz az állítás.

$$u_n = u_{n-1} + u_{n-2} > \frac{1,6^{n-1}}{3} + \frac{1,6^{n-2}}{3} = \frac{1,6^{n-2}}{3}(1,6+1) > \frac{1,6^{n-2}}{3}1,6^2 = \frac{1,6^n}{3}$$

Másrészt

$$u_n = u_{n-1} + u_{n-2} < 1,7^{n-1} + 1,7^{n-2} = 1,7^{n-2}(1,7+1) < 1,7^{n-2}1,7^2 = 1,7^n$$

1.94. Teljes indukcióval: Az $n = 1$ eset mindegyik feladatnál könnyen ellenőrizhető. Tegyük fel, hogy n-re igaz a megfelelő állítás, be kell látnunk, hogy akkor $n+1$-re is.

(a) $(u_1 + u_2 + \cdots u_n) + u_{n+1} = u_{n+2} - 1 + u_{n+1} = u_{n+3} - 1$

(b) $u_{n+1}^2 - u_n u_{n+2} = u_{n+1}^2 - u_n(u_{n+1} + u_n) = u_{n+1}(u_{n+1} - u_n) - u_n^2 = u_{n+1}u_{n-1} - u_n^2 = -(-1)^{n+1} = (-1)^{n+2}$

(c) $(u_1^2 + u_2^2 + \cdots + u_n^2) + u_{n+1}^2 = u_n u_{n+1} + u_{n+1}^2 = u_{n+1}(u_n + u_{n+1}) = u_{n+1}u_{n+2}$

1.95. Az alábbi formulák teljes indukcióval könnyen bizonyíthatók.

(a) $s_n = \alpha \cdot u_{2n+1} + \beta = u_{2n+1} - 1$.

(b) $s_n = \alpha \cdot u_{2n+2} + \beta = u_{2n+2}$.

(c) $s_n = \alpha \cdot u_{3n+2} + \beta = \dfrac{u_{3n+2} - 1}{2}$.

(d) $s_n = u_{2n}^2$

1.97. Az indoklás csak akkor helyes, ha n legalább 2. Ezért az $n = 1$ és az $n = 2$ eseteket nem „bizonyítottuk” be.

1.99. Mindhárom közepet csökkentjük illetve növeljük, ha minden számot lecserélünk a legkisebbre, illetve a legnagyobbra.

1.101. Az a^2bc egy négytényezős szorzat. Írjuk fel a megadott 3 tagú összeget 4 tagú összegként és használjuk a számtani és mértani közepek közti egyenlőtlenséget 4 szám esetén:

$$\frac{\frac{a}{2} + \frac{a}{2} + b + c}{4} \geq \sqrt[4]{\frac{a}{2} \cdot \frac{a}{2} \cdot b \cdot c} = \sqrt[4]{\frac{1}{4}a^2bc}$$

Eszerint

$$\frac{18}{4} = \frac{9}{2} \geq \sqrt[4]{\frac{1}{4}a^2bc}$$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

Negyedik hatványra emelés és átrendezés után:

$$a^2bc \le 4\left(\frac{9}{2}\right)^4$$

A jobboldalon szereplő szám a keresett maximum, hiszen $\frac{a}{2} = b = c = \frac{18}{4} = \frac{9}{2}$ esetén egyenlőség van.

1.103. Használjuk a harmonikus és a számtani közepek közötti egyenlőtlenséget:

$$\frac{abc}{ab+bc+ac} = \frac{1}{3}\cdot\frac{3}{\frac{1}{c}+\frac{1}{a}+\frac{1}{b}} \le \frac{1}{3}\cdot\frac{a+b+c}{3} = \frac{18}{9} = 2$$

Itt egyenlőség pontosan akkor van, ha $a = b = c = 6$

1.105.

$$2a+b+c = 3\cdot\frac{2a+b+c}{3} \ge 3\sqrt[3]{(2a)bc} = 3\sqrt[3]{2\cdot 18} = 3\sqrt[3]{36}$$

Itt egyenlőség pontosan akkor van, ha $2a = b = c = \sqrt[3]{36}$.

1.107. Felhasználjuk a mértani és a négyzetes közepek közötti egyenlőtlenséget:

$$a^2+b^2+c^2 = 3\left(\sqrt{\frac{a^2+b^2+c^2}{3}}\right)^2 \ge 3\left(\sqrt[3]{abc}\right)^2 = 3\left(\sqrt[3]{18}\right)^2$$

Itt egyenlőség pontosan akkor van, ha $a = b = c = \sqrt[3]{18}$.

1.109.

$$a+\frac{1}{a} = 2\cdot\frac{a+\frac{1}{a}}{2} \ge 2\cdot\sqrt{a\cdot\frac{1}{a}} = 2$$

1.112. Természetesen csak akkor értelmes a feladat, ha $v > u$. A v_a átlagsebesség a megtett út osztva a megtételhez szükséges t idővel:

$$v_a = \frac{2s}{t}$$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

Számoljuk ki t-t. A folyásirányban a sebesség $v+u$, az s úthoz szükséges idő

$$t_1 = \frac{s}{v+u}$$

Az ellenkező úton a sebesség $v-u$, az s úthoz szükséges idő

$$t_2 = \frac{s}{v-u}$$

Mivel $t = t_1 + t_2$

$$v_a = \frac{2s}{\frac{s}{v+u} + \frac{s}{v-u}} = \frac{2}{\frac{1}{v+u} + \frac{1}{v-u}}$$

Tehát v_a éppen a harmonikus közepe a $v+u,\ v-u$ számoknak, és ezért $u > 0$ esetén határozottan kisebb a két szám számtani közepénél, v-nél.

1.114.

$$f(x) = x(1-x) = \left(\sqrt{x(1-x)}\right)^2 \leq \left(\frac{x+(1-x)}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$$

Itt egyenlőség van, ha $x = 1-x = \frac{1}{2}$

1.115.

$$f(x) = x + \frac{4}{x} = 2 \cdot \frac{x + \frac{4}{x}}{2} \geq 2 \cdot \sqrt{x \cdot \frac{4}{x}} = 4$$

A minimum ott van, ahol egyenlőség van, azaz $x = \frac{4}{x} = 2$.

1.117. Felhasználva a számtani és mértani közepek közötti egyenlőtlenséget:

$$x^2(1-x) = 4 \cdot \frac{x}{2} \cdot \frac{x}{2} \cdot (1-x) \leq 4 \cdot \left(\frac{\frac{x}{2} + \frac{x}{2} + (1-x)}{3}\right)^3 = \frac{4}{27}$$

Egyenlőség csak akkor van, ha $\frac{x}{2} = 1-x$, azaz $x = \frac{2}{3}$.

Tehát a keresett maximum: $\frac{4}{27}$.

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

1.119. Legyen $g(x) = f(x) - 3 = 2(x^2+1) + \dfrac{3}{x^2+1}$. A $g(x)$ függvénynek ugyanott van a minimuma, mint $f(x)$-nek. Mivel a pozitív $2(x^2+1)$ és $\dfrac{3}{x^2+1}$ számoknak a szorzata állandó ($=6$), ezért az összegük akkor minimális, ha megegyeznek.

$$2(x^2+1) = \frac{3}{x^2+1}$$

Innen $x^2 = \sqrt{3/2} - 1$ és így $g(x)$ minimuma

$$m_g = g\left(\sqrt{\sqrt{3/2}-1}\right) = 2\left(\sqrt{3/2}\right) + \frac{3}{\sqrt{3/2}} = \frac{6}{\sqrt{3/2}} = 2\sqrt{6},$$

$f(x)$ minimuma pedig


$$m_f = m_g + 3 = 2\sqrt{6} + 3$$

1.121. Az ábra jelöléseit használva, a téglalap területe:

$T = 4F$, ahol $F = x \cdot y$ és $x^2 + y^2 = 1$.

Ezért $F = x\sqrt{1-x^2}$. Számoljuk ki F^2 maximumát:

$$F^2 = x^2(1-x^2) \le \left(\frac{x^2 + (1-x^2)}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}.$$



Egyenlőség csak akkor van, ha $x^2 = 1 - x^2$, azaz

$$x = y = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Tehát a maximális terület: $T = 2$, mégpedig a négyzet esetén.

1.122. Az ábra a kúp és a henger egy síkmetszetét ábrázolja. Az ábra jelöléseit használva, a henger térfogata:


$V = \pi r^2 h$. Mivel $\dfrac{h}{m} = \dfrac{R-r}{R}$, ezért $V = \dfrac{\pi m}{R} \cdot r^2(R-r)$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

Az előző feladathoz hasonlóan

$$V = \frac{4\pi m}{R}\cdot\frac{r}{2}\cdot\frac{r}{2}\cdot(R-r) \le \frac{4\pi m}{R}\left(\frac{R}{3}\right)^3 = \frac{4}{27}$$



Egyenlőség csak akkor van, ha $\frac{r}{2} = R-r$. Ekkor a henger sugara, illetve magassága:

$$r = \frac{2}{3}R, \quad h = \frac{m}{3}$$


Tehát a maximális térfogat: $V = \frac{4}{27}\pi R m$.

1.123. Az ábra a gömb és a henger egy síkmetszetét ábrázolja. Az ábra jelöléseit használva, a henger térfogata:

$$V = 2\pi\cdot U, \text{ ahol } U = x^2\cdot y \text{ és } x^2+y^2=1, \quad 0\le x\le 1.$$

Ezért $U = x^2\sqrt{1-x^2}$. Számoljuk ki $\frac{U^2}{4}$ maximumát:

$$\frac{U^2}{4} = \frac{x^4(1-x^2)}{4} = \frac{x^2}{2}\cdot\frac{x^2}{2}\cdot(1-x^2)$$



Az itt szereplő három pozitív szám összege x-től függetlenül 1, és így szorzatuk akkor maximális, ha megegyeznek:

$$\frac{x^2}{2} = 1-x^2 \text{ azaz } x = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}, \quad y = \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

Tehát a maximális térfogat: $V = \frac{4\pi}{3\sqrt{3}}$.

1.124. Mikor az első egyenlőség mindkét oldalából kivonjuk a $\frac{c}{\sqrt{2}}$ számot, negatív számot kapunk. Ezzel beszorozva az $a < c$ egyenlőtlenséget, az egyenlőtlenség megfordul.

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

1.4 Halmazok

1.126. A (b)-ben szereplő halmazzal: $\overline{A \cup B} = \{x : x \notin A \wedge x \notin B\}$.

1.128. Igaz az állítás.

$$x \in (A \setminus B) \iff (x \in A) \wedge (x \notin B) \iff (x \in A) \wedge (x \in \overline{B}) \iff$$
$$\iff x \in (A \cap \overline{B})$$

1.131. Nem igaz, legyen például $A = B = \{1\} \subset \mathbb{R}$. Ekkor $\overline{A} \setminus B = \overline{A} = \mathbb{R} \setminus \{1\}$, viszont $A \setminus \overline{B} = A = \{1\}$.

1.132. Nem igaz, legyen például $A = B = \{1\}$. Ekkor $(A \cup B) \setminus A = \emptyset \neq B$.

1.135. Igaz az állítás.

Első bizonyítás.

Megmutatjuk, hogy $A \setminus B \subset A \setminus (A \cap B)$, és azt is, hogy $A \setminus (A \cap B) \subset A \setminus B$.

Legyen $x \in A \setminus B$ tetszőleges. Ekkor $x \notin B$ és ezért $x \notin A \cap B$. Mivel $x \in A$, ezért $x \in A \setminus (A \cap B)$.

Legyen most $x \in A \setminus (A \cap B)$ tetszőleges. Ekkor $x \notin A \cap B$. Mivel $x \in A$, ezért $x \notin B \setminus A$. Így tehát $x \notin (B \setminus A) \cup (A \cap B) = B$. Eszerint $x \in A \setminus B$.

Második bizonyítás. (lásd a 1.128. feladatot)

$$A \setminus (A \cap B) = A \cap \overline{(A \cap B)} = A \cap (\overline{A} \cup \overline{B}) = (A \cap \overline{A}) \cup (A \cap \overline{B}) =$$
$$= \emptyset \cup (A \cap \overline{B}) = (A \cap \overline{B}) = A \setminus B$$

1.136.

$$A \setminus (B \cup C)$$

1.138.

$$((A \cap B) \cup (A \cap C) \cup (B \cap C)) \setminus (A \cap B \cap C)$$

1.140.

$$x \in \overline{(A \cup B)} \iff x \notin (A \cup B) \iff (x \notin A) \wedge (x \notin B) \iff$$
$$\iff (x \in \overline{A}) \wedge (x \in \overline{B}) \iff x \in (\overline{A} \cap \overline{B})$$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

1.5 A valós számok axiómarendszere

1.144. **(a)** Nem igaz, például $x = -1,\ A = 0$ esetén.

(b) Igaz. Mivel az első egyenlőtlenség, $|x| < A$ bal oldala nem negatív, ezért saját magával szorozható, azaz $|x|^2 < A^2$. Mivel $|x|^2 = |x^2|$ ezért $|x^2| < A^2$.

1.147. **(a)** A H halmaznak nincs minimuma (minimális eleme).

(b) H-nak nincs maximuma.

(c) H-nak van maximuma.

(d) A H halmaznak van minimuma.

1.149. A (b) állítás nem igaz, a többi igaz.

1.152. $\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = \{0\}$

1.153. $\bigcap_{n=1}^{\infty} B_n = \emptyset$

1.157. Formálisan:

$$\exists x \in H\ \forall y \in H\ (x > 2 \wedge y \geq x^2)$$

Ez az állítás egyetlen $H \subset \mathbb{R}$ esetén sem teljesül, mert $y = x$ választással ha $x > 2$ $(x > 1)$ akkor $x < x^2$.

1.158. $M = \bigcap_{n=1}^{\infty} I_n = \{0\}$

Mivel minden $n \in \mathbb{N}^+$ esetén $-1/n \leq 0 \leq 1/n$, azaz $0 \in I_n$, ezért $0 \in M$. Ha $x \neq 0$, akkor van olyan $k \in \mathbb{N}^+$, amelyre $1/k < |x|$. Erre a k-ra $x \notin I_k = [-1/k, 1/k]$.

1.159. $M = \bigcap_{n=1}^{\infty} I_n = \{0\}$

1.164. $M = \bigcap_{n=1}^{\infty} I_n = \{0\}$

Mivel minden $n \in \mathbb{N}^+$ esetén $0 < 1/n$ azaz $0 \in I_n$, ezért $0 \in M$. Ha $x \neq 0$, akkor van olyan $k \in \mathbb{N}^+$, amelyre $1/k < |x|$. Erre a k-ra $x \notin I_k = [0, 1/k)$.

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

1.165. $M = \bigcap_{n=1}^{\infty} I_n = \emptyset$

Mivel minden $n \in \mathbb{N}^+$ esetén $0 \notin I_n$, ezért $0 \notin M$. Ha $x \neq 0$, akkor van olyan $k \in \mathbb{N}^+$, amelyre $1/k < |x|$. Erre a k-ra $x \notin I_k = (0, 1/k]$.

1.166. Egyedül a 1.166.e állítás igaz.

1.168. Nem lehet a Cantor-axióma miatt.

1.174. Nem lehet.

Akárhány zárt intervallum metszete vagy üres, vagy egy pont, vagy egy zárt intervallum. Ezért a metszet nem lehet valódi nyílt intervallum.

1.175. Lehet, de csak akkor, ha valahonnan kezdve ugyanazok az intervallumok.

Legyen ugyanis $I_n = (a_n, b_n)$. Az, hogy ezek egymásba vannak „skatulyázva", azt jelenti, hogy minden n esetén $a_n \leq a_{n+1} < b_{n+1} \leq b_n$

Legyen $a = \sup a_n, \quad b = \inf b_n$. Tudjuk, hogy $a \leq b$.

Négy esetet különböztetünk meg:

1) $a = \max a_n$ és $b = \min b_n$. Ez pontosan akkor teljesül, ha valahonnan kezdve $a_n = a_{n+1}$ és $b_n = b_{n+1}$. Ekkor $\bigcap_{n=1}^{\infty} I_n = I_N = (a, b)$.

2) $a = \max a_n$ és a b_n-ek között nincs minimális. Ekkor $\bigcap_{n=1}^{\infty} I_n = (a, b]$, ami üres, ha $a = b$ és nem üres balról nyílt, jobbról zárt intervallum, ha $a < b$.

3) a_n-ek között nincs maximális, de $b = \min b_n$. Ekkor $\bigcap_{n=1}^{\infty} I_n = [a, b)$.

4) a_n-ek között nincs maximális és a b_n-ek között nincs minimális. Ekkor $\bigcap_{n=1}^{\infty} I_n = [a, b]$.

1.176. A Cantor-axióma kivételél minden teljesül.

1.180. Minden véges tizedestört alakban felírható szám racionális, de például az 1/3-nak nincs véges tizedestört alakja.

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

Pontosan azoknak a racionális számoknak van véges tizedestört alakja, amelyek felírhatók úgy két egész szám hányadosaként, hogy a nevezőnek csak a 2 és az 5 a prímosztói.

1.183. Az I_n intervallumsorozatra két feltételt követel meg a Cantor-axióma:

1. Az I_n-ek korlátos zárt intervallumok.

2. Az I_n-ek „egymásba skatulyázottak”, azaz a nagyobb indexű intervallum része a kisebb indexűnek.

Ha az első feltételt elhagyom, akkor például az $I_n = (0, 1/n)$ nyílt intervallumsorozat metszete üres.

Ha a második feltételt hagyom el, akkor például az $I_n = [n, n+1]$ zárt intervallumsorozat metszete üres.

Megjegyzés:

a 2. feltétel helyettesíthető azzal a gyengébb feltétellel, hogy bármely véges sok intervallum metszete nem üres.

Ha a szereplő intervallumok tetszőleges típusúak és sem a bal sem a jobb végpontok sorozata nem „stabilizálódik”, azaz végtelen sok különböző bal és jobb végpont van, akkor (a 2. feltétel meghagyása mellett) a metszet nem üres.

1.6 A számegyenes

1.186. $B = \{2.6\}$, amely egyetlen pontból áll. Ez a feladat mutatja, hogy a tizedes vessző használata bizonyos helyzetekben félreérthető, hiszen a $\{2, 6\}$ halmaznak két eleme van.

1.187. $C = (2, 6)$

1.188. $D = \{2, 3, 4, 5, 6\}$

1.189. $E = [2, 6]$

1.190. $F = (2, 6]$

1.191. $G = [2, 6)$

1.192. $H = [2, 6] \cap \mathbb{Q}$, nem intervallum!

1.196. Az $A = \left\{ \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}^+ \right\}$ halmaz alulról korlátos, legnagyobb alsó korlátja a 0, felülről is korlátos, mert van maximuma, legnagyobb eleme az 1. Mivel alulról és felülről is korlátos, ezért korlátos.

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

1.201. Az $Ip = \{n \in \mathbb{N} : n \text{ prímszám } \wedge\ n+2 \text{ prímszám}\}$ halmaz, az úgynevezett ikerprímek halmaza alulról korlátos, hiszen például a 0 egy alsó korlát. Az, hogy felülről nem korlátos, azaz van-e végtelen sok ikerprím, a mai napig (2014. április 22.) nem ismert.

1.203. Ilyen sorozat például az $a_n = (-1)^n \cdot \left(1 - \frac{1}{n}\right)$, azaz

$$a_n = \begin{cases} 1 - \dfrac{1}{n} & \text{ha } n \text{ páros} \\ -1 + \dfrac{1}{n} & \text{ha } n \text{ páratlan} \end{cases}$$

1.206. $\forall x \in A\ \exists y \in A\ (y < x)$

1.209. $\sup(A \cup B) = \max\{\sup A, \sup B\}$, $\sup(A \cap B) = \min\{\sup A, \sup B\}$. Ha $\sup(A \setminus B) \neq \emptyset$, azaz $A \not\subseteq B$, akkor $\sup(A \setminus B) \leq \sup A$.

1.214. $A = \left\{\frac{1}{2n-1} : n \in \mathbb{N}^+\right\}$, $\inf A = 0$, $\sup A = \max A = 1$, nincs minimuma.

1.216. $A = \left\{\frac{1}{n} + \frac{1}{\sqrt{n}} : n \in \mathbb{N}^+\right\}$ esetén $\inf A = 0$, $\sup A = \max A = 2$, nincs minimuma.

1.220. $A = \left\{\frac{1}{n} + \frac{1}{k} : n \in \mathbb{N}^+\right\}$ esetén $\inf A = 0$, $\sup A = \max A = 2$, nincs minimuma.

1.222. Legyen $A = \left\{\sqrt[n]{2} : n \in \mathbb{N}^+\right\}$. Az világos, hogy $\sup A = \max A = 2$. Belátjuk, hogy $\inf A = 1$. Mivel $\sqrt[n]{2} > 1$, ezért 1 alsó korlát. Megmutatjuk, hogy tetszőleges $x > 0$ esetén $1 + x$ nem alsó korlát:

Mivel a Bernoulli-egyenlőtlenség szerint $(1+x)^n \geq 1 + nx$ és $1 + nx > 2$ ha $n > \frac{1}{x}$, ezért van olyan n (valahonnan kezdve mindegyik n), hogy $1 + x > \sqrt[n]{2}$.

1.223. Legyen $A = \left\{\sqrt[n]{2^n - n} : n \in \mathbb{N}^+\right\}$. Mivel minden $n \in \mathbb{N}^+$ esetén $2^n \geq n + 1$ a Bernoulli-egyenlőtlenség szerint, ezért $\sup A = \min A = 1$.

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

Másrészt $2^n - n < 2^n$, ezért A egy felső korlátja 2. Ez egyben az A halmaz szuprémuma is, $\sup A = 2$, mert

$$\sqrt[n]{2^n - n} \geq \sqrt[n]{2^n - 2^{n-1}} = 2 \cdot \frac{1}{\sqrt[n]{2}}$$

és az előző feladat szerint

$$\sup\left\{ \frac{1}{\sqrt[n]{2}} : n \in \mathbb{N}^+ \right\} = \frac{1}{\inf\left\{ \sqrt[n]{2} : n \in \mathbb{N}^+ \right\}} = 1$$

Mivel $2 \notin A$, ezért az A halmaznak nincs maximuma.

1.227. A szuprémum definíciója miatt elég megmutatni, hogy a B halmaz minden felső korlátja az A halmaznak is felső korlátja.

Legyen tehát K tetszőleges felső korlátja B-nek, továbbá $a \in A$ tetszőleges. A feltétel szerint van olyan $b \in B$, amelyre $a \leq b$. Mivel K felső korlát, ezért $b \leq K$ is teljesül. Így tehát tetszőleges $a \in A$ esetén $a \leq K$, azaz K felső korlátja A-nak.

1.230. $\mathbf{Q} \Longrightarrow \mathbf{P}$:

$$|x-y| = |(x-A)+(A-y)| \leq |x-A|+|A-y| = |x-A|+|y-A| < \varepsilon+\varepsilon = 2\varepsilon.$$

$\mathbf{P} \not\Longrightarrow \mathbf{Q}$:

Legyen például $x = y = 0,\ \varepsilon = 1$ és $A = 2$.

1.235. $\mathbf{P} \not\Longrightarrow \mathbf{Q}$: Legyen például $H = (1, 2]$. Ekkor $\mathbf{P}$ teljesül de az $a = 1$ választás mutatja, hogy $\mathbf{Q}$ nem teljesül.

$\mathbf{Q} \not\Longrightarrow \mathbf{P}$: Legyen például $H = \{-1\}$.

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

Számsorozatok konvergenciája

2.1 Sorozatok határértéke

2.1. Mivel $a_n \to 1$, ezért megadhatók a keresett küszöbindexek.

(a) $\varepsilon = 0,1$

$$|a_n - 1| = \left|1 + \frac{1}{\sqrt{n}} - 1\right| = \frac{1}{\sqrt{n}} < 0,1 \iff \sqrt{n} > 10 \iff n > 10^2$$

Tehát az $n_0 = 10^2$ választás megfelel.

(b) $\varepsilon = 0,01$ Az előző megoldásban $0,1$-et $0,01$-re cserélve kapjuk, hogy az $n_0 = 10^4$ választás megfelel.

2.2. Nincs ilyen n_0 küszöbindex, ugyanis az előző feladat **(a)** részének megoldása szerint ha
$n > 10^4$, akkor $|a_n - 1| < 0,1$. Ezért ezekre az n-ekre

$$|a_n - 2| = |(a_n - 1) - (2 - 1)| \geq |1 - |a_n - 1|| > 1 - 0,1 = 0,9 > 0,001.$$

2.3. Ezek a feladatok a konvergencia definíciójában szereplő jelek (logikai kvantorok, egyenlőtlenség) sorrendjének és típusának a fontosságát mutatják meg.

(a) Igaz. A 2.1. feladatot általánosítva könnyen látható, hogy $a_n \to 1$ és ez a formula éppen ezt mondja.

(b) Nem igaz. Ez a formula pontosan akkor teljesül egy (a_n) sorozatra, ha valahonnan kezdve a sorozat minden tagja 1. A megadott sorozat nem ilyen.

(c) Igaz. A formula pontosan akkor teljesül egy (a_n) sorozatra, ha a sorozat korlátos. A megadott sorozat korlátos.

(d) Nem igaz. A formula pontosan akkor teljesül egy (a_n) sorozatra, ha van olyan nyílt (ε sugarú) intervallum az 1 körül, amelyik a sorozatnak csak véges sok tagját tartalmazza.

(e) Igaz. A formula pontosan akkor teljesül egy (a_n) sorozatra, ha a sorozat első tagja $a_1 = 1$, ugyanis az $n_0 = 1$ választás minden ε esetén megfelel.

(f) Nem igaz. A formula pontosan akkor teljesül egy (a_n) sorozatra, ha a sorozat első tagja $a_1 \neq 1$.

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

2.4. Megmutatjuk, hogy elég nagy n-re $b_n > a_n$:

$10n^2 + 25 \leq 10n^2 + n^2 = 11n^2$, ha $n \geq 5$.

Másrészt $11n^2 < n^3$, ha $n > 11$.

Így az $N = 11$ választással $b_n > a_n$, ha $n > N$.

2.6. Az (a_n) a nagyobb valahonnan kezdve:

$$3^n - n^2 > 2^n + n \iff 3^n > 2^n + n^2 + n.$$

Belátjuk először, hogy valahonnan kezdve $2^n > n^2$. A binomiális kifejtést használva

$$2^n = (1+1)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} > \binom{n}{3} = \frac{n(n-1)(n-2)}{6} > \\ > \left(\frac{n}{2}\right)^3 \cdot \frac{1}{6} = \frac{n^3}{48} > n^2$$

Ez teljesül ha egyrészt $n - 2 > \dfrac{n}{2}$, azaz $n > 4$, másrészt $n > 48$. Tehát $n > 48 = 2^3 \cdot 6$ esetén

$$2^n + n^2 + n < 2^n + 2^n + 2^n = 3 \cdot 2^n < 3^n.$$

Az egyenlőtlenség biztosan teljesül, ha

$$\left(\frac{3}{2}\right)^n = (1 + 0,5)^n > 3.$$

Ez utóbbi pedig a Bernoulli-egyenlőtlenség szerint igaz, ha $n > 4$.

Tehát összefoglalva a keresett N számra kapott feltételeket, az $N = 48$ választás megfelel.

2.8. A (b_n) a nagyobb valahonnan kezdve:

Ha $n > 3$, akkor

$$n! = 6 \cdot (4 \cdot 5 \cdots n) > 6 \cdot 4^{n-3} = \frac{6}{4^3} 2^{2n} > 2^n$$

Az egyenlőtlenség teljesül, ha $2^n > \dfrac{4^3}{6} = \dfrac{2^7}{3}$, ez pedig akkor, ha $n > 8$. Tehát az $N = 8$ választás megfelel.

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

2.16.

$$\sqrt[n]{2} < 1,01 = 1 + 0,1 \iff 2 < (1 + 0,1)^n$$

A Bernoulli-egyenlőtlenség szerint

$$(1 + 0,1)^n \geq 1 + 0,1n > 0,1n > 2$$

ha $n > 20$.

2.17.

$$\sqrt[n]{n} < 1,0001 \iff n < \left(1 + 10^{-4}\right)^n$$

A binomiális kifejtést használva

$$\left(1 + 10^{-4}\right)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} 10^{-4k} > \binom{n}{2} 10^{-8} = \frac{n(n-1)}{2 \cdot 10^8} > \frac{n^2}{8 \cdot 10^8} > n$$

ha $n > 8 \cdot 10^8$.

2.25.

$$\sqrt{n^2+5} - n = (\sqrt{n^2+5} - n) \cdot \frac{\sqrt{n^2+5} + n}{\sqrt{n^2+5} + n} = \frac{5}{\sqrt{n^2+5} + n} < \frac{5}{n} < 0,01$$

ha $n > 500$.

2.28. $\mathbf{P} \implies \mathbf{Q}$, mert a legkisebb tag alsó korlát, a legnagyobb pedig felső korlát.

$\mathbf{Q} \not\Longrightarrow \mathbf{P}$, mert például az $a_n = \dfrac{1}{n}$ sorozat korlátos, de nincs legkisebb eleme.

2.29. **(b)** igaz, a többi nem igaz.

2.40.

$$\lim_{n\to\infty} \frac{2n^6 + 3n^5}{7n^6 - 2} = \frac{2}{7}$$

$$\left| \frac{2n^6 + 3n^5}{7n^6 - 2} - \frac{2}{7} \right| = \frac{7(2n^6 + 3n^5) - 2(7n^6 - 2)}{7(7n^6 - 2)} = \frac{21n^5 + 4}{7(7n^6 - 2)} <$$

$$< \frac{21n^5 + 4n^5}{7(7n^6 - 2n^6)} = \frac{25}{35} \cdot \frac{1}{n} < \frac{1}{n} < \varepsilon.$$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

Ez utóbbi egyenlőtlenség biztosan teljesül, ha $n > \frac{1}{\varepsilon}$, és így küszöbindexnek megfelel a

$$n_0 = \left[\frac{1}{\varepsilon}\right] + 1$$

2.47. $\lim\limits_{n\to\infty}(\sqrt{n^2+1}-n) = \lim\limits_{n\to\infty}(\sqrt{n^2-1}-n) = 0$, ezért $\lim\limits_{n\to\infty}(\sqrt{n^2+1}+\sqrt{n^2-1}-2n) = 0$.

Keressünk küszöbindexet $\frac{\varepsilon}{2}$-höz külön az $a_n = \sqrt{n^2+1}-n$ és a $b_n = \sqrt{n^2-1}-n$ sorozathoz.

$$|a_n| = \sqrt{n^2+1}-n = \frac{1}{\sqrt{n^2+1}+n} < \frac{1}{n} < \frac{\varepsilon}{2}$$

teljesül, ha $n > \frac{2}{\varepsilon}$.

$$|b_n| = n-\sqrt{n^2-1} = \frac{1}{n+\sqrt{n^2-1}} < \frac{1}{n} < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Ez is teljesül, ha $n > \frac{2}{\varepsilon}$, tehát az $n_0 = \left[\frac{2}{\varepsilon}\right]$ megfelel küszöbindexnek:

$$\left|\sqrt{n^2+1}+\sqrt{n^2-1}-2n\right| \le \left|\sqrt{n^2+1}-n\right| + \left|\sqrt{n^2-1}-n\right| < \\ < \frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

ha $n > n_0$.

2.49.

(a) Az (a_n) sorozat oszcillálva divergens.

(b) Az (a_n) sorozat konvergens, $a_n \to 4$.

(c) Az (a_n) sorozat divergens, $a_n \to \infty$.

(d) Az (a_n) sorozat oszcillálva divergens.

2.55. Legyen például $a_n = \frac{1}{n}, \quad b_n = \frac{1}{n^2}$.

2.58. Mivel $a > 0$, ezért az (a_n) sorozatnak csak véges sok tagja lehet negatív, így valahonnan kezdve $\sqrt{a_n}$ értelmes.

$$\left|\sqrt{a_n}-\sqrt{a}\right| = \frac{|a_n-a|}{\sqrt{a_n}+\sqrt{a}} \le \frac{|a_n-a|}{\sqrt{a}}$$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

Mivel $a_n \to a$, választhatunk olyan n_0 küszöbindexet, hogy $n > n_0$ esetén $|a_n - a| < \varepsilon \cdot \sqrt{a}$ legyen. Ez az n_0 megfelel a keresett küszöbindexnek:

$$\left|\sqrt{a_n} - \sqrt{a}\right| \leq \frac{|a_n - a|}{\sqrt{a}} < \frac{\varepsilon \cdot a}{\sqrt{a}} = \varepsilon,$$

ha $n > n_0$.

2.61. Mindegyik állítás igaz. Egyedül a **(d)** állítás jelenti azt, hogy $a_n \to \infty$.

2.66. A sorozat nem tarthat ∞-hez, de tarthat $-\infty$-hez vagy egy valós számhoz.

2.69. A sorozat nem tarthat $-\infty$-hez, de a többi eset lehetséges.

2.74.

$$\frac{\sqrt{1} + \sqrt{2} + \cdots + \sqrt{n}}{n} > \frac{\sqrt{\left[\frac{n}{2}\right]} + \cdots + \sqrt{n}}{n} > \frac{1}{n} \cdot \frac{n}{2} \cdot \sqrt{\left[\frac{n}{2}\right]} >$$

$$> \frac{1}{n} \cdot \frac{n}{2} \cdot \sqrt{\frac{n}{2} - 1} > K$$

ha $n > 8K^2 + 2$. Tehát megfelelő küszöbindex az $n_0 = [8K^2 + 2] + 1$.

2.81. A feltétel szerint van olyan N szám, hogy $n > N$ esetén

$$a_{n+1} - a_n > d = \frac{c}{2} > 0.$$

Teljes indukcióval könnyen látható, hogy $n > N$ esetén

$$a_n > a_N + d \cdot (n - N).$$

Mivel $\lim\limits_{n\to\infty} (a_N + d \cdot (n - N)) = \infty$, ezért a rendőr-szabály szerint $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = \infty$.

2.2 A határérték tulajdonságai

2.84. Mivel $\frac{1}{n} \to 0$ és $\frac{2}{n} \to 0$, ezért a rendőr-szabály szerint $b_n \to 0$.

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

2.89. Semmit sem lehet mondani a (b_n) viselkedéséről, tarthat bárhova és lehet oszcillálva divergens is.

2.91. Elég megmutatni, hogy a_{2n} és a_{2n+1} ugyanoda tart, mert a két részsorozatra kapott küszöbindexek közül a nagyobbik az egész sorozatra is megfelel.

Az a_{6n} közös részsorozata a_{2n}-nek és a_{3n}-nek, ezért

$$\lim_{n\to\infty} a_{2n} = \lim_{n\to\infty} a_{3n}.$$

Másrészt az a_{6n+3} közös részsorozata a_{2n+1}-nek és a_{3n}-nek, ezért

$$\lim_{n\to\infty} a_{2n+1} = \lim_{n\to\infty} a_{3n}.$$

2.95. Mivel $a > 0$, valahonnan kezdve $\frac{a}{2} < a_n < 2a$, és ezért

$$\sqrt[n]{\frac{a}{2}} < \sqrt[n]{a_n} < \sqrt[n]{2a}.$$

Mivel tetszőleges $c \in \mathbb{R}^+$ esetén $\sqrt[n]{c} \to 1$, ezért a rendőr-szabály szerint $\sqrt[n]{a_n} \to 1$.

2.100.

$$b_n = \frac{a_n - 1}{a_n + 1} = \frac{a_n + 1 - 2}{a_n + 1} = 1 - \frac{2}{a_n + 1} \to 0$$

Fejezzük ki a_n-t b_n segítségével:

$$\frac{2}{a_n + 1} = 1 - b_n, \qquad a_n + 1 = \frac{2}{1 - b_n}, \qquad a_n = \frac{2}{1 - b_n} - 1$$

A határérték műveleti szabályait alkalmazva kapjuk, hogy $a_n \to 1$.

2.102. Valahonnan kezdve $0 \le \sqrt[n]{a_n} < 0,5$, és ezért $0 \le a_n < 0,5^n \to 0$.

2.107. $\mathbf{P} \not\Longrightarrow \mathbf{Q}$: legyen például $a_n = \frac{1}{\sqrt{n}}$

$\mathbf{Q} \Longrightarrow \mathbf{P}$: Legyen $\lim_{n\to\infty} a_n = a > 0$.

Első eset: $a = \infty$. Ekkor van olyan N küszöbindex, hogy $n > N$ esetén

$$a_n > 1 \ge \frac{1}{n}.$$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

Második eset: $0 < a < \infty$: Válasszunk az $\varepsilon = \frac{a}{2}$-höz egy N küszöbindexet, amelyre

$$|a_n - a| < \varepsilon \qquad \text{és} \qquad \frac{1}{n} < \varepsilon.$$

ha $n > N$. De akkor

$$\frac{1}{n} < \varepsilon = \frac{a}{2} = a - \varepsilon < a_n.$$

2.111. Az állításból következik, hogy $a_n \to \infty$, „rendőr-szabály a végtelenre”:
Legyen ugyanis $K \in \mathbb{R}$ tetszőleges. Mivel $b_n \to \infty$, ezért van olyan N küszöbindex, hogy $n > N$ esetén $K < b_n$. De a feltétel szerint ezekre az n-ekre $K < a_n$ is igaz.

2.114. Semmi sem következik:
az (a_n) sorozat lehet konvergens, például ha $a_n = 0$,
tarthat ∞-hez, például ha $a_n = b_n - 1$
vagy $-\infty$-hez, például ha $a_n = -n$,
de lehet oszcillálva divergens is, például ha $a_n = (-1)^n$.

2.118. Korlátos, mert konvergens,

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\sqrt{1} + \sqrt{2} + \cdots + \sqrt{n}}{n^2} = 0,$$

ugyanis

$$0 < \frac{\sqrt{1} + \sqrt{2} + \cdots + \sqrt{n}}{n^2} \le \frac{\sqrt{n} + \sqrt{n} + \cdots + \sqrt{n}}{n^2} = \frac{n\sqrt{n}}{n^2} = \frac{1}{\sqrt{n}} \to 0.$$

2.120. Mivel valahonnan kezdve $2^n < \frac{1}{2}3^n$, ezért

$$\frac{3}{\sqrt[n]{2}} = \sqrt[n]{3^n - \frac{1}{2}3^n} < \sqrt[n]{3^n - 2^n} < \sqrt[n]{3^n} = 3,$$

ha n elég nagy. Az egyenlőtlenség baloldala $\frac{3}{\sqrt[n]{2}} \to 3$, és ezért a rendőr-szabály szerint

$$\sqrt[n]{3^n - 2^n} \to 3.$$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

2.125. Hozzuk egyszerűbb alakra a sorozat tagjait:

$$a_n = \frac{1-2+3-\cdots-2n}{\sqrt{n^2+1}} = \frac{(1-2)+(3-4)+\cdots+(2n-1-2n)}{\sqrt{n^2+1}} = \\ = -\frac{n}{\sqrt{n^2+1}}$$

Végig osztva a számlálót és a nevezőt a nevező nagyságrendjével, n-nel, kapjuk, hogy

$$a_n = -\frac{n}{\sqrt{n^2+1}} = -\frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{n^2}}} \to -1.$$

2.131. A 2.181. feladat szerint $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ monoton növő sorozat, és ezért $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n \geq 2$.

$$a_n = \left(1+\frac{1}{n}\right)^{n^2} = \left[\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\right]^2 \geq 2^n \to \infty.$$

2.140. Ennél a törtnél a nevező „nagyságrendje” 7^n, de a váltakozó előjel problémát okoz. Megmutatjuk, hogy $a_n = \frac{2^n+3^n}{4^n+(-7)^n} \to 0$. Ehhez elég azt megmutatni, hogy $|a_n| \to 0$.

$$|a_n| = \left|\frac{2^n+3^n}{4^n+(-7)^n}\right| \leq \frac{2^n+3^n}{7^n-4^n} = \frac{\left(\frac{2}{7}\right)^n+\left(\frac{3}{7}\right)^n}{1-\left(\frac{4}{7}\right)^n} \to 0.$$

2.146. **P** $\not\Rightarrow$ **Q**: legyen

$$a_n = \begin{cases} 1 & \text{ha } n \text{ páros} \\ 1/n & \text{ha } n \text{ páratlan} \end{cases}, \qquad b_n = \begin{cases} 1/n & \text{ha } n \text{ páros} \\ 1 & \text{ha } n \text{ páratlan} \end{cases}$$

Q $\not\Rightarrow$ **P**: legyen $a_n = \frac{1}{n}$, $\quad b_n = n$

Megjegyzés: Ha az egyik sorozat 0-hoz tart, a másik pedig korlátos, akkor igaz, hogy $a_n \cdot b_n$ tart 0-hoz.

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

2.152. **(a)** $\frac{a_n}{b_n}$ konvergens és $\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n} > 0$: $a_n = n, \quad b_n = n+1.$

(b) $\frac{a_n}{b_n}$ konvergens és $\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n} = 0$: $a_n = n, \quad b_n = n^2.$

(c) $\frac{a_n}{b_n}$ divergens és $\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n} = \infty$: $a_n = n^2, \quad b_n = n.$

(d) $\frac{a_n}{b_n}$ oszcillálva divergens:

$$a_n = \begin{cases} n & \text{ha } n \text{ páros} \\ n^2 & \text{ha } n \text{ páratlan} \end{cases},$$

$$b_n = \begin{cases} n^2 & \text{ha } n \text{ páros} \\ n & \text{ha } n \text{ páratlan} \end{cases}$$

2.155. $\mathbf{P} \not\Longrightarrow \mathbf{Q}$: legyen például $a_n = n+1, \quad b_n = n.$

$\mathbf{Q} \Longrightarrow \mathbf{P}$: Mivel $b_n \to \infty$ ezért $\frac{1}{b_n} \to 0$ és így $\frac{a_n - b_n}{b_n} = \frac{a_n}{b_n} - 1 \to 0.$

2.3 Monoton sorozatok

2.159.

- Két pozitív tagú monoton növő/csökkenő sorozat szorzata monoton nő/csökken.
- Két negatív tagú monoton növő/csökkenő sorozat szorzata monoton csökken/nő.
- Egy pozitív tagú monoton növő és egy negatív tagú monoton csökkenő sorozat szorzata monoton csökken.
- Egy pozitív tagú monoton csökkenő és egy negatív tagú monoton növő sorozat szorzata monoton nő.

Más esetekben nem állíthatjuk biztosan, hogy a szorzat monoton.

2.164. Teljes indukcióval könnyen bizonyítható, hogy $a_n > a_1 \cdot (1,1)^{n-1}$. Elég tehát találnunk egy olyan n-et, amelyre $1,1^{n-1} > \frac{10^6}{a_1}$. A Bernoulli-egyenlőtlenség szerint

$$1,1^{n-1} = (1+0,1)^{n-1} \geq 1 + (n-1)\cdot 0,1 > (n-1)\cdot 0,1 > \frac{10^6}{a_1}.$$

Ez biztosan teljesül, ha $n - 1 > \frac{10^7}{a_1}$, azaz ha $n > \frac{10^7}{a_1} + 1$.

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

2.168. Első lépésként belátjuk, hogy a sorozat minden tagja pozitív, de ez teljes indukcióval nyilvánvaló. Most már jobb alsó becslést is mondhatunk a sorozat tagjaira: a (két tagú) számtani és mértani közepek közötti egyenlőtlenség szerint

$$a_{n+1} = \frac{1}{2}\left(a_n + \frac{a}{a_n}\right) \geq \sqrt{a_n \cdot \frac{a}{a_n}} = \sqrt{a}.$$

Belátjuk, hogy $n =$ 2-től kezdve az (a_n) sorozat monoton csökken. Felhasználva, hogy $a_n > 0$

$$\frac{1}{2}\left(a_n + \frac{a}{a_n}\right) \leq a_n \iff a_n^2 + a \leq 2a_n^2 \iff a_n^2 \geq a \iff a_n \geq \sqrt{a}.$$

De az előbb már beláttuk, hogy minden $n \geq 2$ esetén $a_n \geq \sqrt{a}$, tehát a sorozat monoton csökken és (alulról) korlátos, de akkor konvergens. Legyen $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = b$, és persze $b \geq \sqrt{a}$. De akkor $\lim\limits_{n\to\infty} a_{n+1} = b$ is igaz. Másrészt

$$a_{n+1} = \frac{1}{2}\left(a_n + \frac{a}{a_n}\right) \to \frac{1}{2}\left(b + \frac{a}{b}\right).$$

Tehát

$$\frac{1}{2}\left(b + \frac{a}{b}\right) = b \iff b = \sqrt{a}.$$

2.173. A rekurzív képletből könnyű kiolvasni, hogy $a_n \geq 0$ (sőt azt is, hogy $a_n \geq \sqrt{2}$, ha $n > 1$). Másrészt teljes indukcióval bizonyítjuk, hogy $a_n < 2$.

$n = 1$ re ez igaz. Tegyük fel, hogy n-re igaz, hogy $a_n < 2$.

$$a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n} < \sqrt{2 + 2} = 2.$$

Megmutatjuk, hogy a sorozat monoton nő. Oldjuk meg a $\sqrt{2+x} \geq x$ egyenlőtlenséget a nemnegatív számok körében:

$$\sqrt{2+x} \geq x \iff 2 + x \geq x^2 \iff x^2 - x - 2 \leq 0 \iff 0 \leq x \leq 2.$$

Mivel már beláttuk, hogy $0 \leq a_n < 2$, ezért x helyébe írhatunk a_n-et, és így $a_{n+1} \geq a_n$. Tehát (a_n) monoton nő és (felülről) korlátos, ezért konvergens. Legyen $a = \lim\limits_{n\to\infty} a_n$. Mivel a sorozat tagjai nemnegatívok, ezért $a \geq 0$. A határérték műveleti szabályai és a rekurzív képlet miatt

$$a = \sqrt{2 + a} \iff a = 2.$$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

2.180. $a_1 > 0$ és ha $a_n > 0$, akkor $a_{n+1} = a_n + \dfrac{1}{a_n^3 + 1} > 0$, ezért minden n-re $a_n > 1$. A rekurzív képlet szerint

$$a_{n+1} - a_n = \frac{1}{a_n^3 + 1} > 0,$$

tehát a sorozat (szigorúan) monoton nő. Indirekt módon megmutatjuk, hogy a sorozat nem konvergens és ezért nem is korlátos. Ha $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$, akkor $a \geq 0$, mert $a_n \geq 0$, és ezért $a^3 + 1 \neq 0$.

$$a = a + \frac{1}{a^3 + 1}.$$

De ennek az egyenletnek nincs megoldása! Tehát (a_n) monoton nő és nem korlátos, ezért $a_n \to \infty$.

2.181. Megmutatjuk, hogy a sorozat szigorúan monoton nő. Felhasználva az $n+1$ tagú számtani és mértani közepek egyenlőtlenségét

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = 1 \cdot \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < \left(\frac{1 + n \cdot \left(1 + \frac{1}{n}\right)}{n+1}\right)^{n+1} = \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1}.$$

Most belátjuk, hogy

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < 4 \iff \frac{1}{4}\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < 1.$$

Most $n+2$ tagra használva a számtani és mértani közepek egyenlőtlenségét

$$\frac{1}{4}\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < \left(\frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + n \cdot \left(1 + \frac{1}{n}\right)}{n+2}\right)^{n+2} = 1.$$

Tehát az $\left(1 + \dfrac{1}{n}\right)^n$ sorozat konvergens. A sorozat határértékét **Euler-konstansnak** nevezzük és e-vel jelöljük. Belátható, hogy $2 < e < 3$, e irracionális (sőt transzcendens) és $e = 2,71\ldots$.

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

2.4 A Bolzano-Weierstrass-tétel és a Cauchy-kritérium

2.186. **P** $\not\Longrightarrow$ **Q**: legyen $a_n = (-1)^n$

Q $\Longrightarrow$ **P**: Ha (a_n) konvergens, akkor minden részsorozata is konvergens (és ugyanoda tart).

2.189. Ez a feltétel nem elég (viszont szükséges) a konvergenciához. Ha például $a_n = \sqrt{n}$, akkor $\sqrt{n+1} - \sqrt{n} \to 0$ de $\sqrt{n} \to \infty$.

2.195. Az (a_n) sorozatnak pontosan akkor nincs konvergens részsorozata a Bolzano-Weierstrass-tétel szerint, ha nincs korlátos részsorozata.

Ez akkor igaz, ha minden $K > 0$ valós számra csak véges sok tagja van a sorozatnak a $[-K, K]$ intervallumban, azaz véges sok n kivételével $|a_n| > K$.

Ez pedig éppen azt jelenti, hogy $|a_n| \to \infty$.

2.198. Belátjuk, hogy a sorozatra teljesül a Cauchy-kritérium. Legyen $\varepsilon > 0$ tetszőleges, továbbá $n < m$.

$$\begin{aligned} |a_n - a_m| &= |(a_{n+1} - a_n) + (a_{n+2} - a_{n+1}) + \cdots + (a_m - a_{m-1})| \leq \\ &\leq |a_{n+1} - a_n| + |a_{n+2} - a_{n+1}| + \cdots + |a_m - a_{m-1}| \leq \\ &\leq 2^{-n} + 2^{-(n+1)} + \cdots + 2^{-(m-1)} = \\ &= 2^{-n} \cdot 2 \cdot \left(1 - 2^{-(m-n)}\right) < 2^{-(n-1)}. \end{aligned}$$

Mivel $2^{-(n-1)} \to 0$, ezért valahonnan kezdve

$$|a_n - a_m| < 2^{-(n-1)} < \varepsilon.$$

2.5 Sorozatok nagyságrendje

2.203.

$$n^n \sim n! + n^n, \qquad \sqrt{n} \sim \sqrt{n+1}.$$

Más aszimptotikusan egyenlő pár nincs a sorozatok között. Habár $\frac{\sqrt[n]{2}}{\sqrt[n]{n}} \to 1$, de ezek a sorozatok nem tartanak ∞-hez.

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

2.210.

$$\frac{3,01^n}{2^n+3^n}=\frac{\left(\frac{3,1}{3}\right)^n}{\left(\frac{2}{3}\right)^n+1}.$$

Itt a számláló ∞-hez tart, mert $\frac{3,1}{3}>1$, a nevező pedig 1-hez, mert $\frac{2}{3}<1$. Tehát

$$\lim_{n\to\infty}\frac{3,01^n}{2^n+3^n}=\infty.$$

2.216. A nevező nagyságrendje 2^n.

$$\frac{n!-3^n}{n^{10}-2^n}=\frac{\frac{n!}{2^n}-\left(\frac{3}{2}\right)^n}{\frac{n^{10}}{2^n}-1}.$$

Mivel $\frac{n^{10}}{2^n}\to 0$, ezért a nevező -1-hez tart. Viszont a számláló még mindig kritikus, két végtelenhez tartó sorozat különbsége. Felhasználva, hogy $n!>\left(\frac{n}{4}\right)^n$,

$$\frac{n!}{2^n}-\left(\frac{3}{2}\right)^n>\left(\frac{n}{8}\right)^n-\left(\frac{3}{2}\right)^n>\left(\frac{24}{8}\right)^n-\left(\frac{3}{2}\right)^n>$$
$$>2\cdot\left(\frac{3}{2}\right)^n-\left(\frac{3}{2}\right)^n=\left(\frac{3}{2}\right)^n,$$

ha $n\geq 24$. Így tehát a számláló ∞-hez tart és

$$\frac{n!-3^n}{n^{10}-2^n}\to-\infty.$$

2.6 Vegyes feladatok

2.222. A sorozat nem áll elő az $(1/n)$ sorozat **véges sok** tagú összegeként, hiszen az a_n-ben szereplő összeg tagjainak a száma tart végtelenhez. Tehát az első okoskodás a hibás.

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

2.225. $a_n \to 0$.

Ugyanis van olyan N küszöbindex, hogy $n > N$ esetén

$$0 < \sqrt[n]{a_n} < \frac{2}{3} \iff 0 < a_n < \left(\frac{2}{3}\right)^n$$

Mivel $\left(\frac{2}{3}\right)^n \to 0$, ezért a rendőr-szabály szerint $a_n \to 0$.

2.228. $a_n^n \to 0$.

Ugyanis van olyan N küszöbindex, hogy $n > N$ esetén

$$0 < a_n < \frac{2}{3}, \iff 0 < a_n^n < \left(\frac{2}{3}\right)^n$$

Mivel $\left(\frac{2}{3}\right)^n \to 0$, ezért a rendőr-szabály szerint $a_n^n \to 0$.

2.232. Legyen például $a_n = \frac{1}{n}$.

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

Valós függvények határértéke, folytonossága

3.1 Függvények globális tulajdonságai

3.3. Igen, függvény. A neve Dirichlet-függvény.

3.8. $-\infty < x < 0$.

3.11. Írjuk fel a függvények értelmezési tartományát és a függvény formulát egyszerűbb alakban:

(a) $f_1(x) = x$, $D_{f_1} = (-\infty, \infty)$

(b) $f_2(x) = \sqrt{x^2} = |x|$, $D_{f_2}(-\infty, \infty)$

(c) $f_3(x) = \left(\sqrt{x}\right)^2 = x$ $D_{f_3} = [0, \infty)$

(d) $f_4(x) = \ln e^x = x$ $D_{f_4} = (-\infty, \infty)$

(e) $f_5(x) = e^{\ln x} = x$ $D_{f_5} = (0, \infty)$

(f) $f_6(x) = \left(\sqrt{-x}\right)^2 = |x|$ $D_{f_6} = (-\infty, 0]$

Mivel két függvény pontosan akkor egyezik meg, ha megegyezik az értelmezési tartományuk és minden helyen ugyanazt az értéket veszik fel, ezért csak az f_1 és az f_4 függvények egyeznek meg egymással.

3.14. Páratlan.

3.19. Páros.

3.22. Páros is és páratlan is.

3.25. Se nem páros, se nem páratlan.


3.28. Igaz.

3.29. Nem igaz, például $f(x) = \begin{cases} x & \text{ha } x \neq -5 \\ 5 & \text{ha } x = -5 \end{cases}$

3.34. A $\operatorname{ctg} x$ és az $\dfrac{1}{x}$ függvény az egész értelmezési tartományán (szigorúan) csökken, a többinek vannak monoton növő szakaszai.

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó



3.38. Igaz. Két szigorúan monoton csökkenő (növő) függvény összege szigorúan monoton csökken (nő).

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

3.39. Általában nem igaz, például ha $f(x) = g(x) = -x$, akkor $f(x) \cdot g(x) = x^2$ nem (mindenütt) csökken.

Ha viszont mindkét függvény pozitív és szigorúan monoton csökken (nő), akkor a szorzatuk is szigorúan monoton csökken (nő).

3.43. Alulról korlátos, legnagyobb alsó korlát a 0. Felülről nem korlátos.

3.47. Alulról korlátos, legnagyobb alsó korlát a 0. Felülről is korlátos, legkisebb felső korlát az 1.

3.51. $\forall x \in \mathbb{R}\,(f(x) \le f(3))$. Például $f(x) = -(x-3)^2$.

3.54. $\forall x \in \mathbb{R}\ \exists y \in \mathbb{R}\ \ (f(y) < f(x))$. Például $f(x) = x$.

3.57. $m = 0$, M nem létezik.

3.60. $m = -1, \quad M = 1$.

3.63. $m = -1, \quad M = 0$.

3.66. Például $\operatorname{arctg} x$.

3.68. Például $f(x) = \begin{cases} x & \text{ha } -1 < x < 1 \\ 0 & \text{ha } x = -1 \text{ vagy } x = 1 \end{cases}$

3.74. 2π

3.76. 4π

3.78. 2π

3.79. 2π

3.82. A Dirichlet-függvénynek minden nem nulla racionális szám periódusa, ezért nincs legkisebb periódusa.

3.86. A $\sqrt{x}$ függvény (szigorúan) konkáv a $(0, \infty)$ félegyenesen.

Elég belátni, hogy minden $0 < a < x < b$ esetén

$$\sqrt{x} > \frac{\sqrt{b} - \sqrt{a}}{b - a}(x - a) + \sqrt{a}$$

azaz

$$\frac{\sqrt{x} - \sqrt{a}}{x - a} > \frac{\sqrt{b} - \sqrt{a}}{b - a}.$$

Átalakítás után

$$\frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{a}} > \frac{1}{\sqrt{b} + \sqrt{a}} \iff \sqrt{b} + \sqrt{a} > \sqrt{x} + \sqrt{a} \iff \sqrt{b} > \sqrt{x}.$$

Mivel a feltevés szerint $0 < x < b$, ezért az utolsó egyenlőtlenség igaz.

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

3.92. $\mathbf{P} \not\Longrightarrow \mathbf{Q}$: Például $f(x) = \sin \pi x$

$\mathbf{Q} \Longrightarrow \mathbf{P}$: Ha az $f(x)$ függvény konvex $(-1, 3)$-on, akkor minden $-1 < a < b < 3$ és $0 < t < 1$ esetén

$$f(ta + (1-t)b) \le tf(a) + (1-t)f(b).$$

Az $a = 0,\ b = 2,\ t = \dfrac{1}{2}$ választással épp a **P**-ben szereplő egyenlőtlenséget kapjuk.

3.96. A húr egyenlete


$$h(x) = \frac{\log_7 4 - \log_7 2}{4-2}(x-2) + \log_7 2 = \frac{\log_7 2}{2}x.$$

Írjunk x helyébe 3-at. Mivel $\log_7 x$ konkáv, ezért

$$\log_7 3 \ge h(3) = \frac{3\log_7 2}{2} = \frac{\log_7 8}{2} = \frac{\log_7 2 + \log_7 4}{2}.$$

3.100. Mivel a függvény a $[2, 4]$ intervallumon egyszerre konvex és konkáv, ezért itt csak lineáris kifejezés lehet. Legyen például

$$f(x) = \begin{cases} (x-2)^2 & \text{ha } 1 \le x \le 2 \\ 0 & \text{ha } 2 < x \le 4 \\ -(x-4)^2 & \text{ha } 4 < x \le 5 \end{cases}$$



3.112. Az x, x^3, $\sqrt[3]{x}$ és az $f(x) = \begin{cases} 1/x & \text{ha } x \ne 0 \\ 0 & \text{ha } x = 0 \end{cases}$ függvények bijekciók, a többi nem az.

3.114. $f(x) = x^2$ invertálható $[0, \infty)$-en, itt $f^{-1}(x) = \sqrt{x}$ és $(-\infty, 0]$-n, itt $f^{-1}(x) = \sqrt{-x}$.

3.116. $f(x) = \sin x$ tetszőleges $n \in \mathbb{Z}$ esetén invertálható a $[-\pi/2 + n\pi, \pi/2 + n\pi]$ intervallumon. Az inverz függvény minden esetben a $[-1, 1]$ zárt

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

intervallumon van értelmezve. Ha $\arcsin x$ jelöli a $\sin x$ inverzét a $[-\pi/2, \pi/2]$ intervallumon, akkor a $[-\pi/2+n\pi, \pi/2+n\pi]$ intervallumon

$$f^{-1}(x) = \begin{cases} n\pi + \arcsin x & \text{ha } n \text{ páros} \\ n\pi - \arcsin x & \text{ha } n \text{ páratlan} \end{cases}$$

vagy másképp felírva

$$f^{-1}(x) = n\pi + (-1)^n \arcsin x.$$

3.122. **(a)** Van ilyen, de csak egy, az azonosan nulla függvény.

Az, hogy egy függvény grafikonja szimmetrikus az x tengelyre, pontosan akkor teljesül, ha minden $x \in D_f$ esetén $f(x) = -f(x)$.

(b) Van, például az $f(x) = x^2$ függvény.

Az, hogy egy függvény grafikonja szimmetrikus az y tengelyre, pontosan akkor teljesül, ha minden $x \in D_f$ esetén $f(-x) = f(x)$, azaz a függvény páros.

3.125. Belátjuk, hogy az $f(x)$ függvénynek a 4 periódusa. Előbb fejezzük ki $f(x+2)$-t $f(x)$ segítségével:

$$f(x+2) = \frac{1+f(x+1)}{1-f(x+1)} = \frac{1+\dfrac{1+f(x)}{1-f(x)}}{1-\dfrac{1+f(x)}{1-f(x)}} = -\frac{1}{f(x)}.$$


Mivel ez minden x-re igaz,

$$f(x+4) = -\frac{1}{f(x+2)} = -\frac{1}{-\dfrac{1}{f(x)}} = f(x).$$

3.128. A $h = g \circ f$ függvény mindenütt értelmezve van és $h(x) = g(f(x)) = x$. A $g(x)$ függvény mégsem az f függvény inverze, mert értelmezési tartománya bővebb mint f értékkészlete.

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó



$f(x)$ $g(x)$ $f^{-1}(x)$

3.2 A határérték

3.130.

(a) $\lim\limits_{x\to -2} f(x) = 0$ **(b)** $\lim\limits_{x\to -1} f(x) = -1$ **(c)** $\lim\limits_{x\to 0} f(x)$ nem létezik.

3.133. Igazak: (b), (d), (e), (f).
Hamisak: (a), (c), (g), (h), (i), (j), (k), (l).

3.136. $\lim\limits_{x\to 3} 5x = 5 \cdot \lim\limits_{x\to 3} x = 5 \cdot 3 = 15$

3.139. $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{-2}{7x-3} = \dfrac{-2}{7\cdot 1 - 3} = -\dfrac{1}{2}$

3.142. $\lim\limits_{x\to \pi/2} x \sin x = \dfrac{\pi}{2} \sin \dfrac{\pi}{2} = \dfrac{\pi}{2}$

3.148. $\dfrac{t^2+t-2}{t^2-1} = \dfrac{(t-1)(t+2)}{(t-1)(t+1)} = \dfrac{t+2}{t+1} \xrightarrow[t\to 1]{} = \dfrac{3}{2}$

3.149. $\dfrac{t^2+3t+2}{t^2-t-2} = \dfrac{(t+1)(t+2)}{(t+1)(t-2)} = \dfrac{t+2}{t-2} \xrightarrow[t\to -1]{} -\dfrac{1}{3}$

3.154. Bővítsük a törtet $\sqrt{x}+1$-gyel (a számláló „gyöktelenítése”).

$$\frac{\sqrt{x}-1}{x-1} = \frac{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)}{(x-1)(\sqrt{x}+1)} = \frac{x-1}{(x-1)(\sqrt{x}+1)} = \frac{1}{\sqrt{x}+1} \xrightarrow[x\to 1]{} \frac{1}{2}$$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

3.155. A $t = 1 + x^2$ helyettesítést elvégezve és az előző feladat eredményét felhasználva:

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{1+x^2}-1}{x^2} = \lim_{t\to 1} \frac{\sqrt{t}-1}{t-1} = \frac{1}{2}$$

Helyettesítés nélkül, „gyöktelenítéssel”:

$$\frac{\sqrt{1+x^2}-1}{x^2} = \frac{\sqrt{1+x^2}-1}{x^2} \cdot \frac{\sqrt{1+x^2}+1}{\sqrt{1+x^2}+1} = \frac{x^2}{x^2(\sqrt{1+x^2}+1)} =$$
$$= \frac{1}{\sqrt{1+x^2}+1} \underset{x\to 0}{\longrightarrow} \frac{1}{2}$$

3.156. Mivel a $\sin x$ páratlan függvény, ezért elég a „jobboldali” határértéket kiszámolni. Ha $0 < x < \frac{\pi}{2}$, akkor

$$0 < \sin x < x < \operatorname{tg} x$$

Osszuk el az egyenlőtlenségeket a pozitív $\sin x$-szel:

$$1 < \frac{x}{\sin x} < \frac{1}{\cos x}$$

Mivel a szereplő kifejezések mind pozitívak, vehetjük az egyenlőtlenségek reciprokait:

$$\cos x < \frac{\sin x}{x} < 1$$

Tudjuk, hogy $\lim_{x\to 0} \cos x = 1$, mert a $\cos x$ függvény folytonos a 0-ban. Ezért alkalmazható a rendőr-szabály:

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

3.157. Bővítsük a törtet $1 + \cos x$-szel:

$$\frac{1-\cos x}{x^2} = \frac{(1-\cos x)(1+\cos x)}{x^2(1+\cos x)} = \frac{\sin^2 x}{x^2} \cdot \frac{1}{1+\cos x} \to \frac{1}{2}$$

3.162. $\dfrac{\operatorname{tg} 2x}{x} = \dfrac{\operatorname{tg} 2x}{2x} \cdot 2 = \dfrac{\sin 2x}{2x} \cdot \dfrac{2}{\cos 2x} = \dfrac{\sin t}{t} \cdot \dfrac{2}{\cos t} \underset{t\to 0}{\longrightarrow} 2.$
Itt felhasználtuk, hogy $t = 2x \to 0$ ha $x \to 0$.

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

3.167. Osszuk el a számlálót és a nevezőt a nevező nagyságrendjével, x-szel. Ezzel megszüntetjük a határérték „kritikusságát”, a $\frac{\infty}{\infty}$ esetet. Ha $x > 0$, akkor

$$\frac{2x^2-7x+1}{\sqrt{x^2+1}+1} = \frac{2x-7+\frac{1}{x}}{\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}+\frac{1}{x}} \to \infty, \text{ ha } x \to \infty.$$

A $-\infty$-ben ugyanezt a határértéket kapjuk, ha negatív x esetén „nagyságrendnek” a $|x|$-szet választjuk.

3.172. $$\frac{2\sqrt{x}+x^{-1}}{3x-7} = \frac{2\frac{\sqrt{x}}{x}+\frac{1}{x^2}}{3-\frac{7}{x}} \to \frac{0+0}{3-0} = 0$$

3.176. $$\frac{2x^2-7x+1}{\sqrt{x^4+1}+1} = \frac{2-\frac{7}{x}+\frac{1}{x^2}}{\sqrt{1+\frac{1}{x^4}}+\frac{1}{x^2}} \to 2$$

3.180. $$\lim_{x\to 2^-} \frac{3}{x-2} = \frac{3}{0^-} = -\infty, \qquad \lim_{x\to 2^+} \frac{3}{x-2} = \infty.$$

3.184. $$\lim_{x\to 7^+} \frac{4}{(x-7)^2} = \lim_{x\to 7^-} \frac{4}{(x-7)^2} = \infty$$

3.190. Legyen $a = \sqrt[k]{e} > 1$.

$$\frac{x^k}{e^x} = \left(\frac{x}{a^x}\right)^k \to 0.$$

Ez az eredmény általánosabban azt jelenti, hogy az exponenciális függvény minden polinomnál gyorsabban tart a végtelenbe.

3.191. Vezessük be a $t = \ln x$ helyettesítést. Ekkor

$$\sqrt[k]{x} = \sqrt[k]{e^t} = \left(\sqrt[k]{e}\right)^t = a^t,$$

és ezért

$$\lim_{x\to\infty} \frac{\ln x}{\sqrt[k]{x}} = \lim_{t\to\infty} \frac{t}{a^t} = 0.$$

Eszerint tehát a logaritmus-függvény minden gyökös kifejezésnél lassabban tart a végtelenbe.

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

3.196. Legyen például

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{ha } x \in \mathbb{Q} \\ 1 & \text{ha } x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

Ennek a függvénynek az $x = -1$-ben és az $x = 1$-ben van határértéke, de másutt nincs.

3.198. Legyen $p > 0$ egy (pozitív) periódus, a és b pedig két olyan valós szám, amelyre $f(a) \neq f(b)$. Ekkor

$$x_n = a + n \cdot p \to \infty, \;\; f(a) = f(x_n) \to f(a),$$

$$y_n = b + n \cdot p \to \infty, \;\; f(b) = f(y_n) \to f(b).$$

Az átviteli elv szerint $\lim\limits_{x\to\infty} f(x)$ nem létezik.

3.203. $\mathbf{P} \implies \mathbf{Q}$: A szorzási szabály szerint

$$\lim_{x\to\infty} f^2(x) = \left(\lim_{x\to\infty} f(x)\right) \cdot \left(\lim_{x\to\infty} f(x)\right) = 5 \cdot 5 = 25.$$

$\mathbf{Q} \not\Longrightarrow \mathbf{P}$: Legyen például $f(x) = -5$.

3.206.

(a) $a_n = \sin(n\pi) = 0 \to 0$.

(b) Az $f(x) = \sin x$ függvény nem konstans periodikus függvény, ezért nincs határértéke a végtelenben (lásd a 3.198. feladatot).

(c) $a_n = \left[\frac{1}{n}\right] = 0$, ha $n > 1$, ezért $a_n \to 0$.

(d) Mivel $\lim\limits_{x\to 0^+} [x] = 0 \neq -1 = \lim\limits_{x\to 0^-} [x]$, ezért az $f(x) = [x]$ (x egészrésze) függvénynek nincs határértéke a 0-ban.

3.208. $\mathbf{P} \not\Longrightarrow \mathbf{Q}$: Legyen például $f(x) = \begin{cases} 5 & \text{ha valamely } n\text{-re } x = 1/n \\ 0 & \text{különben} \end{cases}$.

Ennek a függvénynek nincs határértéke 0-ban, de $f\left(\frac{1}{n}\right) = 5 \to 5$.

$\mathbf{Q} \implies \mathbf{P}$: Az átviteli elv szerint, mivel $\frac{1}{n} \to 0$ és $\lim\limits_{x\to 0} f(x) = 5$, ezért $f\left(\frac{1}{n}\right) \to 5$.

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

3.212. **P** $\Longrightarrow$ **Q**: Az átviteli elv szerint ez tetszőleges függvény esetén is igaz.
Q $\Longrightarrow$ **P**? Ha az f függvény monoton ((c) eset), akkor van (véges vagy végtelen) határértéke a végtelenben és akkor az átviteli elv miatt ez csak 0 lehet. A többi esetben nem igaz a következtetés: legyen $f(x) = \sin(\pi x)$. Ez egy folytonos és korlátos (nem konstans) periodikus függvény és nincs határértéke a végtelenben. De minden n-re $f((n) = 0$.

3.3 Folytonos függvények

3.216. **(a)** Ez a függvény a $D(x)$ Dirichlet-függvény, sehol sem folytonos, sőt határértéke sincs. Ugyanis tetszőleges $a \in \mathbb{R}$ esetén van olyan $x_n \in \mathbb{Q}$ és $y_n \notin \mathbb{Q}$ sorozat, amelyre $a \neq x_n$, $a \neq y_n$, $x_n \to a$ és $y_n \to a$. De így $D(x_n) \to 1$ és $D(y_n) \to 0$. Az átviteli elv miatt ezért a-ban nincs határértéke a $D(x)$ függvénynek.

(b) $f(x)$ folytonos a 0-ban (de másutt nem). Legyen ugyanis $\varepsilon > 0$ tetszőleges. $\delta = \varepsilon$.
Ha $|x - 0| = |x| < \delta$, akkor $|f(x) - f(0)| = |f(x)| = |x| < \varepsilon = \delta$.

3.221. **(a)** A $h = f + g$ függvény nem folytonos 3-ban. Indirekt módon, ha az lenne, akkor a műveleti szabályok miatt a $g = h - f$ is folytonos lenne.

(b) $f \cdot g$ lehet folytonos 3-ban, de csak úgy, ha $f(3) = 0$. Legyen például $f(x) = 0$ és $g(x) = D(x)$ a Dirichlet-függvény.

3.224. Az $\dfrac{x^2 - 4}{x + 2}$ függvény az $x = -2$ kivételével mindenütt folytonos. Az $x = -2$-ben megszüntethető szakadása van, $\lim\limits_{x \to -2} \dfrac{x^2 - 4}{x + 2} = -4$.

3.226. Az $\sqrt{x}$ függvény folytonos, ha $x > 0$. A 0-ban jobbról folytonos.

3.229. Az $f(x) = \begin{cases} x^2 + 2 & \text{ha } x \geq 0 \\ mx + c & \text{ha } x < 0 \end{cases}$ függvény pontosan akkor folytonos a 0-ban, ha balról is és jobbról is folytonos. Az $f(x)$ „jobbról”, azaz $x \geq 0$ esetén megegyezik az $x^2 + 2$ függvénnyel, amelyik mindenütt, tehát 0-ban is folytonos.

Az $f(x)$ függvény $x < 0$ esetén megegyezik az $mx + c$ függvénnyel, amelynek „baloldali” határértéke 0-ban c. Ezért tehát az f függvény pontosan akkor folytonos 0-ban, ha

$$2 = f(0) = c.$$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

3.230. Az $f(x) = \begin{cases} \dfrac{\sin x}{x} & \text{ha } x \neq 0 \\ c & \text{ha } x = 0 \end{cases}$ függvény pontosan akkor folytonos a 0-ban, ha itt van határértéke és az megegyezik a helyettesítési értékkel.

$$\lim_{x\to 0} f(x) = \lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \text{ és } f(0) = c.$$

Így tehát a $c = 1$ esetben lesz a függvény folytonos a 0-ban.

3.233. Legyen $p(x)$ tetszőleges harmadfokú polinom. Elég azt az esetet vizsgálni, amikor $p(x)$ főegyütthatója (az x^3-ös tag együtthatója) pozitív. De akkor

$$\lim_{x\to\infty} p(x) = \infty, \qquad \lim_{x\to-\infty} p(x) = -\infty.$$

Ezért a $p(x)$ függvény biztosan felvesz pozitív értéket is (valahonnan kezdve $p(x) > 0$) és negatív értéket is. De akkor a Bolzano-tétel szerint a 0-t is felveszi értékként.

3.236. Legyen $h(x) = f(x) - g(x)$. A h függvény folytonos $[a, b]$-ben, $h(a) \geq 0$, $h(b) \leq 0$. A Bolzano-tétel szerint van olyan $c \in [a, b]$, amelyre $h(c) = f(c) - g(c) = 0$.

3.237. Legyen most $h(x) = g(x) - f(x)$. Ez a $h(x)$ függvény pozitív és folytonos $[a, b]$-n. A Weierstrass-tétel szerint a $h(x)$-nek van minimuma, azaz van olyan $c \in [a, b]$, hogy minden $x \in [a, b]$ esetén

$$0 < m = h(c) \leq h(x) = g(x) - f(x).$$

3.242. **P** $\not\Longrightarrow$ **Q**: Legyen például $f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{ha } x \in (1, 2) \\ 2 & \text{ha } x = 1 \text{ vagy } x = 2 \end{cases}$

Q $\Longrightarrow$ **P**: Az f függvény maximuma felső korlát, minimuma pedig alsó korlát.

3.245. Igen, például az $f(x) = x$ függvény.

3.249. Az $[x]$ függvény monoton növő, ezért minden korlátos zárt intervallumon van maximuma, a jobb végpontban felvett érték. Tehát

$$\max\{[x] : x \in [77, 888]\} = [888] = 888.$$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

3.250. Az $f(x) = \{x\}$ függvénynek nincs maximuma egyetlen olyan $[a, b]$ intervallumon sem, amelynek a hossza legalább 1, ugyanis

$$\sup\{f(x) : x \in [a, b]\} = \sup\{f(x) : x \in [a, a+1]\} = \\ = \sup\{f(x) : x \in [0, 1]\} = 1,$$

mivel a törtrész x függvény 1 szerint periodikus. Másrészt $f(x) = \{x\} \neq 1$.

3.254. Van ilyen függvény, még folytonos is:

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{ha } 0 < x < 1/3 \\ 3x - 1 & \text{ha } 1/3 \leq x \leq 2/3 \\ 1 & \text{ha } 2/3 < x < 1 \end{cases}$$

3.257. Van ilyen függvény. A 3.254. feladat megoldásában szereplő függvény folytonos.

3.258. Nincs ilyen függvény. Indirekt módon tegyük fel, hogy $f(x)$ folytonos a $[0, 1]$ zárt intervallumon és értékkészlete a $(0, 1)$ nyílt intervallum. A Weierstrass-tétel szerint az $f(x)$ függvénynek van maximuma. Legyen ez a maximum M. A feltevés miatt $M < 1$ és mivel M maximális érték, ezért $f(x) \notin (M, 1)$.

Ez az állítás sokkal általánosabban is bizonyítható, lásd a 3.260. feladatot.

3.260. Legyen az f függvény folytonos az $[a, b]$ intervallumon. A Weierstrass-tétel szerint f-nek van minimuma, legyen ez m és maximuma, legyen ez M. Eszerint $R(f) \subset [m, M]$.

Másrészt a Bolzano-tétel szerint az f függvény m és M között minden értéket felvesz, azaz $R(f) \supset [m, M]$.

3.263. Legyen $x_n = \dfrac{\pi}{2} + 2\pi n$, $y_n = \dfrac{3\pi}{2} + 2\pi n$. Ha $n > 100$, akkor

$$x_n \sin x_n = x_n > 2\pi n > 100 \quad \text{és} \quad y_n \sin y_n = -y_n < -100.$$

A Bolzano-tétel szerint minden $n > 100$ esetén van olyan $z_n \in [x_n, y_n]$, amelyre

$$z_n \sin z_n = 100.$$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

Mivel az $[x_n, y_n]$ intervallumok diszjunktak, ezért a z_n gyökök különböznek.

3.271. Az $f(x) = \dfrac{1}{x}$ függvény

(a) nem egyenletesen folytonos $(0, \infty)$-en. Megmutatjuk, hogy az $\varepsilon = 1$-hez nincs „jó” $\delta > 0$. Tetszőleges $\delta > 0$ esetén válasszunk olyan $n \in \mathbb{N}^+$ pozitív egész számot, amelyre

$$\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} < \delta.$$

Ekkor

$$\left| f\left(\frac{1}{n}\right) - f\left(\frac{1}{n+1}\right) \right| = 1 \not< \varepsilon.$$

(b) egyenletesen folytonos $[1, 2]$-n a Heine-Borel tétel szerint.

(c) egyenletesen folytonos $(1, 2)$-n, mivel a bővebb $[1, 2]$ halmazon is egyenletesen folytonos.

(d) egyenletesen folytonos $[1, \infty)$-en. Legyen $\varepsilon > 0$ tetszőleges, $\delta = \varepsilon$. Ha $x, y \geq 1$ és $|x - y| < \delta$, akkor

$$|f(x) - f(y)| = \left| \frac{1}{x} - \frac{1}{y} \right| = \frac{|x - y|}{xy} \leq |x - y| < \delta = \varepsilon.$$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

A differenciálszámítás és alkalmazásai

4.1 A derivált fogalma

4.2. Ha $\lim\limits_{x\to 3}\dfrac{f(x)-f(3)}{x-3}=4$, akkor a derivált definíciója szerint az $f(x)$ függvény deriválható 3-ban és $f'(3)=4$. A 4.2. állítás szerint tehát $f(x)$ folytonos 3-ban.

4.3. Nem következik, például ha $f(x)=|x-3|$.

4.5. Ez a határérték a $\sqrt{x}$ függvény deriváltját adja meg tetszőleges $x>0$ pontban.

$$\frac{\sqrt{x+h}-\sqrt{x}}{h}=\frac{\sqrt{x+h}-\sqrt{x}}{h}\cdot\frac{\sqrt{x+h}+\sqrt{x}}{\sqrt{x+h}+\sqrt{x}}=\frac{1}{\sqrt{x+h}+\sqrt{x}}\xrightarrow[h\to 0]{}\frac{1}{2\sqrt{x}}$$

4.10. Legyen $x_0\neq 0$ tetszőleges.

$$\frac{1/x-1/x_0}{x-x_0}=\frac{x_0-x}{xx_0(x-x_0)}=-\frac{1}{xx_0}\xrightarrow[x\to x_0]{}-\frac{1}{x_0^2}$$

Tehát az $\dfrac{1}{x}$ függvény deriváltja $-\dfrac{1}{x^2}$.

4.14. Az $f(x)=\left|x^2-1\right|$ függvény mindenütt folytonos, az 1 és a -1 kivételével deriválható, mert „ilyenekből van összerakva”, azaz alkalmazhatjuk a megfelelő műveleti szabályokat. Megmutatjuk, hogy 1-ben a differenciahányadosnak balról más a határértéke, mint jobbról, és ezért nem deriválható. A következő kifejezésekben feltesszük, hogy $x>0$. (Miért tehető fel?)

$$\frac{f(x)-f(1)}{x-1}=\frac{\left|x^2-1\right|}{x-1}=(x+1)\frac{|x-1|}{x-1}=$$
$$=(x+1)\operatorname{sgn}(x-1)\to\begin{cases}2 & \text{ha } x\to 1^+\\ -2 & \text{ha } x\to 1^-\end{cases}$$

Mivel a függvény páros, ezért -1-ben sem deriválható.

4.18. Előbb megvizsgáljuk, hogy milyen b és c esetén lesz folytonos a

$$h(x)=\begin{cases}(1-x)(2-x) & \text{ha } x\geq -3\\ bx+c & \text{ha } x<-3\end{cases}$$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

függvény -3-ban.

$$\lim_{x\to -3^+} h(x) = \lim_{x\to -3}(1-x)(2-x) = 20,$$

$$\lim_{x\to -3^-} h(x) = \lim_{x\to -3}(bx+c) = -3b+c$$

Így tehát a függvény pontosan akkor folytonos -3-ban, ha

$$-3b+c = 20$$

A $h(x)$ függvény akkor deriválható -3-ban, ha itt a differenciahányados bal és jobboldali határértéke megegyezik. Mivel a $h_1(x) = (1-x)(2-x)$ és a $h_2(x) = bx+c$ függvény deriválható -3-ban, ez akkor teljesül, ha $h_1'(-3) = h_2'(-3)$.

$$h_1'(x) = ((1-x)(2-x))' = -(2-x)-(1-x) = 2x-3, \qquad h_1'(-3) = -9,$$

$$h_2'(x) = (bx+c)' = b$$

Tehát a $h(x)$ függvény pontosan akkor deriválható -3-ban, ha folytonos, azaz $-3b+c = 20$ és $b = -9$. A két egyenletből

$$b = -9, \qquad c = -7$$

Megjegyzés: A feladat valójában azt kérdezi, hogy melyik egyenessel „folytatható balra” deriválható módon a $h_1(x) = (1-x)(2-x)$ függvény a -3-ban. Az érintőegyenes definíciója szerint ez az egyenes csak az érintő lehet, azaz

$$bx+c \equiv h_1'(-3)(x+3) + h_1(-3)$$

4.19. Az $x = 0$-át kivéve $f(x)$ deriválható és $f'(x)$ folytonos, mert alkalmazhatjuk a műveleti szabályokat. Mivel 0 körül $f(x)$ egy 0-hoz tartó és egy korlátos függvény szorzata, ezért $\lim_{x\to 0} f(x) = 0 = f(0)$ (lásd 3.2.). Így tehát 3.3. szerint $f(x)$ folytonos 0-ban is.

Az $f(x)$ függvény 0-ban nem deriválható, ugyanis a


$$g(x) = \frac{f(x)-f(0)}{x} = \sin\frac{1}{x}$$

differenciahányadosnak nincs határértéke 0-ban.

Az ábrán jól látható, hogy a $g(x) = \sin\dfrac{1}{x}$ függvényt „beszorítottuk” az x és $-x$ egyenesek közé.

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó



4.20. Az $f(x)$ függvény mindenütt deriválható. Az $x = 0$-át kivéve ez nyilvánvaló. Megmutatjuk, hogy $x = 0$-ban a differenciahányados határértéke 0.


$$\lim_{x\to 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x\to 0} x \sin \frac{1}{x} = 0,$$

mivel a $g(x) = x \sin \frac{1}{x}$ függvény 0 körül egy 0-hoz tartó és egy korlátos függvény szorzata (lásd 3.2.). A deriváltfüggvény

$$f'(x) = \begin{cases} 2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x} & \text{ha } x \neq 0 \\ 0 & \text{ha } x = 0 \end{cases}$$

folytonos, ha $x \neq 0$, de nincs határértéke és ezért nem is folytonos 0-ban.

Az ábrán jól látható, hogy a $g(x) = \sin \frac{1}{x}$ függvényt „beszorítottuk” az x^2 és $-x^2$ parabolák közé.



4.25. Az $f(x)$ függvény az 1 és a 2 kivételével folytonosan deriválható. Mindkét kivételes pontban folytonos. Számoljuk ki a „középső rész”, a $g(x) = (1 - x)(2 - x) = x^2 - 3x + 2$ deriváltját és érintőegyeneseit az 1-ben és 2-ben:


$$g'(x) = 2x - 3, \qquad g'(1) = -1, \qquad g'(2) = 1$$

$$e_1(x) = 1 - x, \qquad e_2(x) = x - 2 = -(2 - x).$$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

Mivel mindkét pontban a $g(x)$ függvény az érintővel „folytatódik”, ezért ezeken a helyeken is folytonosan deriválható az $f(x)$ függvény.



4.31. Ha $f(x) = \sin x$, akkor

$$f'(x) = \cos x,\ f''(x) = -\sin x,\ f^{(n)}(x) = \begin{cases} \sin x & \text{ha } n = 4k \\ \cos x & \text{ha } n = 4k+1 \\ -\sin x & \text{ha } n = 4k+2 \\ -\cos x & \text{ha } n = 4k+3 \end{cases}$$

4.32. Ha $f(x) = \cos x$, akkor

$$f'(x) = -\sin x,\ f''(x) = -\cos x,\ f^{(n)}(x) = \begin{cases} \cos x & \text{ha } n = 4k \\ -\sin x & \text{ha } n = 4k+1 \\ -\cos x & \text{ha } n = 4k+2 \\ \sin x & \text{ha } n = 4k+3 \end{cases}$$

4.2 Deriválási szabályok

4.33. $\mathbf{P} \implies \mathbf{Q}$: Mivel $f(x) = f(-x)$, ezért $f'(x) = f'(-x)\cdot(-1) = -f'(-x)$.

$\mathbf{Q} \implies \mathbf{P}$: Legyen $g(x) = f(-x)$. Mivel $f'(x) = -f'(-x)$, ezért $g'(x) = -f'(-x) = f'(x)$. Eszerint f és g deriváltja mindenütt megegyezik, ezért az integrálszámítás alaptétele szerint van olyan $c \in \mathbb{R}$, amelyre

$$g(x) = f(x) + c, \text{ azaz } f(-x) = f(x) + c.$$

Mivel ez minden x-re teljesül, ezért $x = 0$-ra alkalmazva

$$f(0) = f(0) + c \quad \iff \quad c = 0.$$

4.34. $\mathbf{P} \implies \mathbf{Q}$: Mivel $f(x) = -f(-x)$, ezért $f'(x) = -f'(-x)\cdot(-1) = f'(-x)$.

$\mathbf{Q} \not\Longrightarrow \mathbf{P}$: Legyen például $f(x) = x + 1$.

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

Ha még azt is feltesszük, hogy $f(0) = 0$, akkor már igaz, hogy f páratlan:

Legyen $g(x) = -f(-x)$. Mivel $f'(x) = f'(-x)$, ezért $g'(x) = f'(-x) = f'(x)$. Eszerint f és g deriváltja mindenütt megegyezik, ezért az integrálszámítás alaptétele szerint van olyan $c \in \mathbb{R}$, amelyre

$$g(x) = f(x) + c, \text{ azaz } -f(-x) = f(x) + c.$$

Mivel ez minden x-re teljesül, ezért $x = 0$-ra alkalmazva

$$0 = f(0) = f(0) + c \quad \Longleftrightarrow \quad c = 0.$$

4.38. $\mathbf{P} \implies \mathbf{Q}$:

$$\begin{aligned}\lim_{h\to 0} \frac{f(a+h) - f(a-h)}{2h} &= \\ = \frac{1}{2} \lim_{h\to 0} \left(\frac{f(a+h) - f(a)}{h} + \frac{f(a) - f(a-h)}{h} \right) &= \\ = \frac{1}{2} \lim_{h\to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} + \lim_{h\to 0} \frac{f(a) - f(a-h)}{h} &= \\ = \frac{1}{2}(f'(a) + f'(a)) = f'(a).&\end{aligned}$$

$\mathbf{Q} \not\implies \mathbf{P}$: Legyen például $a = 0$, $f(x) = |x|$.

4.42. Ellenőrizzük, hogy az adott pont rajta van-e a görbén! Ehhez az kell, hogy a függvény értéke az 1 helyen éppen 6 legyen: $f(1) = 1^3 - 2 \cdot 1^2 + 3 \cdot 1 + 4 = 6$.

Az érintőegyenes egyenlete $y = m(x - x_0) + y_0$, ahol most $x_0 = 1$, $y_0 = 6$ és $m = f'(1)$.

A függvény deriváltja $f'(x) = 3x^2 - 4x + 3$. Innen $m = f'(1) = 2$. Tehát az érintő egyenlete az adott pontban:

$$y = 2(x - 1) + 6, \text{ vagy másképp felírva } y = 2x + 4.$$

4.56. Legyen $f(x) = \sqrt{x\sqrt{x\sqrt{x}}}$. Ekkor $D_f = [0, \infty)$ és $D_{f'} = (0, \infty)$. Írjuk fel az $f(x)$ függvényt „törtkitevős” alakban:

$$\begin{aligned}f(x) = \sqrt{x\sqrt{x\sqrt{x}}} = \left(x \cdot \left(x \cdot (x)^{1/2} \right)^{1/2} \right)^{1/2} = \\ = \left(x \cdot \left(x^{3/2} \right)^{1/2} \right)^{1/2} = \left(x^{7/4} \right)^{1/2} = x^{7/8}\end{aligned}$$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

Így tehát

$$f'(x) = \frac{7}{8}x^{-1/8} = \frac{7}{8\sqrt[8]{x}}$$

4.57. Legyen $f(x) = \sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}}$. Ekkor $D_f = [0, \infty)$ és $D_{f'} = (0, \infty)$.

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}}} \left(1 + \frac{1}{2\sqrt{x + \sqrt{x}}} \left(1 + \frac{1}{2\sqrt{x}}\right)\right)$$

4.62. Legyen $f(x) = \dfrac{\sin x - x\cos x}{\cos x + x \sin x}$. Az értelmezési tartomány

$$D_f = \{x : \cos x + x \sin x \neq 0\} = \{x : \operatorname{ctg} x \neq -x\}.$$

Alkalmazzuk a hányados deriválási szabályát:

$$f'(x) = \frac{(\sin x - x\cos x)'(\cos x + x \sin x) - (\sin x - x\cos x)(\cos x + x \sin x)'}{(\cos x + x \sin x)^2}.$$

Kiszámítjuk a számlálóban szereplő deriváltakat az összeg és a szorzat deriválási szabályát felhasználva:

$$(\sin x - x\cos x)' = \cos x - \cos x + x \sin x = x \sin x$$

$$(\cos x + x \sin x)' = -\sin x + \sin x + x\cos x = x\cos x$$

Ezeket behelyettesítve:

$$f'(x) = \frac{x \sin x(\cos x + x \sin x) - (\sin x - x\cos x)x\cos x}{(\cos x + x \sin x)^2} = \frac{x^2}{(\cos x + x \sin x)^2}$$

A deriváltfüggvény értelmezési tartománya $D_{f'} = D_f$.

4.63. Legyen $f(x) = 4x^3 \operatorname{tg}(x^2 + 1)$. Az értelmezési tartomány

$$D_f = \left\{x : x^2 + 1 \neq (2n+1)\frac{\pi}{2}\right\} = \mathbb{R} \setminus \left\{\pm\sqrt{(2n-1)\frac{\pi}{2} - 1} : n \in \mathbb{N}\right\}.$$

$$f'(x) = 12x^2 \operatorname{tg}(x^2 + 1) + 4x^3(\operatorname{tg}(x^2 + 1))'$$

A láncszabály szerint

$$(\operatorname{tg}(x^2 + 1))' = \frac{1}{\cos^2(x^2 + 1)} \cdot 2x = \frac{2x}{\cos^2(x^2 + 1)}.$$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

Így tehát

$$f'(x) = 12x^2 \operatorname{tg}(x^2+1) + \frac{2x}{\cos^2(x^2+1)}.$$

A deriváltfüggvény értelmezési tartománya $D_{f'} = D_f$.

4.68. $f(x) = x^x = e^{x \ln x}, \quad D_f = D_{f'} = (0, \infty).$

$$f'(x) = (x^x)' = \left(e^{x \ln x}\right)' = e^{x \ln x}(\ln x + 1) = x^x(\ln x + 1).$$

4.69. $f(x) = \sqrt[x]{x} = x^{1/x} = e^{\frac{\ln x}{x}}, \quad D_f = D_{f'} = (0, \infty).$

$$f'(x) = \left(\sqrt[x]{x}\right)' = \left(e^{\frac{\ln x}{x}}\right)' = \frac{1 - \ln x}{x^2} \sqrt[x]{x}$$

4.74. $f(x) = \log_4 x = \dfrac{\ln x}{\ln 4}, \quad D_f = D_{f'} = (0, \infty).$

$$f'(x) = (\log_4 x)' = \left(\frac{\ln x}{\ln 4}\right)' = \frac{1}{x \ln 4}$$

4.75. $f(x) = \log_x 4 = \dfrac{\ln 4}{\ln x}, \quad D_f = D_{f'} = (0,1) \cup (1, \infty).$

$$f'(x) = (\log_x 4)' = \left(\frac{\ln 4}{\ln x}\right)' = -\frac{\ln 4}{x \ln^2 x}$$

4.84. Legyen $f(x) = \dfrac{\operatorname{sh} x - x \operatorname{ch} x}{\operatorname{ch} x + x \operatorname{sh} x}$. Mivel a nevező sehol sem 0, $D_f = \mathbb{R}$.

Alkalmazzuk a hányados deriválási szabályát:

$$f'(x) = \frac{(\operatorname{sh} x - x \operatorname{ch} x)'(\operatorname{ch} x + x \operatorname{sh} x) - (\operatorname{sh} x - x \operatorname{ch} x)(\operatorname{ch} x + x \operatorname{sh} x)'}{(\operatorname{ch} x + x \operatorname{sh} x)^2}.$$

Kiszámítjuk a számlálóban szereplő deriváltakat az összeg és a szorzat deriválási szabályát felhasználva:

$$(\operatorname{sh} x - x \operatorname{ch} x)' = \operatorname{ch} x - \operatorname{ch} x - x \operatorname{sh} x = -x \operatorname{sh} x$$

$$(\operatorname{ch} x + x \operatorname{sh} x)' = \operatorname{sh} x + \operatorname{sh} x + x \operatorname{ch} x = 2 \operatorname{sh} x + x \operatorname{ch} x$$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

Ezeket behelyettesítve:

$$f'(x) = \frac{-x \operatorname{sh} x(\operatorname{ch} x + x \operatorname{sh} x) - (\operatorname{sh} x - x \operatorname{ch} x)(2 \operatorname{sh} x + x \operatorname{ch} x)}{(\operatorname{ch} x + x \operatorname{sh} x)^2} =$$
$$= \frac{x^2 - 2 \operatorname{sh}^2 x}{(\operatorname{ch} x + x \operatorname{sh} x)^2}$$

A deriváltfüggvény értelmezési tartománya $D_{f'} = D_f = \mathbb{R}$.

4.85. Legyen $f(x) = 4x^3 \operatorname{th}(x^2+1)$. Az értelmezési tartomány $D_f = \mathbb{R}$, mert $\operatorname{ch} x$ sehol sem 0.

$$f'(x) = 12x^2 \operatorname{th}(x^2+1) + 4x^3(\operatorname{th}(x^2+1))'$$

A láncszabály szerint

$$(\operatorname{th}(x^2+1))' = \frac{1}{\operatorname{ch}^2(x^2+1)} \cdot 2x = \frac{2x}{\operatorname{ch}^2(x^2+1)}.$$

Így tehát

$$f'(x) = 12x^2 \operatorname{th}(x^2+1) + \frac{2x}{\operatorname{ch}^2(x^2+1)}.$$

A deriváltfüggvény értelmezési tartománya $D_{f'} = D_f = \mathbb{R}$.

4.90. $f(x) = \log_3 x \cdot \cos x, \quad D_f = D_{f'} = (0, \infty).$

$$f'(x) = \frac{\cos x}{x \ln 3} - \log_3 x \cdot \sin x$$

4.91. $f(x) = \dfrac{\sin x + 2 \ln x}{\sqrt{x}+1}, \quad D_f = D_{f'} = (0, \infty).$

$$f'(x) = \frac{\left(\cos x + \dfrac{2}{x}\right) \cdot (\sqrt{x}+1) - \dfrac{\sin x + 2 \ln x}{2\sqrt{x}}}{(\sqrt{x}+1)^2}$$

4.96. $f(x) = \ln(\sin x), \quad D_f = D_{f'} = \{x : \sin x > 0\}.$

$$f'(x) = \frac{\cos x}{\sin x} = \operatorname{ctg} x$$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

4.97. $f(x) = x^{\operatorname{tg} x} = e^{\ln x \cdot \operatorname{tg} x}, \quad D_f = D_{f'} = \left\{x : x \neq (2n+1)\frac{\pi}{2},\ \operatorname{tg} x > 0\right\}.$

$$f'(x) = \left(x^{\operatorname{tg} x}\right)' = \left(e^{\ln x \cdot \operatorname{tg} x}\right)' = x^{\operatorname{tg} x}\left(\frac{\operatorname{tg} x}{x} + \frac{\ln x}{\cos^2 x}\right)$$

4.100. Első lépésként keressük meg azt a c helyet, ahol a függvény értéke $a = 2$, azaz az inverz függvény értékét a $a = 2$ helyen. Ezt próbálgatással kaphatjuk: $c = 1$. Mivel a $(0, \infty)$ félegyenesen az $f(x)$ szigorúan nő, mert a derivált pozitív, ezért csak ezen a helyen lesz a függvény értéke 2. Az inverz függvény deriváltjáról szóló képlet szerint

$$(f^{-1})'(2) = \frac{1}{f'(1)}.$$

A függvény deriváltja $f'(x) = 5x^4 + 2x$ és így $f'(1) = 7$. Tehát

$$(f^{-1})'(2) = \frac{1}{7}.$$

Megjegyzés: Meg kell azt is vizsgálni, hogy van-e inverze az adott függvénynek. A deriváltfüggvény vizsgálatából kiderül, hogy az egész számegyenesen nem invertálható $f(x)$, hiszen $\sqrt[3]{-2/5}$-ben lokális szigorú maximuma, 0-ban minimuma van, ezért nem szigorúan monoton. Mivel mínusz végtelenben végtelenhez tart a függvény, 0-ban pedig $0 = f(0) < 2$, ezért $f(x) = 2$ valahol $-\infty$ és 0 között. Viszont az 1-et tartalmazó $(0, \infty)$ félegyenesen $f(x)$ szigorúan monoton növő, ezért itt invertálható.

4.104. Mivel $\operatorname{arctg} x$ a $\operatorname{tg} x$ függvény inverze, ezért

$$(\operatorname{arctg} x)' = \frac{1}{\operatorname{tg}'(\operatorname{arctg} x)} = \cos^2(\operatorname{arctg} x) = \frac{1}{1 + \operatorname{tg}^2(\operatorname{arctg} x)}.$$

Mivel $\operatorname{tg}(\operatorname{arctg} x) = x$, ezért

$$(\operatorname{arctg} x)' = \frac{1}{1+x^2}$$

4.108. $f(x) = \operatorname{arctg}(\sin x), \quad D_{f'} = \mathbb{R}.$

$$f'(x) = \frac{1}{1 + \sin^2 x} \cdot \cos x = \frac{\cos x}{1 + \sin^2 x}$$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

4.109. $f(x) = \operatorname{tg}(\arcsin x), \quad D_{f'} = (-1, 1).$

$$f'(x) = \frac{1}{\cos^2(\arcsin x)} \cdot \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = \frac{1}{1-\sin^2(\arcsin x)} \cdot \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = \\ = \frac{1}{(1-x^2)\sqrt{1-x^2}}$$

4.114.

$$\frac{2\sin x - 1}{6x - \pi} = \frac{2}{6} \cdot \frac{\sin x - \frac{1}{2}}{x - \frac{\pi}{6}} = \frac{2}{6} \cdot \frac{\sin x - \sin\frac{\pi}{6}}{x - \frac{\pi}{6}} \to \frac{2}{6}\cos\frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{6}$$

4.119.

$$\lim_{n\to\infty} n\left(\cos\frac{1}{n} - 1\right) = \lim_{n\to\infty} \frac{\cos\frac{1}{n} - \cos 0}{1/n} = -\sin 0 = 0$$

4.123.

$$\left(e^{\sin x}\right)' = \cos x \cdot e^{\sin x}$$

$$\left(e^{\sin x}\right)'' = \left(\cos x \cdot e^{\sin x}\right)' = (\cos^2 x - \sin x)e^{\sin x}$$

4.3 Középértéktételek, L'Hospital szabály

4.128. Ha $f(x) = \operatorname{arctg} x, \quad g(x) = \operatorname{arctg}\dfrac{1+x}{1-x}$ és $h(x) = f(x) - g(x)$, akkor

$$\left(\frac{1+x}{1-x}\right)' = \frac{(1-x) - (1+x)(-1)}{(1-x)^2} = \frac{2}{(1-x)^2},$$

$$g'(x) = \left(\operatorname{arctg}\frac{1+x}{1-x}\right)' = \frac{1}{1 + \frac{(1+x)^2}{(1-x)^2}} \cdot \frac{2}{(1-x)^2} = \\ = \frac{2}{(1-x)^2 + (1+x)^2} = \frac{1}{1+x^2}.$$

Ezért $h'(x) = 0$ mindenütt, ahol $h(x)$ deriválható! De mivel $g(x)$ 1-ben nem értelmes, ezért $h(x)$ sem, és így $h(x)$ nem is deriválható 1 ben.

$$h(0) = \operatorname{arctg} 0 - \operatorname{arctg} 1 = -\frac{\pi}{4},$$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

$$\lim_{x\to\infty} h(x) = \lim_{x\to\infty} \operatorname{arctg} x - \lim_{x\to\infty} \operatorname{arctg} \frac{1+x}{1-x} = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{4}.$$

Tehát $h(x)$ nem konstans, mert $h(0) \neq h(\infty) = \lim\limits_{x\to\infty} h(x)$. Viszont az integrálszámítás alaptétele alkalmazható a $(-\infty, 1)$ és $(1, \infty)$ félegyenesekre.

4.129. Legyen $h(x) = f(x) - g(x)$. Ekkor $h(x)$ folytonos $[0, \infty)$-n, $h'(x) > 0$, ha $x > 0$, ezért a 4.8. tétel szerint szigorúan monoton nő $[0, \infty)$-en. Így tehát

$$0 \leq h(0) = f(0) - g(0) < h(x) = f(x) - g(x), \text{ ha } x > 0.$$

4.131. Keressük meg az $f(x) = x^5 - 5x + 2$ függvény monoton szakaszait.

$$f'(x) = 5(x^4 - 1) = 5(x^2 + 1)(x^2 - 1),$$

$$f'(x) > 0, \text{ ha } x \in (-\infty, -1) \cup (1, \infty), \text{ és } f'(x) < 0, \text{ ha } x \in (-1, 1).$$

Eszerint a függvény -1-től balra és 1-től jobbra szigorúan nő, $(-1, 1)$-ben pedig szigorúan csökken.

$$\lim_{x\to-\infty} f(x) = -\infty, \ f(-1) = 6 > 0, \ f(1) = -2 < 0, \ \lim_{x\to\infty} f(x) = \infty$$

A Bolzano tétel szerint $f(x)$-nek van gyöke a három diszjunkt nyílt intervallumon. A szigorú monotonitás miatt mindegyik intervallumon pontosan egy gyök van, tehát összesen három.

4.138. Mivel a határérték ∞/∞ alakú, ezért alkalmazhatjuk a L'Hospital szabályt.

$$\lim_{x\to0^+} \frac{(\ln x)'}{(\operatorname{ctg} x)'} = \lim_{x\to0^+} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{\sin^2 x}} = -\lim_{x\to0^+} \frac{\sin x}{x} \cdot \sin x = 0.$$

Tehát $\lim\limits_{x\to0^+} \dfrac{\ln x}{\operatorname{ctg} x} = 0.$

4.143. A $\lim\limits_{x\to0} \left(\operatorname{ctg} x - \dfrac{1}{x}\right)$ határérték kritikus ($\infty - \infty$ alakú). Írjuk fel a különbséget hányados alakban:

$$\operatorname{ctg} x - \frac{1}{x} = \frac{\cos x}{\sin x} - \frac{1}{x} = \frac{x\cos x - \sin x}{x \sin x}.$$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

Erre a hányadosra alkalmazhatjuk a L'Hospital szabályt mert $0/0$ alakú.

$$\lim_{x\to 0}\frac{(x\cos x-\sin x)'}{(x\sin x)'}=\lim_{x\to 0}\frac{\cos x-x\sin x-\cos x}{\sin x+x\cos x}=$$
$$=-\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{\frac{\sin x}{x}+\cos x}=0.$$

Tehát $\lim\limits_{x\to 0}\left(\operatorname{ctg} x-\frac{1}{x}\right)=0.$

4.144. Hozzuk az exponenciális kifejezést e alapúra:

$$(1+x)^{\frac{1}{x}}=\left(e^{\ln(1+x)}\right)^{\frac{1}{x}}=e^{\frac{\ln(1+x)}{x}}.$$

Mivel $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{x}=1$ és az e^x függvény folytonos, ezért

$$\lim_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}}=e^1=e.$$

4.145. A $\lim\limits_{x\to 0}\left(\frac{\sin x}{x}\right)^{1/x^2}$ határérték kritikus, mert 1^∞ alakú. Alakítsuk át a kifejezést úgy, hogy alkalmazhassuk a $\lim\limits_{x\to 0}(1+x)^{1/x}=e$ nevezetes határértéket (lásd a 4.144. feladatot):

$$\left(\frac{\sin x}{x}\right)^{\frac{1}{x^2}}=\left[\left(1+\frac{\sin x-x}{x}\right)^{\frac{x}{\sin x-x}}\right]^{\frac{\sin x-x}{x^3}}$$

Ez az exponenciális kifejezés már nem kritikus, mert az „új" alap e-hez tart. (Miért?) Számoljuk ki az „új" kitevő határértékét a L'Hospital szabály segítségével ($0/0$ alakú):

$$\lim_{x\to 0}\frac{(\sin x-x)'}{(x^3)'}=\frac{1}{3}\lim_{x\to 0}\frac{\cos x-1}{x^2}=-\frac{1}{6}.$$

Tehát $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin x-x}{x^3}=-\frac{1}{6}$, és ezért

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{\sin x}{x}\right)^{\frac{1}{x^2}}=e^{-1/6}=\frac{1}{\sqrt[6]{e}}.$$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

4.148. A határérték ∞/∞, alakú, ezért alkalmazhatjuk a L'Hospital szabályt.

$$\lim_{x\to\infty}\frac{(\ln x)'}{(\sqrt{x})'}=\lim_{x\to\infty}\frac{\frac{1}{x}}{\frac{1}{2\sqrt{x}}}=\lim_{x\to\infty}\frac{2\sqrt{x}}{x}=\lim_{x\to\infty}\frac{2}{\sqrt{x}}=0.$$

Tehát $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\ln x}{\sqrt{x}}=0.$

4.4 Szélsőértékkeresés

4.155. Legyen $f(x)=x^3-12x$. Az $f(x)$ függvénynek ott lehet abszolút szélsőértéke (maximuma vagy minimuma) ahol a derivált nulla, vagy pedig a zárt intervallum végpontjaiban. Keressük meg a derivált gyökeit:

$$f'(x)=(x^3-12x)'=3x^2-12=0$$

A két gyök:

$$x_1=-2 \text{ és } x_2=2.$$

A $[-10;3]$ intervallum esetén:

$$f(-10)=-880,\quad f(-2)=16,\quad f(2)=-16,\quad f(3)=-9$$

Így tehát a $[-10;3]$ intervallumon az $f(x)=x^3-12x$ függvény abszolút minimuma -880 az $x=-10$ pontban, abszolút maximuma pedig 16 az $x=-2$ pontban.

A $[0;3]$ intervallum esetén:

$$f(0)=0,\quad f(2)=-16,\quad f(3)=-9.$$

(Mivel a -2 nem esik bele a vizsgált intervallumba, ezért az itt felvett függvényértéket nem vesszük számításba!)

Így tehát a $[0;3]$ intervallumon az $f(x)=x^3-12x$ függvény abszolút minimuma -16 az $x=2$ pontban, abszolút maximuma pedig 0 az $x=0$ pontban.

4.159. Mivel csak a téglalap alakjára (oldalainak arányára) vagyunk kíváncsiak, feltehetjük, hogy a befoglaló derékszögű háromszög átfogója 2. Az ábra jelöléseit használva, fejezzük ki x segítségével a keresett téglalap $T(x)$ területét illetve $k(x)$ kerületét.

$$y=1-x,$$

$$T(x)=2xy=2x(1-x),\quad k(x)=2(2x+y)=2(1+x).$$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó


A feltételek szerint $0 \le x \le 1$. Mivel $k(x)$ monoton növő függvény, ezért maximumát az $x = 1$ esetben veszi fel, ami egy elfajult téglalap ($y = 0$).

A $T(x)$ folytonos függvény maximuma (lásd Weierstrass-tétel) nincs a széleken, mert $T(0) = T(1) = 0$, ezért a maximum lokális maximum is, tehát itt $T'(x) = 0$ (lásd a 4.9. tételt).

$$T'(x) = 2[(1-x) - x] = 2 - 4x = 0,$$

$$x = \frac{1}{2},$$

azaz a téglalap egyik (az ábra szerint vízszintes) oldala kétszerese a másiknak.



Megjegyzés: Az $f(x) = \dfrac{T(x)}{2} = x(1-x)$ függvény maximuma a számtani és mértani közepek közötti egyenlőtlenség szerint a $(0,1)$ intervallumon akkor van, ha $x = 1 - x$, azaz $x = \dfrac{1}{2}$.

4.163. Jelölje x a háromszög egyik befogóját és y a másikat, z pedig az átfogót. Akkor az átfogó $z = 10 - x$, és a másik befogó

$$y = \sqrt{(10-x)^2 - x^2} = \sqrt{100 - 20x} = 2\sqrt{25 - 5x},$$

a háromszög területe pedig

$$T(x) = \frac{1}{2}xy = x\sqrt{25 - 5x}.$$

Itt $0 \le x \le 5$ lehet, ezért a feladatunk az, hogy megkeressük a $T(x)$ folytonos függvény abszolút maximumát a $[0,5]$ zárt intervallumon. A Weierstrass-tétel szerint van maximum. Mivel $T(x) \ge 0$, $T(0) = T(5) = 0$, ezért a maximumot a $(0,5)$ nyílt intervallumon veszi fel a $T(x)$ függvény. De akkor ez a maximum lokális maximum is, ezért a 4.9. tétel szerint itt a derivált nulla. Keressük meg a $T'(x)$ gyökeit:

$$T'(x) = \sqrt{25 - 5x} - \frac{5x}{2\sqrt{25 - 5x}} = 0$$

$$\sqrt{25 - 5x} = \frac{5x}{2\sqrt{25 - 5x}} \quad \Longleftrightarrow \quad 2(25 - 5x) = 5x \quad \Longleftrightarrow \quad x = \frac{10}{3}$$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

Mivel a deriváltnak pontosan egy gyöke van, ezért a (lokális) maximum csak itt lehet. Így tehát

$$\max T = T\left(\frac{10}{3}\right) = \frac{10}{3}\sqrt{25 - \frac{50}{3}} = \frac{50}{3\sqrt{3}}.$$

Tehát a terület akkor maximális, ha

$$x = \frac{10}{3}, \quad y = \frac{10}{\sqrt{3}} = x\sqrt{3}, \quad z = \frac{20}{3} = 2x.$$

Eszerint az adott feltétel mellett annak a derékszögű háromszögnek a területe maximális, amelyiknek a nagyobbik hegyesszöge $\frac{\pi}{3} = 60°$, azaz a szabályos háromszög fele.

Megjegyzés: A $T(x)$ függvénynek ugyanott van a maximuma, mint a $f(x) = T^2(x) = x^2(25 - 5x)$ függvénynek. Ennek a függvénynek a maximumát deriválás nélkül is kiszámolhatjuk, ha „ügyesen” alkalmazzuk a számtani és mértani közepek közötti egyenlőtlenséget. Tekintsük ugyanis az

$$\left(\frac{5}{2}x\right)^2 (25 - 5x)$$

háromtényezős szorzatot a $(0, 5)$ intervallumon. Itt mindegyik tényező pozitív, összegük pedig 25, nem függ x-től. Ezért a szorzat akkor maximális, ha a tényezők megegyeznek, azaz

$$\frac{5}{2}x = 25 - 5x \quad \Longleftrightarrow \quad 15x = 50 \quad \Longleftrightarrow \quad x = \frac{10}{3}.$$

4.168. A henger felszíne és térfogata

$$F = 2\pi R^2 + 2\pi m R, \quad V = mR^2\pi.$$

A térfogat képletéből fejezzük ki m-et és helyettesítsük be a felszín képletébe:

$$m = \frac{V}{\pi R^2}, \quad F(R) = 2\pi R^2 + \frac{2V}{R}.$$

Az $F(R)$ függvény a $(0, \infty)$ nyílt félegyenesen van értelmezve, és itt végig pozitív, 0-hoz közeli (kicsi), illetve ∞-hez közeli (nagy) R-ek esetén $F(R)$ értéke „nagy”, ezért a keresett abszolút minimum egyben lokális minimum is. Keressük meg tehát az $F(R)$ függvény deriváltjának a gyökeit:

$$F'(R) = 4\pi R - \frac{2V}{R^2} = 0, \text{ azaz } 2\pi R = \frac{V}{R^2}, \; R = \sqrt[3]{\frac{V}{2\pi}}.$$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

Tehát az adott V térfogatú egyenes körhenger felszíne akkor minimális, ha

$$R = \sqrt[3]{\frac{V}{2\pi}}.$$

Számoljuk ki az ehhez a sugárhoz tartozó magasságot, illetve a magasság és az átmérő arányát:

$$m = \frac{V}{\pi R^2} = \sqrt[3]{\frac{4V}{\pi}}, \quad \frac{m}{2R} = 1.$$

Tehát annak a hengernek a felszíne minimális, amelynek az átmérője megegyezik a magassággal!

Megjegyzés: Annak belátása, hogy az $F(R)$ függvénynek van abszolút minimuma még hátra van, az erről szóló fenti „okoskodás” semmiképp sem tekinthető bizonyításnak. Lássunk tehát egy korrekt bizonyítást:


Legyen $F_0 = F(1) = 2\pi + 2V$. Mivel $\lim\limits_{R\to 0^+} F(R) = \lim\limits_{R\to\infty} F(R) = \infty$, ezért megadható egy $0 < a < 1$, és egy $1 < b$ úgy, hogy $R \in (0, a]$, illetve $R \in [b, \infty)$ esetén $F(R) > F_0$. A Weierstrass-tétel szerint az $F(R)$ függvénynek van minimuma az $[a, b]$ zárt intervallumon. Az a és b megválasztása miatt ez a minimum az egész $(0, \infty)$ félegyenesen is minimum.

Mivel ez a minimumhely nem lehet az $[a, b]$ intervallum egyik végpontja sem, ezért ez egyben lokális minimum is. Itt tehát a 4.9. tétel szerint a derivált nulla. Ilyen R azonban az egész félegyenesen csak egy van, tehát ez a keresett minimumhoz tartozó sugár.

4.171. Használjuk az ábra jelöléseit. A feladat tehát az O pontból eljutni a P pontba (a faluba) a Q ponton keresztül a lehető legrövidebb idő alatt.

A partvonal teljes hossza $x + y = \sqrt{25 - 9} = 4$, és így

$$y(x) = 4 - x.$$



Fejezzük ki x segítségével az O és Q pont, illetve a Q és P pont távolságát:

$$\overline{OQ} = \sqrt{9 + y^2} = \sqrt{9 + (4 - x)^2}, \quad \overline{QP} = x$$

A távolságok megtételéhez szükséges idő órában mérve:

$$t(x) = t_f(x) + t_b(x) = \frac{x}{5} + \frac{1}{2}\sqrt{9 + (4 - x)^2}.$$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

A $t(x)$ függvény minimumát keressük 0 és 4 között. Ez vagy a végpontok valamelyikén felvett érték, vagy lokális minimum, ahol tehát a derivált nulla (lásd 4.9.).

$$t'(x) = \frac{1}{5} - \frac{1}{2}\frac{4-x}{\sqrt{9+(4-x)^2}} = 0$$

$$25(4-x)^2 = 4(9+(4-x)^2), \quad 16(4-x)^2 = 36$$

$$y = 4 - x = \frac{3}{2}, \quad x = \frac{5}{2}.$$

A monotonitás vizsgálatával megmutatjuk, hogy a $t(x)$ függvénynek az $x_0 = \frac{5}{2}$ pontban abszolút minimuma van.

$$t'(0) = \frac{1}{5} - \frac{2}{5} = -\frac{1}{5} < 0, \quad t'(4) = \frac{1}{5} > 0.$$

Mivel a deriváltnak csak az x_0-ban van gyöke, ezért a Darboux-tétel miatt a $(0, x_0)$ intervallumon $t'(x) < 0$, és így itt $t(x)$ szigorúan csökken. Hasonlóan kapjuk, hogy $t(x)$ szigorúan növő $(x_0, 4)$-en.

4.5 Függvényvizsgálat

4.175. $\mathbf{P} \iff \mathbf{Q}$: lásd a 4.8. tételt.

4.179. $\mathbf{P} \not\Longrightarrow \mathbf{Q}$: Legyen például $f(x) = x^4,\ a = 0$.

$\mathbf{Q} \Longrightarrow \mathbf{P}$: Lásd a konvexitásról és derivált kapcsolatáról szóló tételeket.

4.185. Keressük meg $f'(x)$ gyökeit:

$$f'(x) = 4x^3 - 12x^2 + 8x = 4x(x^2 - 3x + 2) = 4x(x-1)(x-2) = 0,$$

$$x_1 = 0, \quad x_2 = 1, \quad x_3 = 2.$$

A derivált tényezőinek az előjele, és így a derivált előjele könnyen kapható az egész számegyenesen:

- Ha $x < 0$, akkor $f'(x) < 0$, és ezért $f(x)$ szigorúan csökken $(-\infty, 0)$-ban.
- Ha $0 < x < 1$, akkor $f'(x) > 0$, és ezért $f(x)$ szigorúan nő $(0, 1)$-ben.

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

– Ha $1 < x < 2$, akkor $f'(x) < 0$, és ezért $f(x)$ szigorúan csökken $(1, 2)$-ben.
– Ha $2 < x$, akkor $f'(x) > 0$, és ezért $f(x)$ szigorúan nő $(2, \infty)$-ben.

A monoton szakaszok találkozásánál lokális szigorú szélsőérték van, mégpedig

– 0-ban minimum,
– 1-ben maximum,
– 2-ben minimum.

4.189. $y' = e^{-x} + xe^{-x}(-1) = (1-x)e^{-x}$.

Keressük meg a derivált gyökeit. Az $(1-x)e^{-x} = 0$ egyenletből kapjuk, hogy $x = 1$, ezért a függvénynek csak a $c = 1$-ben lehet lokális szélsőértéke.
Mivel $y'(x) > 0$, ha $x < 1$, és $y'(x) < 0$, ha $x > 1$, ezért a függvénynek *lokális szigorú maximuma* van és itt az érték e^{-1}. A függvény további vizsgálatából az is kiderül, hogy ez egyben abszolút maximuma is a függvénynek.

4.197. Az $f(x) = \dfrac{x+1}{1+x^2}$ értelmezési tartománya $\mathbb{R}$, mindenütt akárhányszor deriválható.

$$\lim_{x\to-\infty} \frac{x+1}{1+x^2} = \lim_{x\to\infty} \frac{x+1}{1+x^2} = 0.$$

$$f'(x) = \frac{1+x^2-2x(x+1)}{(1+x^2)^2} = \frac{1-2x-x^2}{(1+x^2)^2} = -\frac{(x-x_1)(x-x_2)}{(1+x^2)^2}$$

ahol $x_1 = -1-\sqrt{2}$ és $x_2 = -1+\sqrt{2}$ a számláló gyökei.

$$\begin{aligned} f''(x) &= \frac{(-2-2x)(1+x^2)^2 - 4x(1-2x-x^2)(1+x^2)}{(1+x^2)^4} = \\ &= -2\frac{(1+x)(1+x^2)+2x(1-2x-x^2)}{(1+x^2)^3} = \\ &= 2\frac{x^3+3x^2-3x-1}{(1+x^2)^3} = \\ &= 2\frac{(x-X_1)(x-X_2)(x-X_3)}{(1+x^2)^3} \end{aligned}$$

ahol $X_1 = -2-\sqrt{3},\ X_2 = -2+\sqrt{3},\ X_3 = 1$ a számláló gyökei növekvő sorrendben. Az első derivált előjelének vizsgálatával kapjuk, hogy

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

– $f(x)$ szigorúan csökken $(-\infty, x_1)$-ben,
– x_1-ben szigorú minimum van,
– $f(x)$ szigorúan nő (x_1, x_2)-ben,
– x_2-ben szigorú maximum van,
– $f(x)$ szigorúan csökken (x_2, ∞)-ben.

A második derivált előjelének vizsgálatával kapjuk, hogy

– $f(x)$ szigorúan konkáv $(-\infty, X_1)$-ben,
– $f(x)$ szigorúan konvex (X_1, X_2)-ben,
– $f(x)$ szigorúan konkáv (X_2, X_3)-ban,
– $f(x)$ szigorúan konvex (X_3, ∞)-ben,
– X_1, X_2 és X_3-ban inflexió van.

4.206. Az $f(x) = 1 - 9x - 6x^2 - x^3$ függvény egy harmadfokú polinom, akárhányszor deriválható $\mathbb{R}$-en. Mivel a főegyüttható negatív,


$$\lim_{x\to-\infty} 1 - 9x - 6x^2 - x^3 = \infty, \quad \lim_{x\to\infty} 1 - 9x - 6x^2 - x^3 = -\infty$$

Számoljuk ki az első és a második derivált gyökeit:

$$f'(x) = -9 - 12x - 3x^2 = 0,$$

$$x_1 = -3,\ x_2 = -1.$$

$$f''(x) = -12 - 6x = 0, \quad X_1 = -2.$$



Az ábrából kiolvasható, a deriváltak vizsgálatával pedig bizonyítható, hogy x_1-ben minimum, x_2-ben maximum, X_1-ben pedig inflexió van, $(-\infty, -3]$-ban csökken, $[-3, -1]$-ben nő, $[-1, \infty)$-ben csökken, $(-\infty, -2]$-ben konvex, és $(-2, \infty)$-ben konkáv a függvény.

4.6 Elemi függvények

4.227. $2^{\frac{\ln 100}{\ln 2}} = 2^{\log_2 100} = 100.$

4.229. $\arcsin \dfrac{\sqrt{3}}{2} = \dfrac{\pi}{3} (= 60°).$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

4.231. $\arccos(\cos(9\pi)) = \pi$ (és nem 9π).

4.233. $\operatorname{tg}(\operatorname{arctg} 100) = 100$.

4.238. Az $f(x) = \cos\frac{x}{2} + \operatorname{tg}\frac{x}{3}$ periódusa például a $p = 12\pi$, mert $\cos\frac{x}{2}$-nek a 4π, $\operatorname{tg}\frac{x}{3}$-nek pedig a 3π periódusa.

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

Az egyváltozós Riemann-integrál

5.1 Határozatlan integrál

5.1.

$f(x) = x^3 - 4x$, $f(x) : (2)$, $f'(x) : (E)$.
$f(x) = x^3$, $f(x) : (4)$, $f'(x) : (C)$.
$f(x) = x + \sin x$, $f(x) : (5)$, $f'(x) : (A)$.
$f(x) = \operatorname{tg} x$, $f(x) : (4)$, $f'(x) : (D)$.
$f(x) = e^{-x}$, $f(x) : (1)$, $f'(x) : (B)$.

5.5. Előbb alakítsuk át az integrandust:

$$(\sin x + \cos x)^2 = \sin^2 x + 2\sin x \cos x + \cos^2 x = 1 + 2\sin x \cos x = 1 + \sin 2x.$$

$$\int (\sin x + \cos x)^2 \, dx = \int (1 + \sin 2x)\, dx = \int dx + \int \sin 2x \, dx = x - \frac{\cos 2x}{2} + C$$

5.8. $\int x^{3/2}\, dx = \frac{2}{5}x^{5/2} + C$

5.10. $\int \frac{-5}{x-7}\, dx = -5\ln(x-7) + C$

5.12. $\int \sin 2x + 3\cos x \, dx = -\frac{\cos 2x}{2} + 3\sin x + C$

5.14. $\int e^{2x-3}\, dx = \frac{1}{2}e^{2x-3} + C$

5.16. $\int \frac{x^2}{x^3+1}\, dx = \frac{1}{3}\int \frac{3x^2}{x^3+1}\, dx = \frac{1}{3}\int \frac{(x^3+1)'}{x^3+1}\, dx =$
$= \frac{1}{3}\ln(x^3+1) + C$

5.20. $\int \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}\, dx = \frac{1}{2}\int \frac{2x}{\sqrt{x^2+1}}\, dx = \frac{1}{2}\int \frac{(x^2+1)'}{\sqrt{x^2+1}}\, dx =$
$\sqrt{x^2+1} + C$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

5.24. $$\int \frac{1}{2+x^2}\,dx = \frac{1}{2}\int \frac{1}{1+\left(\frac{x}{\sqrt{2}}\right)^2}\,dx = \frac{1}{\sqrt{2}}\operatorname{arctg}\left(\frac{x}{\sqrt{2}}\right)+C$$

5.28. Bontsuk parciális törtekre az integrandust:

$$\frac{3}{(x+3)(x+2)} = \frac{A}{x+2}+\frac{B}{x+3}$$

Szorozzuk be mindkét oldalt a baloldal nevezőjével:

$$3 = A(x+3)+B(x+2)$$

Az együtthatók összehasonlításával lineáris egyenletrendszert kapunk A-ra és B-re:

$$\begin{array}{rcrcl} 3A & + & 2B & = & 3 \\ A & + & B & = & 0 \end{array}$$

$$A = 3, \qquad B = -3$$

Így tehát

$$\int \frac{3}{(x+3)(x+2)}dx = \int \frac{3}{x+2}\,dx - \int \frac{3}{x+3}\,dx = 3\ln\frac{x+2}{x+3}+C$$

5.32. Az integrandus nevezőjének nincs valós gyöke. Első lépésként szabaduljunk meg a számlálóban az „x”-es tagtól a nevező deriváltjának a „becsempészésével”:

$$\int \frac{x-2}{x^2-2x+6}dx = \frac{1}{2}\int \frac{(2x-2)-2}{x^2-2x+6}\,dx = \\ = \frac{1}{2}\int \frac{2x-2}{x^2-2x+6}\,dx - \int \frac{1}{x^2-2x+6}\,dx$$

A jobboldalon az első integrál f'/f alakú, és a nevező pozitív, ezért

$$\int \frac{2x-2}{x^2-2x+6}\,dx = \ln(x^2-2x+6)+C.$$

A második integrált visszavezetjük az $\int \frac{1}{1+t^2}\,dt$ alapintegrálra a teljes négyzetté kiegészítés módszerével:

$$\int \frac{1}{x^2-2x+6}\,dx = \int \frac{1}{(x-1)^2+5}\,dx = \frac{1}{5}\int \frac{1}{\left(\frac{x}{\sqrt{5}}-\frac{1}{\sqrt{5}}\right)^2+1}\,dx = \\ = \frac{1}{\sqrt{5}}\operatorname{arctg}\left(\frac{x}{\sqrt{5}}-\frac{1}{\sqrt{5}}\right)+C.$$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

Így tehát

$$\int \frac{x-2}{x^2-2x+6}dx = \frac{1}{2}\ln(x^2-2x+6) - \frac{1}{\sqrt{5}}\operatorname{arctg}\left(\frac{x}{\sqrt{5}} - \frac{1}{\sqrt{5}}\right) + C.$$

5.36. Írjuk fel az integrandust egy polinom és egy *valódi* (számláló foka kisebb a nevező foknál) racionális függvény összegeként a polinomok maradékos osztásának segítségével:

$$\frac{3x^3+2x-1}{x^2-x-6} = 3x+3+\frac{23x+17}{x^2-x-6} = 3x+3+\frac{23x+17}{(x-3)(x+2)}$$

$$\int \frac{3x^3+2x-1}{x^2-x-6}dx = \int (3x+3)\,dx + \int \frac{23x+17}{(x-3)(x+2)}\,dx$$

A jobboldal második integráljában szereplő racionális függvényt bontsuk fel parciális törtek összegére:

$$\frac{23x+17}{(x-3)(x+2)} = \frac{A}{x-3} + \frac{B}{x+2}$$

$$23x+17 = A(x+2)+B(x-3)$$

$$\begin{array}{rcrcl} A & + & B & = & 23 \\ 2A & - & 3B & = & 17 \end{array}$$

Az első egyenlet háromszorosát a másodikhoz adva:

$$5A = 86$$

$$A = \frac{86}{5}, \qquad B = \frac{29}{5}$$

$$\int \frac{3x^3+2x-1}{x^2-x-6}dx = \int (3x+3)\,dx + \frac{86}{5}\int \frac{1}{x-3}\,dx + \frac{29}{5}\int \frac{1}{x+2}\,dx =$$

$$= \frac{3}{2}x^2 + 3x + \frac{86}{5}\ln|x-3| + \frac{29}{5}\ln|x+2| + C$$

5.40. Bontsuk parciális törtekre az integrandust:

$$\frac{1}{x^3+x^2} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x^2} + \frac{C}{x+1}$$

$$1 = Ax(x+1) + B(x+1) + Cx^2$$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

Ha x helyébe 0-át helyettesítünk, megkapjuk B-t, -1-et helyettesítve pedig megkapjuk C-t. Ezek segítségével pedig A-t:

$$A = -1, \qquad B = 1, \qquad C = 1$$

$$\int \frac{1}{x^3+x^2}\,dx = -\int \frac{1}{x}\,dx + \int \frac{1}{x^2}\,dx + \int \frac{1}{x+1}\,dx = \ln\left|\frac{x+1}{x}\right| - \frac{1}{x} + C$$

5.44.

$$\int \frac{x+2}{x-1}\,dx = \int \frac{(x-1)+3}{x-1}\,dx = \int dx + 3\int \frac{1}{x-1}\,dx = \\ = x + 3\ln|x-1| + C$$

5.48.

$$\int \frac{x+2}{x^2+2x+2}\,dx = \frac{1}{2}\int \frac{(2x+2)+2}{x^2+2x+2}\,dx = \\ = \frac{1}{2}\ln(x^2+2x+2) + \int \frac{1}{x^2+2x+2}\,dx = \\ = \frac{1}{2}\ln(x^2+2x+2) + \int \frac{1}{(x+1)^2+1}\,dx = \\ = \frac{1}{2}\ln(x^2+2x+2) + \operatorname{arctg}(x+1) + C$$

5.50.

$$\int \sin^2 x\,dx = \int \frac{1-\cos 2x}{2}\,dx = \frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4} + C$$

5.54.

$$\int \frac{5}{\cos^2(1-x)}\,dx = -5\operatorname{tg}(1-x) + C$$

5.58.

$$\int \frac{\sin^2 2x + 1}{\cos^2 x}\,dx = \int \frac{4\sin^2 x\cos^2 x + 1}{\cos^2 x}\,dx = 2x - \sin 2x + \operatorname{tg} x + C$$

Itt felhasználtuk az 5.50. feladat eredményét.

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

5.60. Legyen $f(x) = x$, $g'(x) = \cos x$. Ezzel a szereposztással

$$\int x\cos x\,dx = x\sin x - \int \sin x\,dx = x\sin x + \cos x + C.$$

5.64.

$$\begin{aligned}\int \operatorname{arctg} x\,dx &= \int 1\cdot \operatorname{arctg} x\,dx = x\operatorname{arctg} x - \int \frac{x}{1+x^2} = \\ &= x\operatorname{arctg} x - \frac{1}{2}\int \frac{2x}{1+x^2}\,dx = \\ &= x\operatorname{arctg} x - \frac{1}{2}\ln(1+x^2) + C\end{aligned}$$

5.68.

$$\int x\ln\frac{1+x}{1-x}\,dx = \frac{1}{2}x^2\ln\frac{1+x}{1-x} - \frac{1}{2}\int \frac{x^2}{\frac{1+x}{1-x}}\cdot\frac{2}{(1-x)^2}\,dx =$$

$$= \frac{1}{2}x^2\ln\frac{1+x}{1-x} - \int \frac{x^2}{1-x^2}\,dx$$

$$-\int \frac{x^2}{1-x^2}\,dx = \int \frac{1-x^2-1}{1-x^2}\,dx = x - \int \frac{1}{1-x^2}\,dx$$

$$\int \frac{1}{1-x^2}\,dx = \frac{1}{2}\int\left(\frac{1}{1-x}+\frac{1}{1+x}\right)dx = \frac{1}{2}\ln\frac{1+x}{1-x} + C$$

Felhasználtuk, hogy az eredeti integrandus csak $\dfrac{1+x}{1-x} > 0$ esetén értelmes. Így tehát

$$\int x\ln\frac{1+x}{1-x}\,dx = \frac{1}{2}x^2\ln\frac{1+x}{1-x} + x - \frac{1}{2}\ln\frac{1+x}{1-x} + C$$

5.71.

$$t = x^2, \qquad dt = 2x\,dx$$

$$\int xe^{x^2}\,dx = \frac{1}{2}\int 2xe^{x^2}\,dx = \frac{1}{2}\int e^t\,dt = \frac{1}{2}e^t + C = \frac{1}{2}e^{x^2} + C$$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

5.75.

$$t = \cos x, \qquad dt = -\sin x\,dx$$

$$\int \frac{1}{\sin x}\,dx = \int \frac{\sin x}{\sin^2 x}\,dx = -\int \frac{-\sin x}{1-\cos^2 x}\,dx =$$
$$= -\int \frac{1}{1-t^2}\,dt = \frac{1}{2}\ln\frac{1-t}{1+t} + C = \frac{1}{2}\ln\frac{1-\cos x}{1+\cos x} + C$$

Itt felhasználtuk az 5.68. feladat egy részeredményét és azt, hogy $|t| < 1$ miatt $\dfrac{1-t}{1+t} > 0$.

5.79.

$$x = \sin t, \qquad dx = \cos t\,dt, \qquad t = \arcsin x$$

$$\int \frac{1}{(1-x^2)\sqrt{1-x^2}}\,dx = \int \frac{1}{(1-\sin^2 t)\cos t}\cos t\,dt =$$
$$= \int \frac{1}{\cos^2 t}\,dt = \operatorname{tg} t + C =$$
$$= \frac{\sin t}{\sqrt{1-\sin^2 t}} + C = \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} + C$$

5.83.

$$t = x^2 + x + 1, \qquad dt = 2x + 1$$

$$\int (2x+1)e^{x^2+x+1}\,dx = \int e^t\,dt = e^t + C = e^{x^2+x+1} + C$$

5.87.

$$t = e^x, \qquad x = \ln t, \qquad dx = \frac{dt}{t}$$

$$\int \frac{e^x + 2}{e^x + e^{2x}}\,dx = \int \frac{t+2}{t+t^2}\cdot\frac{dt}{t} = \int \frac{t+2}{t^2(t+1)}\,dt$$

Bontsuk parciális törtekre az integrandust:

$$\frac{t+2}{t^2(t+1)} = \frac{A}{t} + \frac{B}{t^2} + \frac{C}{t+1}$$

$$t + 2 = At(t+1) + B(t+1) + Ct^2$$

$$A = -1, \qquad B = 2, \qquad C = 1$$

$$\int \frac{t+2}{t^2(t+1)}\,dt = \int \left(-\frac{1}{t} + \frac{2}{t^2} + \frac{1}{t+1}\right)dt = -\frac{2}{t} + \ln\frac{t+1}{t} + C$$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

Felhasználtuk, hogy $\dfrac{t+1}{t} > 0$. Elvégezve a visszahelyettesítést

$$\int \frac{e^x+2}{e^x+e^{2x}}\,dx = -\frac{2}{e^x} + \ln\frac{e^x+1}{e^x} + C = -2e^{-x} + \ln(1+e^{-x}) + C$$

5.91.

$$\int \frac{1}{(x+2)(x-1)}\,dx = \frac{1}{3}\int\left(\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+2}\right)dx = \frac{1}{3}\ln\left|\frac{x-1}{x+2}\right| + C$$

5.95.

$$\int \frac{1}{e^x+e^{-x}}\,dx = \frac{1}{2}\int\frac{dx}{\operatorname{ch} x} = \frac{1}{2}\int\frac{\operatorname{ch} x}{1+\operatorname{sh}^2 x}\,dx = \frac{1}{2}\operatorname{arctg}\operatorname{sh} x + C$$

5.99.

$$\int \ln(x^2+1)\,dx = \int 1\cdot\ln(x^2+1)\,dx = x\ln(x^2+1) - 2\int\frac{x^2}{x^2+1}\,dx$$

$$\int\frac{x^2}{x^2+1}\,dx = \int\frac{(x^2+1)-1}{x^2+1}\,dx = x - \operatorname{arctg} x + C$$

$$\int \ln(x^2+1)\,dx = x\ln(x^2+1) - 2x + 2\operatorname{arctg} x + C$$

5.103.

$$\int 2x\sin(x^2+1)\,dx = \int(x^2+1)'\sin(x^2+1)\,dx = -\cos(x^2+1) + C$$

5.107.

$$\int\frac{e^{2x}}{1+e^x}\,dx = \int\frac{e^x}{e^x+1}e^x\,dx = \int\frac{t}{t+1}\,dt = t - \ln(t+1) + C$$

ahol $t = e^x$.

$$\int\frac{e^{2x}}{1+e^x}\,dx = e^x - \ln(e^x+1) + C$$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

5.111.

$$\int (x^2+x)\ln x\,dx = \left(\frac{x^3}{3}+\frac{x^2}{2}\right)\ln x - \int\left(\frac{x^2}{3}+\frac{x}{2}\right)dx =$$
$$= \left(\frac{x^3}{3}+\frac{x^2}{2}\right)\ln x - \frac{x^3}{9} - \frac{x^2}{4} + C$$

5.115.

$$\int 3^{-2x}\,dx = \int e^{(-2\ln 3)x}\,dx = -\frac{1}{2\ln 3}e^{(-2\ln 3)x} + C = -\frac{1}{2\ln 3}3^{-2x} + C$$

5.119.

$$t = \operatorname{tg} x, \qquad dt = \frac{1}{\cos^2 x}\,dx, \qquad \cos^2 x = \frac{1}{1+t^2}, \qquad \sin^2 x = \frac{t^2}{1+t^2}$$
$$\int \frac{1}{\sin^2 x\cos^4 x}\,dx = \int \frac{1}{\sin^2 x\cos^2 x}\cdot\frac{1}{\cos^2 x}\,dx = \int \frac{(t^2+1)^2}{t^2}\,dt =$$
$$= \int\left(t^2+2+\frac{1}{t^2}\right)dt = \frac{t^3}{3}+2t-\frac{1}{t}+C =$$
$$= \frac{\operatorname{tg}^3 x}{3} + 2\operatorname{tg} x - \operatorname{ctg} x + C$$

5.2 Határozott integrál

5.124.

(a) A Φ finomítása az F felosztásnak.

(b) A Φ nem finomítása F-nek, mert $1,5$ nem szerepel a Φ osztópontjai között.
Az F sem finomítása Φ-nek, mert -1 nem szerepel az F osztópontjai között.

5.125.

$$S_\Phi = 6, \qquad s_\Phi = 0$$

5.128.

$$S_\Phi = -1\cdot 1 + 0\cdot 1 + 4\cdot 4 = 15, \qquad s_\Phi = -2\cdot 1 - 1\cdot 1 + 0\cdot 4 = -3$$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

5.131. Igen, mert $f(x)$ folytonos (és monoton).

5.135. Nem, mert $f(x)$ nem korlátos $[0,1]$-en.

5.140. Legyen $f(x)=\dfrac{1}{x^2+e^x}$. Ekkor $x\in[1,2]$ esetén $0<f(x)<1$, és így a 5.138. feladat szerint

$$0=0\cdot(2-1)\le\int_1^2\frac{1}{x^2+e^x}\,dx\le 1\cdot(2-1)=1$$

5.144. Mivel minden integrálfüggvény folytonos, $\operatorname{sgn}x$ pedig 0-ban nem folytonos, ezért $\operatorname{sgn}x$ nem lehet integrálfüggvény $[-1,1]$-en.

A Darboux-tétel szerint $\operatorname{sgn}x$-nek nincs primitív függvénye $(-1,1)$-en.

5.146. A $\sigma_n=\dfrac{\sin\frac{1}{n}+\sin\frac{2}{n}+\dots+\sin\frac{n}{n}}{n}$ integrálközelítő összege az integrálható $\sin x$ függvénynek a $[0,1]$ intervallum egyenletes felosztásán, ezért

$$\sigma_n=\frac{\sin\frac{1}{n}+\sin\frac{2}{n}+\dots+\sin\frac{n}{n}}{n}\to\int_0^1\sin x\,dx=1-\cos 1$$

5.150.

$$n\sum_{i=1}^{n}\frac{i}{n^2+i^2}=\sum_{i=1}^{n}\frac{\frac{i}{n}}{1+\left(\frac{i}{n}\right)^2}\to\int_0^1\frac{x}{1+x^2}\,dx=\left[\frac{1}{2}\ln(1+x^2)\right]_0^1=\frac{\ln 2}{2}$$

5.154.

$$g(x)=G'(x)=\begin{cases}2x\sin\dfrac{1}{x}-\cos\dfrac{1}{x} & \text{ha } x\neq 0\\[2ex] 0 & \text{ha } x=0\end{cases}$$

Mivel

$$h(x)=f(x)+g(x)=\begin{cases}2x\sin\dfrac{1}{x} & \text{ha } x\neq 0\\[2ex] 0 & \text{ha } x=0\end{cases}$$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

folytonos mindenütt, ezért van primitív függvénye, de akkor az $f(x) = h(x) - g(x)$ függvénynek is van primitív függvénye.

5.156.

$$H(x) = \int_2^x \frac{1}{\ln t}\,dt, \qquad H'(x) = \frac{1}{\ln x}$$

5.158. Mivel $\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{x}{\ln x} = \infty$ és $\lim\limits_{x\to\infty} \displaystyle\int_2^x \frac{1}{\ln t}\,dt = \infty$, ezért az

$$\frac{\ln x}{x}\int_2^x \frac{1}{\ln t}\,dt = \frac{\displaystyle\int_2^x \frac{1}{\ln t}\,dt}{\dfrac{x}{\ln x}}$$

hányadosra alkalmazhatjuk a L'Hospital szabályt:

$$\lim_{x\to\infty} \frac{\ln x}{x}\int_2^x \frac{1}{\ln t}\,dt = \lim_{x\to\infty} \frac{\dfrac{1}{\ln x}}{\dfrac{\ln x - 1}{\ln^2 x}} = \lim_{x\to\infty} \frac{\ln x}{\ln x - 1} = 1$$

5.162.

$$\int_2^3 x^2\,dx = \left[\frac{x^3}{3}\right]_2^3 = 9 - \frac{8}{3}$$

5.166.

$$\int_{-2\pi}^0 \sin^2 x\,dx = \int_{-2\pi}^0 \frac{1-\cos 2x}{2}\,dx = \left[\frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4}\right]_{-2\pi}^0 = \pi$$

5.168.

$$x = \sin t, \qquad dx = \cos t\,dt, \qquad \frac{1}{2} = \sin\frac{\pi}{6}, \qquad \frac{\sqrt{3}}{2} = \sin\frac{\pi}{3}$$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

$$\int_{1/2}^{\sqrt{3}/2} \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}}\,dx = \int_{\pi/6}^{\pi/3} \frac{\sin^2 t}{\sqrt{1-\sin^2 t}}\cos t\,dt =$$

$$= \int_{\pi/6}^{\pi/3} \sin^2 t\,dt = \left[\frac{t}{2} - \frac{\sin 2t}{4}\right]_{\pi/6}^{\pi/3} = \frac{\pi}{12}$$

(lásd az 5.50. feladatot).

5.172.

$$t = \operatorname{tg} x, \qquad x = \operatorname{arctg} t, \qquad dx = \frac{1}{dt}, \qquad \operatorname{tg}\frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{3}, \qquad \operatorname{tg}\frac{\pi}{2} = \infty$$

$$\int_{\pi/6}^{\pi/2} \frac{1}{1+\operatorname{tg} x}\,dx = \int_{\sqrt{3}/3}^{\infty} \frac{1}{(1+t)(1+t^2)}\,dt = \frac{1}{2}\int_{\sqrt{3}/3}^{\infty} \left(\frac{1}{t+1} + \frac{1-t}{1+t^2}\right) dt =$$

$$= \frac{1}{2}\left[\ln\frac{1+t}{\sqrt{1+t^2}} + \operatorname{arctg} t\right]_{\sqrt{3}/3}^{\infty} = -\frac{1}{2}\ln\frac{1+\sqrt{3}}{2} + \frac{\pi}{6}$$

5.3 A határozott integrál alkalmazásai

5.177. Számoljuk ki a parabola és az egyenes két metszéspontját:

$$x^2 = -x + 2, \qquad x_1 = -2,\ x_2 = 1$$

A két metszéspont között a $-x+2$ egyenes a „nagyobb”

$$T = \int_{-2}^{1} (-x+2-x^2)\,dx = \int_{-2}^{1} (2-x-x^2)\,dx = \left[2x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3}\right]_{-2}^{1} = 6+\frac{3}{2}+\frac{7}{3}$$

5.181.

$$T = \int_1^e \ln x\,dx = [x\ln x - x]_1^e = 1$$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

5.185. A két metszéspont:

$$\frac{1}{1+x^2}=\frac{x^2}{2},\qquad x^4+x^2-2=0,\qquad x_1=-1,\ x_2=1$$

$$T=\int_{-1}^{1}\left(\frac{1}{1+x^2}-\frac{x^2}{2}\right)dx=\left[\operatorname{arctg}x-\frac{x^3}{6}\right]_{-1}^{1}=\frac{\pi}{2}-\frac{1}{3}$$

5.189. Egy ilyen parabolaszeletet kapunk, ha tekintjük az $y=m\left(1-\frac{4}{h^2}x^2\right)$ parabola és az x tengely által határolt síkidom területét.

$$T=\int_{-h/2}^{h/2}m\left(1-\frac{4}{h^2}x^2\right)dx=m\left[x-\frac{4}{3h^2}x^3\right]_{-h/2}^{h/2}=m\left(h-\frac{h}{3}\right)=\frac{2}{3}mh$$

5.192. Itt $-\frac{\pi}{6}\le\varphi\le\frac{\pi}{6}$.

$$T=\frac{1}{2}\int_{-\pi/6}^{\pi/6}\cos^2 3\varphi\,d\varphi=\frac{1}{2}\left[\frac{\varphi}{2}+\frac{\sin 6\varphi}{6}\right]_{-\pi/6}^{\pi/6}=\frac{\pi}{12}$$

5.196.

$$V=\pi\int_0^{\pi}\sin^2 x\,dx=\pi\left[\frac{x}{2}-\frac{\sin 2x}{4}\right]_0^{\pi}=\frac{\pi^2}{2}$$

5.200.

$$V=\pi\int_0^1\arcsin^2 y\,dy=\pi\int_0^{\pi/2}x^2\cos x\,dx$$

Számoljuk ki kétszeres parciális integrálással a $\int x^2\cos x\,dx$ határozatlan integrált:

$$\begin{aligned}\int x^2\cos x\,dx&=x^2\sin x-2\int x\sin x\,dx=\\&=x^2\sin x+2x\cos x-2\int\cos x\,dx=\\&=x^2\sin x+2x\cos x-2\sin x+C.\end{aligned}$$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

Ezt felhasználva

$$V = \pi \int_0^{\pi/2} x^2 \cos x \, dx = \pi \left[x^2 \sin x + 2x \cos x - 2 \sin x \right]_0^{\pi/2} = \frac{\pi^3}{4} - 2\pi.$$

5.204.

$$V = \pi \int_1^2 \left(e^{2x} - \frac{1}{x^2} \right) dx = \pi \left[\frac{e^{2x}}{2} + \frac{1}{x} \right]_1^2 = \pi \left(\frac{e^2(e^2-1)}{2} - \frac{1}{2} \right)$$

5.208.

$$L = \int_{-1}^{1} \sqrt{1 + \operatorname{sh}^2 x} \, dx = \int_{-1}^{1} \operatorname{ch} x \, dx = [\operatorname{sh} x]_{-1}^{1} = 2 \operatorname{sh} 1$$

5.4 Improprius integrál

5.220. Ha $c \neq 1$, akkor

$$\int_1^\infty \frac{1}{x^c} \, dx = \left[\frac{1}{1-c} \cdot \frac{1}{x^{c-1}} \right]_1^\infty = \begin{cases} \dfrac{1}{c-1} & \text{ha } c > 1 \\ \infty & \text{ha } c < 1 \end{cases}$$

Ha pedig $c = 1$, akkor

$$\int_1^\infty \frac{1}{x} \, dx = [\ln x]_1^\infty = \infty.$$

Tehát az $\displaystyle\int_1^\infty \frac{1}{x^c} \, dx$ improprius integrál akkor és csak akkor konvergens, ha $c > 1$.

5.223.

$$\int_3^\infty 2^{-x} \, dx = \left[-\frac{2^{-x}}{\ln 2} \right]_3^\infty = \frac{1}{8 \ln 2}$$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

5.227. Az 5.220. feladat megoldása szerint $\int_1^\infty \frac{dx}{\sqrt{x}}$ divergens.

5.231.

$$\int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{dx}{x \ln x} = [\ln|\ln x|]_{1/2}^{1^-} = -\infty$$

5.235.

$$\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = [\arcsin x]_0^{1^-} = \frac{\pi}{2}$$

5.239.

$$\int_1^\infty \frac{dx}{\sqrt{x}+x^2} < \int_1^\infty \frac{dx}{x^2} < \infty$$

(lásd a 5.220. feladatot).

5.243. Az $\frac{x^2}{x^4-x^2+1}$ függvény Riemann-integrálható $[0,1]$-en (mert a nevező nem nulla), ezért elég megmutatni, hogy az $\int_1^{+\infty} \frac{x^2}{x^4-x^2+1}\,dx$ improprius integrál konvergens.

Mivel az $f(x) = \frac{x^2}{x^4-x^2+1}$ és a $g(x) = \frac{1}{x^2}$ függvény nagyságrendje azonos (a két függvény hányadosa tart 1-hez a ∞-ben), $\int_1^\infty \frac{dx}{x^2}$ pedig konvergens, ezért a nagyságrendi kritérium szerint $\int_1^{+\infty} \frac{x^2}{x^4-x^2+1}\,dx$ is konvergens.

5.247. Mivel $\sin x \sim x$ a 0-ban, $\int_0^{\pi/2} \frac{dx}{x}$ pedig divergens, ezért $\int_0^{\pi/2} \frac{dx}{\sin x}$ divergens.

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

5.251.

$$\int_0^\infty xe^{-x^2}\,dx = -\frac{1}{2}\left[e^{-x^2}\right]_0^\infty = \frac{1}{2}$$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

Numerikus sorok

6.1 Numerikus sorok konvergenciája

6.1. A véges geometriai sor összegképletét használva

$$s_n = 1+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\cdots+\frac{1}{2^n} = \sum_{k=0}^{n}\left(\frac{1}{2}\right)^k = \frac{1-\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{\frac{1}{2}} = 2\left(1-\frac{1}{2^{n+1}}\right) \longrightarrow 2$$

6.5.

$$\frac{1}{k(k+3)} = \frac{1}{3}\left(\frac{1}{k}-\frac{1}{k+3}\right)$$

$$s_n = \sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k(k+3)} = \frac{1}{3}\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{k}-\frac{1}{k+3}\right) =$$

$$= \frac{1}{3}\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{n+1}-\frac{1}{n+2}-\frac{1}{n+3}\right) \longrightarrow \frac{1}{3}\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\right) = \frac{11}{18}$$

6.8.

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{4^n+5^n}{9^n} = \sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{4}{9}\right)^n + \sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{5}{9}\right)^n = \frac{4}{9}\frac{1}{1-\frac{4}{9}} + \frac{5}{9}\frac{1}{1-\frac{5}{9}} = \frac{4}{5}+\frac{5}{4}$$

6.13. Mivel a tagok nem tartanak 0-hoz, ezért a sor divergens (lásd a tagok 0-hoz tartásáról szóló konvergencia kritériumot).

6.15. Ha A jelöli a végtelen sor összegét s_n pedig az első n tag összegét, akkor

$$s_n \longrightarrow A, \qquad s_{n-1} \longrightarrow A, \qquad a_n = s_n - s_{n-1} \longrightarrow 0.$$

6.16. Megmutatjuk, hogy a harmonikus sor nem teljesíti a Cauchy-kritériumot, mert az $\varepsilon = \frac{1}{2}$ esetén nem található „jó” küszöbindex:

$$s_{2n}-s_n = \frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+2}+\cdots+\frac{1}{2n} > \frac{1}{2n}+\frac{1}{2n}+\cdots+\frac{1}{2n} = n\cdot\frac{1}{2n} = \frac{1}{2}$$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

6.21. Nem, például a harmonikus sor divergens, de tagjai 0-hoz tartanak.

6.27. A $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+n^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$ sor részletösszegei úgynevezett **teleszkopikus összegek**:

$$s_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+1)} = \sum_{k=1}^{n} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = 1 - \frac{1}{n+1} \longrightarrow 1.$$

6.31. Mivel az $\int_1^{\infty} \frac{dx}{\sqrt[3]{x}}$ improprius integrál divergens, ezért az integrálkritérium szerint a $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{n}}$ sor is divergens.

Használhatjuk a majoráns-kritériumot is, mivel $\frac{1}{\sqrt[3]{n}} \geq \frac{1}{n}$.

6.35.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sin(n\pi) = \sum_{n=1}^{\infty} 0 = 0$$

6.40. Nem, legyen például $b_n = 0,\ a_n = -1$.

Ha viszont feltesszük azt is, hogy $a_n > 0$, akkor a majoráns-kritérium „kontra-pozitív” verziója szerint $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ divergens.

6.2 Pozitív tagú sorok konvergenciakritériumai

6.43. Mivel az integrálkritérium szerint (az $\frac{1}{x^2}$-re alkalmazva) a $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ sor konvergens majoránsa a $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2+4}$ sornak, ezért a $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2+4}$ sor is konvergens.

6.45. Lásd a hányadoskritériumot.

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

6.48.

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{3^{n+1}(n+1)!}{(n+1)^{n+1}} \cdot \frac{n^n}{3^n n!} = \frac{3}{(1+1/n)^n} \longrightarrow \frac{3}{e} > 1.$$

Ezért a $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n n!}{n^n}$ sor divergens.

6.50. Lásd a gyökkritériumot.

6.53.

$$\sqrt[n]{a_n} = \sqrt[n]{\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{n}\right)^n} = \frac{1}{2} + \frac{1}{n} \longrightarrow \frac{1}{2} < 1.$$

A $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{n}\right)^n$ sor konvergens.

6.58. A $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2+4}{n^4+3n}$ sor nagyságrendje $\frac{1}{n^2}$:

$$\frac{n^2+4}{n^4+3n} : \frac{1}{n^2} = \frac{(n^2+4)n^1}{n^4+3n} \longrightarrow 1,$$

és a $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ sor konvergens, ezért a $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2+4}{n^4+3n}$ sor is konvergens.

6.62. Nem, még akkor sem, ha $f(x)$ monoton csökken. Legyen például $f(x) = 5e^{-x+1}$. Ekkor

$$\int_1^{\infty} 5e^{-x+1}\,dx = \left[-5e^{-x+1}\right]_1^{\infty} = 5, \quad \sum_{n=1}^{\infty} 5e^{-n+1} = 5\frac{1}{1-1/e} = 5\frac{e}{e-1} \neq 5$$

6.66. Az $f(x) = \frac{1}{x \ln x}$ függvény deriváltja $f'(x) = -\frac{\ln x + 1}{x^2 \ln^2 x} < 0$, ha $x \geq 2$, tehát $f(x)$ monoton csökken és pozitív az $[2, \infty)$ félegyenesen. Alkalmazhatjuk erre a függvényre az integrálkritériumot:

$$\int_2^{\infty} \frac{1}{x \ln x}\,dx = [\ln \ln x]_2^{\infty} = \infty,$$

ezért a $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$ sor divergens.

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

6.68.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+\sqrt{n}} > \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n} = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = \infty,$$

tehát $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+\sqrt{n}}$ divergens (majoráns-kritérium).

6.74.

$$\sqrt[n]{\frac{n^2}{2^n}} = \frac{\left(\sqrt[n]{n}\right)^2}{2} \longrightarrow \frac{1}{2} < 1,$$

tehát $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2^n}$ konvergens (gyökkritérium).

6.80. $\dfrac{n^{10}}{3^n - 2^n} < \dfrac{2n^{10}}{3^n}$, ha $2^n < \dfrac{1}{2}3^n$, ami valahonnan kezdve igaz. A $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n^{10}}{3^n}$ sorra alkalmazva a gyökkritériumot

$$\sqrt[n]{\frac{2n^{10}}{3^n}} = \frac{\sqrt[n]{2}\left(\sqrt[n]{n}\right)^{10}}{3} \longrightarrow \frac{1}{3} < 1,$$

ezért a $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{10}}{3^n - 2^n}$ sor konvergens.

6.86.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n + 3^n}{5^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2}{5}\right)^n + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3}{5}\right)^n = \frac{2}{3} + \frac{3}{2} < \infty$$

6.92. A sor tagjai nem tartanak 0-hoz (konvergencia kritériumok):

$$1 + \frac{1}{n} \longrightarrow 1 \neq 0,$$

tehát a $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)$ sor divergens.

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

6.3 Feltételes és abszolút konvergencia

6.99. Nem igaz, például legyen $a_n = (-1)^n$.

6.104. Az $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n}$ Leibniz-sor, mert $\frac{1}{n}$ monoton csökkenően tart 0-hoz, tehát a sor konvergens (de nem abszolút konvergens).

6.108. A $1 - \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt[3]{3}} - \frac{1}{\sqrt[4]{4}} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{\sqrt[n]{n}}$ sor ugyan váltakozó előjelű, de tagjai nem tartanak 0-hoz ($|a_n| \to 1$), ezért a sor divergens.

6.114. A $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{2n+1}$ sor konvergens, mert Leibniz-típusú, de nem abszolút konvergens.

6.120. A $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n^2}$ sor abszolút konvergens, mert $\left| \frac{\sin n}{n^2} \right| \leq \frac{1}{n^2}$.

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

Függvénysorozatok és sorok

7.1 Pontonkénti és egyenletes konvergencia

7.1. Az $f_n(x) = x^n$ függvénysorozat a $(-1, 1]$ intervallum pontjaiban konvergens, másutt divergens.

$$\lim_{n\to\infty} x^n = \begin{cases} 0 & \text{ha } |x| < 1 \\ 1 & \text{ha } x = 1 \end{cases}$$

Minden $-1 < a < b < 1$ esetén az $[a, b]$ intervallumon egyenletes a konvergencia, mert

$$\max\{|x^n| : x \in [a, b]\} = (\max\{|a|, |b|\})^n \longrightarrow 0.$$

Mivel a limesz-függvény nem folytonos (balról 1-ben) a $(-1, 1]$-ben ezért a 7.1. tétel szerint a konvergencia nem egyenletes az egész konvergenciatartományban.

7.5. Az $f_n(x) = \sqrt[n]{1 + x^{2n}}$ sorozat pontonként tart az egész számegyenesen a konstans 1 függvényhez. Minden korlátos $[a, b]$ intervallumon egyenletes a konvergencia, mivel $1+x^{2n}$ korlátos $[a, b]$-n. Mivel minden $n \in \mathbb{N}$ esetén

$$\lim_{x\to\infty} f_n(x) = \lim_{x\to\infty} \sqrt[n]{1 + x^{2n}} = \infty,$$

azaz f_n nem korlátos, ezért f_n nem egyenletesen tart a korlátos $f(x) \equiv 1$ függvényhez $\mathbb{R}$-en illetve $[0, \infty)$-en. Az $f_n(x)$ függvények párosak, ezért a konvergencia a $(-\infty, 0]$ félegyenesen sem egyenletes.

7.11. Minden $x \in \mathbb{R}$ esetén $\lim_{n\to\infty} f_n(x) = 0$. Ez a konvergencia egyenletes minden olyan intervallumon vagy félegyenesen, amelyik csak véges sok $\frac{1}{n}$ alakú pontot tartalmaz, de minden $b > 0$ esetén a $(0, b)$ intervallumon (és minden ilyennél bővebb intervallumon) nem egyenletes a konvergencia, mert az $\varepsilon = 1/b$-hez nincs jó küszöbindex.

7.18. Igen, legyen például $g_n(x) = f_n(x) + 5$, ahol f_n a 7.11. feladatban szereplő függvény.

7.23. **(a)** $f'(0) = \lim_{x\to 0} \dfrac{f_n(x) - f_n(0)}{x} = \lim_{x\to 0} \dfrac{\sqrt{x^2 + \frac{1}{n}} - \sqrt{\frac{1}{n}}}{x} =$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

$$= \lim_{x\to 0} \frac{x}{\sqrt{x^2+\frac{1}{n}}+\sqrt{\frac{1}{n}}} = 0.$$

(b) $\lim\limits_{n\to\infty} f_n(x) = \lim\limits_{n\to\infty} \sqrt{x^2+\frac{1}{n}} = \sqrt{x^2} = |x|.$

(c) $$|f_n(x) - |x|| = \sqrt{x^2+\frac{1}{n}} - |x| = \frac{\frac{1}{n}}{\sqrt{x^2+\frac{1}{n}}+|x|} \le \sqrt{\frac{1}{n}} \longrightarrow 0.$$

(d) Mivel a bal- és jobboldali deriváltja nem egyezik meg (-1 illetve 1), $|x|$ nem deriválható 0-ban.

7.25.

$$|f_n(x)| = \frac{1}{n^2+n^4x^{2n}} \le \frac{1}{n^2}, \qquad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2+n^4x^{2n}} \le \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} < \infty.$$

7.29. A $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{x^4+2^n}$ sor egyenletesen konvergens a Weierstrass-kritérium szerint, mert

$$\left|\frac{(-1)^n}{x^4+2^n}\right| \le \frac{1}{2^n}, \qquad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} < \infty.$$

7.35. A Weierstrass-kritérium szerint $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n!+2^n}$ egyenletesen konvergens $\mathbb{R}$-en, mert

$$\left|\frac{\cos nx}{n!+2^n}\right| \le \frac{1}{n!+2^n} \le \frac{1}{n!}, \qquad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!} < \infty.$$

7.2 Hatványsorok, Taylor-sor

7.42. Számoljuk ki a $\sum\limits_{n=0}^{\infty} \frac{n!}{n^n}x^n$ hatványsor R konvergenciasugarát. A 7.3. tételt használjuk:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}} \cdot \frac{n^n}{n!} = \frac{1}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n} \longrightarrow \frac{1}{e}, \qquad R = e.$$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

Ismert (Stirling-formula), hogy elég nagy n-re $n! > \left(\frac{n}{e}\right)^n$, és ezért a konvergenciatartomány végpontjaiban, e-ben és $-e$-ben a sor tagjai nem tartanak 0-hoz:

$$\frac{n!}{n^n}e^n = n! \cdot \left(\frac{e}{n}\right)^n > 1,$$

ha n elég nagy.

7.48. $\sqrt[n]{|a_n|} = \sqrt[n]{n^2} = (\sqrt[n]{n})^2 \to 1$, $R = 1$. A végpontokban divergens, mert nem tartanak 0-hoz a tagok.

7.54. $\sqrt[n]{\frac{1}{n2^n}} = \frac{1}{2\sqrt[n]{n}} \longrightarrow \frac{1}{2}$, $R = 2$. Tehát a konvergenciatartomány belseje a $(-7,-3)$ intervallum. A jobb végpontban divergens (harmonikus sor), a bal végpontban Leibniz-sor.

7.60. $\sqrt[n]{\frac{1}{n3^n}} = \frac{1}{3\sqrt[n]{n}} \longrightarrow \frac{1}{3}$, $R = 3$. Tehát a konvergenciatartomány belseje a $(-3,3)$ intervallum. A jobb végpontban divergens (harmonikus sor), a bal végpontban Leibniz-sor.

7.64. $\frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = \frac{((n+1)!)^2}{(2n+2)!} \cdot \frac{(2n)!}{(n!)^2} = \frac{(n+1)^2}{(2n+1)(2n+2)} \to \frac{1}{4}$. Ezért $R = 4$.

7.66. A $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$ hatványsor konvergenciasugara 1, ezért a tagonkénti integrálásról szóló tétel szerint igaz az állítás.

7.72. A $x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$ hatványsor konvergencia sugara 1. Jelölje $f(x)$ a hatványsor összegfüggvényét a $(-1,1)$ intervallumon. A tagonkénti deriválásról szóló tétel szerint

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n \cdot x^{n-1}}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1} = \sum_{k=0}^{\infty} x^k = \frac{1}{1-x},$$

így tehát $f(x)$ primitív függvénye az $\frac{1}{1-x}$ függvénynek, és $f(0) = 0$, ezért

$$f(x) = -\ln(1-x), \qquad -1 < x < 1.$$

Megjegyzés: Mivel -1-ben a sor konvergens (Leibniz-sor), ezért az úgy nevezett *Abel-kritérium* segítségével belátható, hogy a fenti képlet -1-ben is érvényes.

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

7.76. Felhasználva a geometriai sor összegfüggvényét

$$\sum_{n=0}^{\infty}(\sin x)^n = \frac{1}{1-\sin x} \quad \text{, ha} \quad |\sin x| \neq 1 \quad \text{, azaz} \quad x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi,\ k \in \mathbb{Z}$$

7.80. $\sqrt[n]{\dfrac{1}{n(n+1)}} \to 1$, tehát $R = 1$.

Legyen $g(x) = x \cdot f(x) = \displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n(n+1)}$. Tagonkénti deriválással $g'(x) = \displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$.

Újabb deriválással $g''(x) = \displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1} = \sum_{k=0}^{\infty} x^k = \frac{1}{1-x}$.

Ezért $g'(x) = \displaystyle\int \frac{1}{1-x}\,dx = -\ln(1-x)$, $\quad g(x) = -\int \ln(1-x)\,dx = x + (1-x)\ln(1-x)$.

Így tehát $\quad f(x) = 1 + \dfrac{1-x}{x}\ln(1-x)$, ha $|x| < 1$.

7.82. $\sqrt[n]{n} \to 1$, tehát $R = 1$.

Legyen $g(x) = \dfrac{f(x)}{x} = \displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1}$.

Legyen $h(x)$ az a primitív függvénye $g(x)$-nek, amelyre $h(0) = 0$. Ezt a függvényt a hatványsor tagonkénti integrálásával kaphatjuk meg:

$h(x) = \displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x} - 1 = \frac{x}{1-x}$. Így tehát $g(x) = h'(x) = \dfrac{1}{(1-x)^2}$, ezért

$$f(x) = x \cdot g(x) = \frac{x}{(1-x)^2}.$$

7.84. $\sqrt[n]{n(n+1)} \to 1$, tehát $R = 1$.

Legyen $g(x)$ az a primitív függvénye $f(x)$-nek, amelyre $g(0) = 0$. Ezt a függvényt a hatványsor tagonkénti integrálásával kaphatjuk meg:

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

$g(x) = \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n+1} = x\sum_{n=1}^{\infty} nx^n$. Az előző feladat eredményét felhasználva $g(x) = \dfrac{x^2}{(1-x)^2}$.

Innen már könnyen kapjuk $f(x)$-et:

$$f(x) = g'(x) = \frac{2x(1-x)^2 + 2x^2(1-x)}{(1-x)^4} = 2\frac{x(1-x)+x^2}{(1-x)^3} = 2\frac{x}{(1-x)^3}$$

7.87. Helyettesítsünk az e^x Taylor-sorában x helyébe $2x$-et (nevezetes Taylor-sorok).

$$e^{2x} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2x)^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{n!}x^n, \qquad x \in \mathbb{R}.$$

7.93.

$$\frac{1}{1+x} = \frac{1}{1-(-x)} = \sum_{n=0}^{\infty}(-x)^n = \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^n, \qquad |x| < 1.$$

7.96. Legyen $f(x) = \ln(1+x)$. Ekkor a 7.93. feladat szerint

$$f'(x) = \frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^n, \quad \text{ha } |x| < 1.$$

$$f(x) = \int_0^x \frac{1}{1+t}\,dt = \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n \int_0^x t^n\,dt = \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1} = \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n \frac{x^n}{n}$$

7.99. Bővítsük a függvényt $1-x$-szel:

$$f(x) = \frac{1-x}{(1+x+x^2)(1-x)} = \frac{1-x}{1-x^3}.$$

Felhasználva a geometriai sor összegfüggvényét, x helyébe x^3-öt írva

$$\frac{1}{1-x^3} = \sum_{n=0}^{\infty} x^{3n}, \qquad |x| < 1.$$

Ezért

$$f(x) = \frac{1}{1-x^3} - x\frac{1}{1-x^3} = \sum_{n=0}^{\infty} x^{3n} - \sum_{n=0}^{\infty} x^{3n+1} = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k,$$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

ahol

$$a_k = \begin{cases} 1 & \text{ha } k = 3n \\ -1 & \text{ha } k = 3n+1 \\ 0 & \text{ha } k = 3n+2 \end{cases}$$

7.105.

$$\cos^2 x = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cos 2x = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n \frac{(2x)^{2n}}{(2n)!} =$$
$$= 1 + \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n 2^{2n-1}\frac{x^{2n}}{(2n)!}, \qquad x \in \mathbb{R}.$$

7.111. A Lagrange-maradék segítségével becsüljük meg a függvényérték és egy Taylor-polinom eltérését.

Az $f(x) = \sin x$ függvény esetén valamilyen $d \in [0,1]$-re

$$|\sin 1 - T_{2n}(1)| = \left|\sin 1 - \sum_{k=0}^{n-1}(-1)^k \frac{1}{(2k+1)!}\right| =$$
$$= \frac{d^{2n+1}}{(2n+1)!} \le \frac{1}{(2n+1)!} < 10^{-2},$$

ha $n \ge 2$. Ezért

$$|\sin 1 - T_4(1)| = \left|\sin 1 - 1 + \frac{1}{3!}\right| = \left|\sin 1 - \frac{5}{6}\right| < 10^{-2}.$$

Az $f(x) = e^x$ függvény esetén valamilyen $d \in [0,1]$-re

$$\left|e^1 - T_n(1)\right| = e - T_n(1) = \frac{e^d d^{n+1}}{(n+1)!} \le \frac{e}{(n+1)!} < 10^{-2},$$

ha $n \ge 5$. Ezért

$$e - T_5(1) = e - \left(1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{24} + \frac{1}{120}\right) =$$
$$= e - \left(2 + \frac{43}{60}\right) \sim e - 2.716666667 < 10^{-2}$$

7.117. A keresett derivált az $f(x) = e^{x^2}$ függvény 0 körüli Taylor-sorában az x^{136} hatványhoz tartozó együttható és 136! szorzata.

$$f(x) = e^{x^2} = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}x^{2n}, \qquad f^{(136)}(0) = \frac{136!}{68!}$$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

7.120. $f'(x) = (\operatorname{tg} x)' = \dfrac{1}{\cos^2 x}$

$$f''(x) = (\operatorname{tg} x)'' = \left(\frac{1}{\cos^2 x}\right)' = 2\frac{\sin x}{\cos^3 x}$$

$$f'''(x) = (\operatorname{tg} x)''' = \left(2\frac{\sin x}{\cos^3 x}\right)' = 2\frac{\cos^4 x + 3\sin^2 x \cos^2 x}{\cos^6 x} =$$

$$= 2\frac{\cos^2 x + 3\sin^2 x}{\cos^4 x} = 2\frac{1 + 2\sin^2 x}{\cos^4 x}$$

Tehát $f(0) = 0$, $f'(0) = 1$, $f''(0) = 0$, $f'''(0) = 2$. Tehát a 3-adik Taylor-polinom

$$t_3(x) = x + \frac{x^3}{3}.$$

Mivel $\operatorname{tg} x$ páratlan függvény, ezért a negyedik deriváltja a 0-ban 0. Tehát a fenti polinom egyben a negyedik Taylor-polinom is, $t_3(x) = t_4(x)$.

7.125. **(a)** $\dfrac{1}{2+x} = \dfrac{1}{2}\dfrac{1}{1 - \dfrac{-x}{2}} = \displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{2^{n+1}} x^n, \qquad |x| < 2$

(b) $\dfrac{1}{2+x} = \dfrac{1}{3 + (x-1)} = \dfrac{1}{3}\dfrac{1}{1 - \dfrac{-(x-1)}{3}} =$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{3^{n+1}} (x-1)^n, \qquad |x-1| < 3$$

7.3 Trigonometrikus sorok, Fourier-sor

7.126. $\sin^2 x = \dfrac{1}{2} - \dfrac{1}{2}\cos 2x$

7.128. Mivel $\operatorname{sgn} x$ páratlan, ezért minden $a_n = 0$.

$$b_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} \operatorname{sgn} x \sin nx\, dx = \frac{2}{\pi}\int_{0}^{\pi} \sin nx\, dx = -\frac{2}{\pi n}\left[\cos nx\right]_0^{\pi} =$$

$$= \begin{cases} \dfrac{4}{\pi n} & \text{ha } n \text{ páratlan} \\ 0 & \text{ha } n \text{ páros} \end{cases}$$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

Mivel a $\operatorname{sgn} x$ függvény szakaszonként folytonosan deriválható és 0-ban az érték a két „féloldali” határérték számtani közepe, ezért a Fourier-sora előállítja a $(-\pi, \pi)$ intervallumon.

$$\operatorname{sgn} x = \frac{4}{\pi} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\sin(2k+1)x}{2k+1} \qquad \text{ha } -\pi < x < \pi.$$

7.134. **(a)** Ez a függvény páratlan függvény, azaz $f(-x) = -f(x)$, ezért minden $a_n = 0$.

$$\int_0^{2\pi} \frac{\pi - x}{2} \sin nx \, dx = \left[-\frac{\pi - x}{2} \cdot \frac{1}{n} \cos nx \right]_0^{2\pi} - \frac{1}{2n} \int_0^{2\pi} \cos nx \, dx =$$

$$= \left[\frac{x - \pi}{2n} \cos nx \right]_0^{2\pi} = \frac{\pi}{n}$$

Így tehát

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} \frac{\pi - x}{2} \sin nx \, dx = \frac{1}{n}.$$

Mivel az $f(x)$ függvény szakaszonként folytonosan deriválható, azért $(0, 2\pi)$-n, a folytonossági helyein a függvényt előállítja a Fourier-sora.

$$\frac{\pi - x}{2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n}, \qquad \text{ha } 0 < x < 2\pi.$$

(b) Az előző Fourier-sorfejtésben írjunk x helyébe $\frac{\pi}{2}$-t.

Mivel $\sin\left(k\frac{\pi}{2}\right) = \begin{cases} (-1)^n & \text{ha } k = 2n+1 \\ 0 & \text{ha } k = 2n \end{cases}$, ezért

$$\frac{\pi}{4} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{2n+1}.$$

7.135. (a) Mivel f páros függvény,

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 \sin nx \, dx = 0, \text{ azaz a } b_n\text{-ek mind nullák.}$$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

$$a_0 = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} x^2\,dx = \frac{1}{2\pi}\left[\frac{x^3}{3}\right]_{-\pi}^{\pi} = \frac{\pi^2}{3}$$

ha $n > 0$, kétszer parciálisan integrálva kapjuk, hogy

$$\int_{-\pi}^{\pi} x^2\cos nx\,dx = \left[\frac{1}{n}x^2\sin nx\right]_{-\pi}^{\pi} - \frac{2}{n}\int_{-\pi}^{\pi} x\sin x\,dx =$$

$$= \frac{2}{n^2}\left[x\cos nx\right]_{-\pi}^{\pi} - \frac{2}{n^2}\int_{-\pi}^{\pi}\cos nx\,dx = (-1)^n\frac{4\pi}{n^2} - \frac{2}{n^3}\left[\sin nx\right]_{-\pi}^{\pi} =$$

$$= (-1)^n\tfrac{4\pi}{n^2}.$$

Így tehát $n > 0$ esetén

$$a_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} x^2\cos nx\,dx = (-1)^n\frac{4}{n^2}.$$

Mivel $\sum\dfrac{1}{n^2}$ konvergens, ezért f Fourier-sora egyenletesen konvergens a Weierstrass-kritérium szerint, és mivel f folytonos, a Fourier-sora előállítja a függvényt.

$$x^2 = \frac{\pi^2}{3} + 4\cdot\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{\cos nx}{n^2}, \quad \text{ha } -\pi \le x \le \pi.$$

(b) Ha az előző Fourier-sorban x helyébe π-t írunk, és felhasználjuk, hogy $\cos n\pi = (-1)^n$ kapjuk, hogy

$$\pi^2 = \frac{\pi^2}{3} + 4\cdot\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}.$$

Átrendezés után pedig

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

7.142.

$$e^x = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx + b_n\sin nx)$$

Kétszer parciálisan integrálva kapjuk, hogy

$$\int e^x\cos nx\,dx = \frac{\cos nx + n\sin nx}{n^2+1}e^x + C,$$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

$$\int e^x \sin nx\,dx = \frac{\sin nx - n\cos nx}{n^2+1}e^x + C$$

Ezt felhasználva

$$a_0 = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} e^x\,dx = \frac{1}{2}\cdot\frac{e^\pi - e^{-\pi}}{\pi},$$

$$a_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} e^x\cos nx\,dx = (-1)^n\frac{1}{n^2+1}\cdot\frac{e^\pi - e^{-\pi}}{\pi},$$

$$b_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} e^x\sin nx\,dx = (-1)^{n+1}\frac{n}{n^2+1}\cdot\frac{e^\pi - e^{-\pi}}{\pi}$$

Behelyettesítés után

$$e^x = \frac{e^\pi - e^{-\pi}}{\pi}\left(\frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^2+1}(\cos nx - n\sin nx)\right), \qquad -\pi < x < \pi$$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó


Többváltozós függvények differenciálása

8.1 Topológiai alapfogalmak

8.2. $|\mathbf{p}-\mathbf{q}| = \sqrt{(-1-5)^2+(3-(-4))^2+(5-0)^2} = \sqrt{36+49+25} = \sqrt{110}$

8.5.
$k=1:\quad x^2 < r^2$
$k=2:\quad x^2+y^2 < r^2$
$k=3:\quad x^2+y^2+z^2 < r^2$
$k=n:\quad x_1^2+x_2^2+\cdots+x_n^2 < r^2$

8.8. Ez a halmaz az ábrán látható nyílt körgyűrű. Nyílt és korlátos halmaz,
határpontjai az $x^2+y^2=1$ és az $x^2+y^2=4$ körvonal pontjai.



8.14. $H=\{x: 0<x<1\}\subset\mathbb{R}$ nyílt (nyílt intervallum), mert ha $x\in H$, $r=\min\{x,1-x\}$, akkor $\{y:|x-y|<r\}\subset H$.

8.15. Ha $H=\{(x,0): 0<x<1\}\subset\mathbb{R}^2$, akkor $\partial H=\{(x,0): 0\le x\le 1\}$. A 8.1. tétel szerint H nem nyílt, mert $H\cap\partial H\neq\emptyset$, és nem zárt, mert $\partial H\not\subseteq H$.

8.22. Ha $H=\{(x,y): x\in\mathbb{Q}, y\in\mathbb{Q}\}\subset\mathbb{R}^2$, akkor $\partial H=\mathbb{R}^2$, és ezért a 8.1. tétel szerint H se nem nyílt, se nem zárt.

8.23. A $H=\{(x,y): 0<x<1, 0<y<1\}\subset\mathbb{R}^2$ halmaz nyílt (nyílt téglalap), mert $p=(x,y)\in H$, $r=\min\{x,1-x,y,1-y\}>0$ esetén

$$B(p;r)=\{q\in\mathbb{R}^2: |p-q|<r\}\subset H.$$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

8.29.

$$H = \{(x,y,z) : x^2+y^2+z^2 \le 1\}, \quad \operatorname{int} H = \{(x,y,z) : x^2+y^2+z^2 < 1\},$$

$$\operatorname{ext} H = \{(x,y,z) : x^2+y^2+z^2 > 1\}, \quad \partial H = \{(x,y,z) : x^2+y^2+z^2 = 1\}$$

8.32.

(a) Nem igaz, például $H = \{\mathbf{0}\}$, $x = \mathbf{0}$.

(b) Igaz, mert $\operatorname{int} H \subset H$.

(c) Nem igaz, például $H = \{\mathbf{0}\}$.

(d) Nem igaz, például $H = \{p \in \mathbb{R}^n : |p| < 1\}$, $x = (1,0,\dots,0)$.

(e) Igaz, például $H = \mathbb{Q}^n$.

(f) Igaz, például $H = \{p \in \mathbb{R}^n : |p| < 1\}$.

(g) Igaz, például $H = \{p \in \mathbb{R}^n : |p| = 1\}$.


8.2 Többváltozós függvények grafikonja

8.33. $f(\mathbf{p}) = f(2,3) = 2 + 3^2 = 11.$


8.38. $f(x,y) = x - y, \quad f(x,x) = 0, \quad f(x,x^2) = x - x^2.$

8.41. (a) — (B), (b) — (D), (c) — (C), (d) — (F), (e) — (A), (f) — (E)

8.43.



szintvonalak




grafikon


© Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

8.45.




szintvonalak




grafikon

8.47.



szintvonalak




grafikon


© Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

8.49.



szintvonalak



grafikon

8.61. $f(x,y)=\dfrac{x+y}{x-y}$, $\quad D_f=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 : x\neq y\}$.

8.3 Többváltozós határérték, folytonosság

8.67. $f(x,y)=7$, $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)=\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} 7=7$. A függvény mindenütt folytonos.

8.73. Az $f(x,y)=\dfrac{\sin x-\sin y}{e^x-e^y}$ függvény nincs értelmezve ha $x=y$, és így nincs értelmezve az origó egy pontozott környezetében. Az origóban ezért nincs határérték. Az $f(x,y)$ függvény folytonos az $\{(x,y) : x\neq y\}$ értelmezési tartomány minden pontjában.

8.79.

$$f(x,y)=\begin{cases} x, & \text{ha } x=y \\ 0, & \text{egyébként} \end{cases}$$

A függvény mindenütt folytonos, kivéve a $H=\{(x,x) : x\neq 0\}$ halmaz pontjait. Ezért $(0,0)$-ban is és $(0,1)$-ben is van határérték, mégpedig a helyettesítési érték:

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)=f(0,0)=0, \qquad \lim_{(x,y)\to(0,1)} f(x,y)=f(0,1)=0.$$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

8.4 Parciális és totális derivált

8.85. Legyen például $f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{2xy}{x^2+y^2} & \text{ha } x^2+y^2>0 \\ 0 & \text{ha } x^2+y^2>0 \end{cases}$.

Mivel $f(x,0) \equiv 0 \equiv f(0,y)$, ezért az origóban mindkét parciális derivált létezik és nulla. De mivel $f(x,x) \equiv 1 \neq 0$, ezért még határértéke sincs f-nek az origóban.

8.90. Ha $x \neq y^2$, akkor az $f(x,y) = \dfrac{x+y}{x-y^2}$ függvény (parciálisan) deriválható, és

$$f'_x(x,y) = \frac{(x-y^2)-(x+y)}{(x-y^2)^2} = -\frac{y^2+y}{(x-y^2)^2},$$

$$f'_y(x,y) = \frac{(x-y^2)+(x+y)\cdot 2y}{(x-y^2)^2} = \frac{x+y^2+2xy}{(x-y^2)^2}.$$

8.96. A $g(x,y,z) = x^{y^z}$ függvény értelmezési tartománya a $\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : x>0,\ y>0\}$ térnegyed. Ennek pontjaiban deriválható, és

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(x^{y^z}\right) = x^{(y^z-1)}\cdot y^z, \quad \frac{\partial}{\partial y}\left(x^{y^z}\right) = x^{y^z}\cdot \ln x \cdot z \cdot y^{z-1},$$

$$\frac{\partial}{\partial z}\left(x^{y^z}\right) = x^{y^z}\cdot \ln x \cdot \ln y \cdot y^z$$

8.102. Egyik parciális derivált sem létezik az origóban, mert az $f(x,0) = |x|$,illetve $f(0,y) = |y|$ egyváltozós függvények nem deriválhatók 0-ban.

8.108.

$$g(x,y,z) = 2 + x + y^2 + z^3,$$

$$g'_x(x,y,z) = 1, \quad g'_y(x,y,z) = 2y, \quad g'_z(x,y,z) = 3z^2, \quad g''_{xx}(x,y,z) = 0,$$

$$g''_{xy}(x,y,z) = g''_{yx}(x,y,z) = 0, \quad g''_{xz}(x,y,z) = g''_{zx}(x,y,z) = 0,$$

$$g''_{yy}(x,y,z) = 2, \quad g''_{yz}(x,y,z) = g''_{zy}(x,y,z) = 0,$$

$$g''_{zz}(x,y,z) = 6z$$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

8.112. A $\mathbf{v} = (-4, 3)$ vektor hossza $|\mathbf{v}| = 5$. Mivel az $f(x, y) = e^{x+y} \cdot \ln y$ függvény a $\mathbf{p} = (0, 1)$ pontban deriválható ezért ebben a pontban minden irányban deriválható (lásd a 8.5. tételt), és

$$\frac{\partial}{\partial \mathbf{v}} f(0,1) = \frac{1}{5}\left(-4\frac{\partial}{\partial x} f(0,1) + 3\frac{\partial}{\partial y} f(0,1)\right).$$

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(e^{x+y} \cdot \ln y\right) = e^{x+y} \cdot \ln y, \quad \frac{\partial}{\partial y}\left(e^{x+y} \cdot \ln y\right) = e^{x+y} \cdot \left(\ln y + \frac{1}{y}\right)$$

Behelyettesítés után $\dfrac{\partial}{\partial \mathbf{v}} f(0,1) = \dfrac{3e}{5}$.

8.119. Egy (sima) felület tetszőleges pontjában az iránymenti deriváltak abszolút értékben a gradiens irányában maximálisak (lásd a 8.5. tételt), és ezért a golyó ebben az irányban lefelé indul el.

$$f'_x(x, y) = 3x^2 - 9y, \quad f'_y(x, y) = 3y^2 - 9x$$

$$\operatorname{grad} f(1, 2) = (-15, 3), \quad \operatorname{grad} f(2, 1) = (3, -15),$$
$$\operatorname{grad} f(2, 0) = (12, -18), \quad \operatorname{grad} f(-2, 1) = (3, 21)$$

8.127.

$$f(x, y) = \begin{cases} xy\dfrac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}, & \text{ha } x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & \text{ha } x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$

Ha $x^2 + y^2 \neq 0$

$$f'_x(x, y) = y\frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} + xy\frac{2x(x^2 + y^2) - 2x(x^2 - y^2)}{(x^2 + y^2)^2} =$$
$$= y\frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} + xy\frac{4xy^2}{(x^2 + y^2)^2}$$
$$f'_y(x, y) = x\frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} + xy\frac{-2y(x^2 + y^2) - 2y(x^2 - y^2)}{(x^2 + y^2)^2} =$$
$$= x\frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} - xy\frac{4x^2y}{(x^2 + y^2)^2}$$

(a) $f(x, 0) = f(0, y) = 0, \quad f'_x(0, 0) = f'_y(0, 0) = 0$

(b) $f'_x(0, y) = -y, \quad f'_y(x, 0) = x$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

(c) $f''_{xy}(0,0) = -1, \quad f''_{yx}(0,0) = 1$

(d) Mert a másodrendű parciális deriváltak nem folytonosak az origóban.

(e) Belátjuk, hogy f nem deriválható kétszer, mert f'_x nem deriválható az origóban. Az eddigi eredményeket felhasználva

$$f'_x(0,0) = 0, \quad f''_{xx}(0,0) = 0, \quad f''_{xy}(0,0) = -1$$

$$\frac{f'_x(x,y) - \left[f''_{xx}(0,0)x + f''_{xy}(0,0)y + f'_x(0,0)\right]}{\sqrt{x^2+y^2}} = \frac{f'_x(x,y)+y}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

Megmutatjuk, hogy ez a kifejezés nem tart 0-hoz $(0,0)$-ban már az $y = x$ egyenes mentén sem.

$$\frac{f'_x(x,x)+x}{\sqrt{x^2+x^2}} = \frac{2x}{\sqrt{2}x} = \sqrt{2}$$

8.129. Igen, például az $f(x,y) = x \sin y$ megfelel.

8.131. Ha $x > 0$, akkor

$$\operatorname{grad} f(x,y) = (yx^{y-1}, x^y \ln x), \quad \operatorname{grad} f(2,3) = (12, 8\ln 2).$$

Az érintő sík egyenlete

$$z = 8 + 12(x-2) + 8\ln 2 \cdot (y-3).$$

8.134.

$$y = n! + \sum_{k=1}^{n} \frac{n!}{k}(x_k - k)$$

8.140. Itt $h = g \circ f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}, \quad h(u,v) = g(f(u,v)) = g(f_1(u,v), f_2(u,v))$ ahol

$$f_1(u,v) = u^2v^2, \quad f_2(u,v) = \frac{1}{uv}.$$

$$h'_u(u,v) = g'_x(f(u,v))(f_1)'_u(u,v) + g'_y(f(u,v))(f_2)'_u(u,v) =$$
$$= \frac{1}{u^2v^2} \cdot 2uv^2 + uv \cdot \left(-\frac{1}{u^2v}\right) = \frac{1}{u}$$
$$h'_v(u,v) = g'_x(f(u,v))(f_1)'_v(u,v) + g'_y(f(u,v))(f_2)'_v(u,v) =$$
$$= \frac{1}{u^2v^2} \cdot 2u^2v + uv \cdot \left(-\frac{1}{uv^2}\right) = \frac{1}{v}$$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

$$J = (h'_u(u,v), h'_v(u,v)) = \left(\frac{1}{u}, \frac{1}{v}\right)$$

Ellenőrizzük ezt az eredményt úgy, hogy kiszámoljuk a $h(u,v)$ függvényt, majd deriváljuk.

$$h(u,v) = \ln(u^2v^2) + \ln\left(\frac{1}{uv}\right) = 2\ln u + 2\ln v - \ln u - \ln v = \ln u + \ln v$$

8.146. Jelölje t az $\mathbf{r}$ síkgörbe változóját. $\mathbf{r}\,(t) = (x(t), y(t))$

$$h = f \circ \mathbf{r}\,, \quad h(t) = f(\mathbf{r}\,(t)) = x(t) + y(t),$$

$$h'(t) = h'(\mathbf{r}\,(t)) \cdot \mathbf{r}\,'(t) = x'(t) + y'(t)$$

8.5 Többváltozós szélsőérték

8.152. Az $f(x,y) = x^2 + e^y \sin\left(x^3y^2\right)$ függvény folytonos a kompakt (korlátos és zárt)

$$H = \{(x,y) : x^2 + y^2 \le 1\}$$

halmazon, ezért a Weierstrass-tétel szerint van abszolút maximuma és minimuma H-n.

8.157. Az $f(x,y) = x^3y^2(1-x-y)$ függvény mindenütt folytonos, a korlátos és zárt

$$H = \{(x,y) : 0 \le x, 0 \le y, x + y \le 1\}$$

halmazon (zárt háromszög) f nem negatív. A háromszög peremén (határán) $f(x,y) = 0$, a belsejében pedig $f(x,y) > 0$. Ezért az f függvény maximuma a háromszög belsejében van, és így ez lokális maximum is. Számoljuk ki az f függvény stacionárius pontjait, azaz a derivált gyökeit (8.7. tétel), ha $x, y > 0,\ x + y < 1$.

$$f'_x(x,y) = 3x^2y^2(1-x-y) - x^3y^2 = 0, \qquad 4x + 3y = 3$$

$$f'_y(x,y) = 2x^3y(1-x-y) - x^3y^2 = 0, \qquad 2x + 3y = 2$$

$$x = \frac{1}{2}, \qquad y = \frac{1}{3}$$

Mivel csak egy gyököt kaptunk, ezért ez a maximumhely.

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

8.163. Az $f(x,y)=3x^2+5y^2$ függvény sehol sem negatív, és az origót kivéve minden pontban szigorúan monoton a koordináta-tengelyek mentén, ezért egyetlen szélsőértéke az origóban van, mégpedig minimum. Ellenőrizzük ezt a tényt a derivált vizsgálatával (8.7. tétel).

$$f'_x(x,y)=6x=0, \qquad x=0$$

$$f'_y(x,y)=10y=0, \qquad y=0$$

Tehát az origó az egyetlen stacionárius pont.

8.169. Keressük meg az $f(x,y)=-y^2+\sin x$ függvény stacionárius pontjait.

$$f'_x(x,y)=\cos x=0, \qquad x=(2n+1)\frac{\pi}{2},\ n\in\mathbb{Z}$$

$$f'_y(x,y)=-2y=0, \qquad y=0$$

Tehát a függvény stacionárius pontjai az x-tengelyen a $\left\{\mathbf{p}_n=\left((2n+1)\frac{\pi}{2},0\right):\ n\in\mathbb{Z}\right\}$ pontok. Vizsgáljuk meg a megfelelő kvadratikus alakok definitségét (8.7. tétel).

$$f''_{xx}(x,y)=-\sin x, \quad f''_{xy}(x,y)=f''_{yx}(x,y)=0. \quad f''_{yy}(x,y)=-2$$

A Hesse-mátrixok ezekben a pontokban

$$H_n=\begin{pmatrix}(-1)^{n+1} & 0\\ 0 & -2\end{pmatrix}$$

A H_n mátrix determinánsa negatív ha n páratlan, ezért ezekben a pontokban nincs szélsőérték.

Ha n páros, akkor f-nek a $\mathbf{p}_n$-ben maximuma van, mert $f''_{xx}<0$ ezekben a pontokban.

8.176. Írjuk fel a két egyenes egy-egy tetszőleges pontjának a távolságát

$$d(\mathbf{p}(t),\mathbf{q}(s))=\sqrt{(2t-3s)^2+(t-s)^2+(2-t-2s)^2}, \qquad t,s\in\mathbb{R}.$$

A távolságok minimuma ugyanott van, ahol a távolságok négyzetének a minimuma. Keressük tehát az

$$f(t,s)=(2t-3s)^2+(t-s)^2+(2-t-2s)^2=6t^2-10ts+14s^2-4t-8s+4$$

kétváltozós függvény minimumát a síkon.

$$f'_t(t,s)=12t-10s-4=0, \qquad 6t-5s=2$$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

$$f'_s(t,s) = -10t + 28s - 8 = 0, \qquad -5t + 14s = 4$$
$$t = \frac{48}{59}, \qquad s = \frac{34}{59}, \qquad \min\{f(t,s) : t,s \in \mathbb{R}\} = \frac{4}{59}$$

Tehát a két egyenes távolsága $\frac{2}{\sqrt{59}}$.

8.182.

$$f(x,y) = (x+y)^2, \quad f'_x(x,y) = f'_y(x,y) = 2(x+y)$$

Tehát az $x+y=0$ egyenes összes pontja kritikus pont. Ezekben a pontokban a függvény értéke nulla, másutt pozitív, tehát f-nek minimuma van az $x+y=0$ pontjaiban. Megjegyezzük, hogy ezekben a pontokban nem tudunk dönteni a második parciális deriváltak segítségével, mert a kvadratikus alak szemidefinit:

$$f''_{xx} = f''_{xy} = f''_{yy} = 2, \qquad D = \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = 0.$$

8.190.

$$f(x,y,z) = xyz + x^2 + y^2 + z^2$$
$$f'_x(x,y,z) = yz + 2x = 0, \quad f'_y(x,y,z) = xz + 2y = 0,$$
$$f'_z(x,y,z) = xy + 2z = 0$$

Az egyenletek átalakítása után

$$xyz + 2x^2 = 0, \quad xyz + 2y^2 = 0, \quad xyz + 2z^2 = 0$$

Innen $x^2 = y^2 = z^2$. Könnyen látható, hogy ha az egyik változó nulla, akkor a másik kettő is. Az egyik kritikus pont tehát az

$$\mathbf{a} = (0,0,0) \text{ (origó)}.$$

A többi esetet nézve xyz negatív kell, hogy legyen, ezért vagy mindhárom negatív, és akkor

$$\mathbf{b} = (-2,-2,-2)$$

megoldás, vagy az egyik negatív, a másik kettő pozitív, és akkor a

$$\mathbf{c}_1 = (-2,2,2), \ \mathbf{c}_2 = (2,-2,2), \ \mathbf{c}_3 = (2,2,-2)$$

a további három kritikus pont. Mivel a függvény változóinak szerepe felcserélhető, ezért elég a három utolsó gyök közül az egyiket megvizsgálni.

$$f''_{xx} = 2, \quad f''_{xy} = f''_{yx} = z, \quad f''_{xz} = f''_{zx} = y, \quad f''_{yz} = f''_{zy} = x,$$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

$$f''_{yy} = 2, \quad f''_{zz} = 2$$

A Hesse-mátrix $\mathbf{a}$-ban

$$H_a = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Mivel a sarok-determinánsok pozitívak, ezért az origóban minimum van.

A Hesse-mátrix $\mathbf{b}$-ben

$$H_b = \begin{pmatrix} 2 & -2 & -2 \\ -2 & 2 & -2 \\ -2 & -2 & 2 \end{pmatrix}.$$

A kvadratikus alak indefinit, mivel van negatív (-2) és pozitív (4) sajátértéke is. Tehát a $\mathbf{q} = (-2, -2, -2)$ pontban nincs szélsőérték. Ezt beláthatjuk úgy is, hogy megmutatjuk, hogy a $\mathbf{q}$ ponthoz akármilyen közel az f felvesz $f(-2, -2, -2) = 4$-nél nagyobb és kisebb értéket is. Ugyanis a $g(x) = f(x, x, x) = x^3 + 3x^2$ függvénynek szigorú lokális maximuma van -2-ben, a $h(x) = f(x, -2, -2) = x^2 + 4x + 8$ függvénynek pedig szigorú minimuma.

Végül pedig például $\mathbf{c}_1$-ben nincs szélsőérték, mert a $g(x) = f(x, -x, -x) = x^3 + 3x^2$ függvénynek szigorú lokális maximuma van -2-ben, a $h(x) = f(x, 2, 2) = x^2 + 4x + 8$-nek pedig szigorú minimuma.

8.197. A Lagrange-multiplikátor módszer szerint keressük az

$$L(x, y) = 30 - \frac{x^2}{100} - \frac{y^2}{100} + \lambda(4x^2 + 9y^2 - 36)$$

kritikus pontjait a $4x^2 + 9y^2 = 36$ feltétel mellett.

$$L'_x(x.y) = -\frac{x}{50} + 8\lambda x = \left(8\lambda - \frac{1}{50}\right) x = 0$$

$$L'_y(x.y) = -\frac{y}{50} + 18\lambda y = \left(18\lambda - \frac{1}{50}\right) y = 0$$

$$4x^2 + 9y^2 = 36$$

A háromismeretlenes egyenletrendszer megoldásai

$$x_1 = 0, \quad y_1 = 2, \quad \lambda_1 = \frac{1}{18 \cdot 50}$$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

$$x_2 = 3, \quad y_2 = 0, \quad \lambda_2 = \frac{1}{8 \cdot 50}$$

Mivel a feltételt kielégítő pontok egy kompakt halmaz (zárt körvonal) pontjai, ezért itt F-nek van maximuma és minimuma is. Mivel a zárt körvonalnak nincs „pereme", ezért a szélsőértékek a fenti két pontban vannak, lokális szélsőértékek.

$$F(0,2) = 30 - \frac{4}{100}, \quad F(3,0) = 30 - \frac{9}{100}, \quad F(0,2) > f(3,0)$$

Tehát az ösvény legmagasabb pontja $(0,2)$ felett, legalacsonyabb pontja pedig $(3,0)$ felett van.

8.202. Mivel $f(x,y,z)$ minden változójában páratlan, ezért a minimum értékek a maximumok negáltjai. Elég tehát az xyz függvény maximumát keresni az

$$x > 0, \quad y > 0, \quad z > 0, \quad x^2 + y^2 + z^2 = 3$$

feltételek mellett. A mértani és a négyzetes közepek közötti egyenlőtlenséget használva

$$xyz \leq \left(\sqrt{\frac{x^2 + y^2 + z^2}{3}} \right)^3 = 1$$

és egyenlőség pontosan akkor van, ha $x = y = z$. De akkor $x = y = z = 1$.

8.208. Ha a tégla térfogata V, akkor tehát keressük a

$$F(x,y,z) = 2(xy + xz + yz)$$

függvény minimumát az

$$xyz = V, \quad x > 0, \quad y > 0, \quad z > 0$$

feltételek mellett. Ez nyilván ugyanott van ahol az $f(x,y,z) = xy + xz + yz$ függvénynek. A Lagrange-multiplikátor módszer szerint keressük az

$$L(x,y,z) = xy + xz + yz + \lambda(xyz - V)$$

függvény kritikus pontjait.

$$L'_x(x,y,z) = y + z + \lambda yz = 0$$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

$$L'_y(x,y,z) = x + z + \lambda xz = 0$$
$$L'_z(x,y,z) = x + y + \lambda xy = 0$$

Az első egyenletet yz-vel, a másodikat xz-vel, a harmadikat xy-nal osztva kapjuk, hogy

$$\frac{1}{z} + \frac{1}{y} = \frac{1}{z} + \frac{1}{x} = \frac{1}{y} + \frac{1}{x} = -\lambda,$$

ahonnan $x = y = z = \sqrt[3]{V}$.

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

Többváltozós Riemann-integrál

9.1 Jordan-mérték

9.1. $H = \{(x,y) : 0 \le x < 1, 0 < y \le 1\}, \quad t(h) = 1.$

9.2.

$$H = \{(x,y) : x \in \mathbb{Q}, y \in \mathbb{Q}, 0 \le x \le 1, 0 \le y \le 1\},$$
$$\operatorname{int} H = \emptyset, \quad \overline{H} = N = [0,1] \times [0,1].$$

Az 9.1. tétel szerint $b(H) = 0 \neq 1 = k(H)$, és így H nem Jordan-mérhető.

9.8. Lásd a 9.2. feladatot.

9.12. $H = \{(x,y,z) : x \in \mathbb{Q}, y \in \mathbb{Q}, z \in \mathbb{Q}, 0 \le x \le 1, 0 \le y \le 1, 0 \le z \le 1\}$
Hasonlóan a 9.2. feladathoz $b(H) = 0, \quad k(H) = 1.$

9.18. Nem, lásd a 9.2. feladatot.

9.24. Minden $n \in \mathbb{N}^+$ esetén a $K_n = \left\{\mathbf{p} \in \mathbb{R}^2 : |\mathbf{p}| = \frac{1}{n}\right\}$ körvonal null-mértékű. Megmutatjuk, hogy a $H = \bigcup_{n=1}^{\infty} K_n$ halmaz is mérhető és null-mértékű. Ehhez elég megmutatni, hogy H külső mértéke nulla. Legyen $\varepsilon > 0$ tetszőleges, $r > 0$ esetén $G_r = \left\{\mathbf{p} \in \mathbb{R}^2 : |\mathbf{p}| < r\right\}$ az origó középpontú r sugarú nyílt körlap,

$$H_r = G_r \cup \bigcup \left\{K_n : r \le \frac{1}{n}\right\}.$$

Ekkor H_r véges sok mérhető halmaz diszjunkt uniója, ezért mérhető. Mivel minden $r > 0$ esetén $H \subset H_r$, ezért

$$k(H) \le k(H_r) = t(H_r) = t(G_r) = \pi r^2 < \varepsilon,$$

ha r elég kicsi.

9.30. Felhasználjuk, hogy minden (nem elfajuló) tégla tartalmaz gömböt, és minden gömb tartalmaz (nem elfajuló) téglát. Legyen tehát $A \subset \mathbb{R}^n$ tetszőleges korlátos halmaz.

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

$b(A) = 0$ akkor és csak akkor, ha A nem tartalmaz téglát,
akkor és csak akkor, ha A nem tartalmaz gömböt,
akkor és csak akkor, ha $\operatorname{int}(A) = \emptyset$.

9.2 Többváltozós Riemann-integrál

9.34.

$$f(x,y) = \begin{cases} |x|, & \text{ha } y \in \mathbb{Q} \\ 0, & \text{ha } y \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

$$g(y) = \int_{-1}^{1} f(x,y)\,dx = 0, \qquad \int_0^1 \left(\int_{-1}^{1} f(x,y)\,dx \right) dy = \int_0^1 g(y)\,dy = 0.$$

Bontsuk ketté a H halmazt:
$H_1 = \{(x,y) \in H : x \le 0\}$ és
$H_2 = \{(x,y) \in H : x > 0\}$.
Ekkor H_1-en minden felső összeg nulla, és H_2-n minden felső összeg legalább $1/2$, és így

$$\overline{\int_H} f \ge \overline{\int_{H_1}} f + \overline{\int_{H_2}} f \ge \frac{1}{2}.$$

Mivel H-n minden alsó összeg nulla, ezért a Darboux-integrálok nem egyeznek meg,

$$\underline{\int_H} f = 0 < \frac{1}{2} \le \overline{\int_H} f,$$

tehát f nem integrálható H-n.

9.40. Legyen $A = \left\{(x,y) \in N : x \ge \frac{1}{2}\right\}$, $B = N \backslash A = \left\{(x,y) \in N : x < \frac{1}{2}\right\}$.
Mindkét halmaz mérhető (téglalapok), és rajtuk az

$$f(x,y) = \begin{cases} 1, & \text{ha } x \ge 1/2 \\ 2, & \text{ha } x < 1/2 \end{cases}$$

függvény konstans. Így tehát f integrálható N-en, és

$$\iint_N f(x,y)\,dx\,dy = \iint_A 1\,dx\,dy + \iint_B 2\,dx\,dy = \frac{1}{2} + 1 = \frac{3}{2}$$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

9.43. Mivel $f(x,y)$ nem korlátos, ezért nem integrálható. Másrészt minden vízszintes és függőleges egyenesen a függvény véges sok hely kivételével nulla.

Megjegyzés: Megadható korlátos példa is. Legyen ugyanis

$$H = \left\{(x,y) \in N : x,y \in \mathbb{Q}, x = \frac{p_x}{q}, y = \frac{p_y}{q}, (p_x,q) = (p_y,q) = 1\right\}.$$

Kissé pongyola módon, H azon racionális pontpárokból áll, amelyeknek „közös a nevezőjük” (egyszerűsítés után).

Legyen $f(x,y)$ a H halmaz karakterisztikus függvénye, azaz

$$f(x,y) = \chi_H(x,y) = \begin{cases} 1 & \text{ha } (x,y) \in H \\ 0 & \text{egyébként} \end{cases}.$$

9.46.

$$\iint\limits_N \sin(x+y)\,dx\,dy = \int\limits_0^1 \left(\int\limits_0^1 \sin(x+y)\,dx\right) dy =$$

$$= \int\limits_0^1 \left[-\cos(x+y)\right]_{x=0}^1 dy =$$

$$= \int\limits_0^1 (\cos y - \cos(1+y))\,dy = \left[\sin y - \sin(1+y)\right]_0^1 =$$

$$= 2\sin 1 - \sin 2$$

9.52.

$$\iint\limits_N e^{x+2y}\,dx\,dy = \left(\int\limits_0^1 e^x\,dx\right) \cdot \left(\int\limits_0^1 e^{2y}\,dy\right) = (e-1)\frac{e^2-1}{2}$$

9.58.

$$\iint\limits_T (x+y)\,dxdy = \int\limits_1^3 \left(\int\limits_0^1 (x+y)\,dx\right) dy = \int\limits_1^3 \left[\frac{x^2}{2} + xy\right]_{x=0}^1 dy =$$

$$= \int\limits_1^3 \left(\frac{1}{2} + y\right) dy = \left[\frac{y}{2} + \frac{y^2}{2}\right]_{y=1}^3 = 5$$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

9.60.

$$\iint\limits_T e^{x+y}\,dxdy = \left(\int\limits_0^1 e^x\,dx\right)\cdot\left(\int\limits_0^1 e^y\,dy\right) = \left(\int\limits_0^1 e^x\,dx\right)^2 =$$
$$= \left([e^x]_0^1\right)^2 = (e-1)^2$$

9.69. Alkalmazzuk a körlapokra vonatkozó transzformációs képletet:

$$\iint\limits_T xy\,dxdy = \int\limits_0^2 \left(\int\limits_0^{2\pi} r(r\cos\varphi+1)(r\sin\varphi-1)d\varphi\right)dr =$$
$$= \int\limits_0^2 \left(\int\limits_0^{2\pi}\left(\frac{r^3\sin(2\varphi)}{2} + r^2(\sin\varphi-\cos\varphi) - r\right)d\varphi\right)dr =$$
$$= \left(\int\limits_0^2 \frac{r^3}{2}\,dr\right)\left(\int\limits_0^{2\pi}\sin(2\varphi)\,d\varphi\right) +$$
$$+ \left(\int\limits_0^2 r^2\,dr\right)\left(\int\limits_0^{2\pi}(\sin\varphi-\cos\varphi)\,d\varphi\right) -$$
$$- \left(\int\limits_0^2 r\,dr\right)\left(\int\limits_0^{2\pi} 1\,d\varphi\right) =$$
$$= -\left(\int\limits_0^2 r\,dr\right)\left(\int\limits_0^{2\pi} 1\,d\varphi\right) = -4\pi$$

Felhasználtuk, hogy a $\sin(2\varphi)$ és a $(\sin\varphi-\cos\varphi)$ függvények primitív függvényei 2π szerint periodikusak, ezért megváltozásuk a $[0,2\pi]$ intervallumon 0.

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

9.74.

$$\iiint_T (x+y+z)\,dx\,dy\,dz = \int_0^3 \left(\int_0^2 \left(\int_0^1 (x+y+z)\,dx \right) dy \right) dz =$$

$$= \int_0^3 \left(\int_0^2 \left[\frac{x^2}{2} + xy + xz \right]_{x=0}^1 dy \right) dz =$$

$$= \int_0^3 \left(\int_0^2 \left(\frac{1}{2} + y + z \right) dy \right) dz =$$

$$= \int_0^3 \left[\frac{y}{2} + \frac{y^2}{2} + yz \right]_{y=0}^2 dz = \int_0^3 (3+2z)\,dz = \left[3z + z^2 \right]_0^3 = 18$$

9.82. Jelölje H az $y = x^2$, $y = 2x^2$, $xy = 1$, $xy = 2$ görbék által határolt síkidomot. Tekintsük azt a

$$\Psi : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2, \quad \Psi(u,v) = (x(u,v), y(u,v))$$

transzformációt, amelyet az

$$y = ux^2, \qquad xy = v$$

egyenletrendszer határoz meg, azaz

$$x = u^{-1/3}v^{1/3}, \qquad y = u^{1/3}v^{2/3}.$$



A H síkidom

Erre a Ψ transzformációra teljesülnek az integráltranszformációról szóló tétel feltételei. A H halmaz a $T = [1,2] \times [1,2]$ négyzet transzformáltja, $H = \Psi(T)$. Számoljuk ki a Ψ Jacobi-determinánsát.

$$\Psi'(u,v) = \begin{pmatrix} -\frac{1}{3}u^{-4/3}v^{1/3} & \frac{1}{3}u^{-1/3}v^{-2/3} \\ \frac{1}{3}u^{-2/3}v^{2/3} & \frac{2}{3}u^{1/3}v^{-1/3} \end{pmatrix}, \quad J = -\frac{1}{3u}, \quad |J| = \frac{1}{3u}$$


$$t(H) = \iint_H dx\,dy = \iint_T \frac{1}{3u}\,du\,dv = \frac{1}{3}\left(\int_1^2 \frac{1}{u}\,du \right)\left(\int_1^2 dv \right) = \frac{\ln 2}{3}$$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

9.88. $f(x,y) = 1 - \dfrac{x^2}{2} - \dfrac{y^2}{2}$, $H = [0,1] \times [0,1]$,
$N = \{(x,y,z) : (x,y) \in H, 0 \le z \le f(x,y)\}$


$$t(N) = \iiint_N dx\,dy\,dz =$$
$$= \iint_H \left(\int_0^{f(x,y)} dz \right) dx\,dy =$$
$$= \iint_H \left(1 - \frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2}\right) dx\,dy =$$
$$= \int_0^1 \left(\int_0^1 \left(1 - \frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2}\right) dx \right) dy =$$
$$= \int_0^1 \left(\frac{5}{6} - \frac{y^2}{2}\right) dy = \frac{2}{3}$$



$\mathbf{1 - \dfrac{x^2}{2} - \dfrac{y^2}{2}}$ **alatti test.**

9.94. $H = \left\{(x,y,z) : x^2 + y^2 \le 1, 0 \le z \le 1 - x^2 - y^2\right\}$.

$$t(H) = \iiint_H dx\,dy\,dz =$$
$$= \iint_{x^2+y^2\le 1} \left(\int_0^{1-x^2-y^2} dz \right) dx\,dy =$$
$$= \iint_{x^2+y^2\le 1} \left(1 - x^2 - y^2\right) dx\,dy =$$
$$= \int_0^1 \left(\int_0^{2\pi} r(1 - r^2)\, d\varphi \right) dr =$$
$$= 2\pi \left[\frac{r^2}{2} - \frac{r^3}{3}\right]_0^1 = \frac{\pi}{3}$$



$\mathbf{1 - x^2 - y^2}$ **alatti test.**

© Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

9.100. $\varrho(x,y)=x^2, \quad H=[0,1]\times[0,1]$

$$M=\iint\limits_H \varrho(x,y)\,dx\,dy=\int\limits_0^1\left(\int\limits_0^1 x^2\,dx\right)dy=\frac{1}{3}$$

$$S_x=3\int\limits_0^1\left(\int\limits_0^1 x^3\,dx\right)dy=\frac{3}{4}, \qquad S_y=3\int\limits_0^1\left(\int\limits_0^1 x^2y\,dx\right)dy=\frac{1}{2}$$

9.106. Az $y=0$, $x=2$, $y=1, y=x$ egyenesek által határolt H síkidom egy trapéz, amelyik egy normáltartomány az y-tengely mentén.

$$H=\{(x,y): 0\le y\le 1, y\le x\le 2\}$$

Ha $\varrho(x,y)=y$, akkor

$$M=\iint\limits_H y\,dx\,dy=\int\limits_0^1\left(\int\limits_y^2 y\,dx\right)dy=\int\limits_0^1 y(2-y)\,dy=\frac{2}{3}$$

$$S_x=\frac{3}{2}\iint\limits_H xy\,dx\,dy=\frac{3}{2}\int\limits_0^1\left(\int\limits_y^2 xy\,dx\right)dy=$$

$$=\frac{3}{2}\int\limits_0^1 y\left(2-\frac{y^2}{2}\right)dy=\frac{3}{2}\cdot\frac{7}{8}=\frac{21}{16}$$

$$S_y=\frac{3}{2}\iint\limits_H y^2\,dx\,dy=\frac{3}{2}\int\limits_0^1\left(\int\limits_y^2 y^2\,dx\right)dy=$$

$$=\frac{3}{2}\int\limits_0^1 y^2\,(2-y)\,dy=\frac{3}{2}\left(\frac{2}{3}-\frac{1}{4}\right)=\frac{5}{8}$$


www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

Vonalintegrál és primitív függvény


10.1 Sík és térgörbék

10.1.



$$\mathbf{r} = t \cdot \mathbf{i} + t^2 \cdot \mathbf{j}$$
$$t \in [0, 4]$$

10.7.




$$\mathbf{r} = \cos t \cdot \mathbf{i} + \sin t \cdot \mathbf{j}$$
$$t \in [0, 2\pi]$$

© Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán


© Typotex Kiadó

10.13.



$$\mathbf{r} = t\cos t\cdot\mathbf{i} + \sin t\cdot\mathbf{j}$$
$$t\in[0,6\pi]$$

10.19.



$$\mathbf{r} = 2\sin t\cdot\mathbf{i} - t^2\cdot\mathbf{j} + \cos t\cdot\mathbf{k}$$
$$t\in[2,6\pi]$$

10.25. A $x^2 - xy^3 + y^5 = 17$ síkgörbe a $P(5,2)$ pont körül meghatároz egy implicit $y(x)$ függvényt. Ennek a függvénynek keressük az érintőegyenesét a P pontban. Az implicit egyenlet deriválásával megkapjuk az érintő meredekségét:

$$2x - y^3 - 3xy^2y' + 5y^4y' = 0, \qquad y' = \frac{y^3-2x}{5y^4-3xy^2} = \frac{8-10}{80-60} = -\frac{1}{10}.$$

Így tehát az érintő egyenlete a $P(5,2)$ pontban

$$y = -\frac{1}{10}(x-5)+2, \text{ vagy normál alakban } x+10y = 25.$$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

10.27. Számoljuk ki az érintőegyenes $\mathbf{v}$ irányvektorát, azaz a görbe deriváltvektorát a $t = 2$ paraméterérték esetén:

$$\mathbf{r}(t) = (t-3)\mathbf{i} + (t^2+1)\mathbf{j} + t^2\mathbf{k}$$
$$\dot{\mathbf{r}}(t) = \mathbf{i} + 2t\mathbf{j} + 2t\mathbf{k}$$

Az irányvektor: $\mathbf{v} = \dot{\mathbf{r}}(2) = \mathbf{i} + 4\mathbf{j} + 4\mathbf{k}$.

Az érintési pont: $\mathbf{r}_0 = \mathbf{r}(2) = -\mathbf{i} + 5\mathbf{j} + 4\mathbf{k}$.

Az érintő irányvektoros alakja:

$$\mathbf{r}_0 + \mathbf{v}\,t = (t-1)\mathbf{i} + (4t+5)\mathbf{j} + (4t+4)\mathbf{k}.$$

10.29. Az 10.2. képletek szerint a ciklois ívhossza

$$L = \int_0^{2\pi} \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}\,dt = \int_0^{2\pi} \sqrt{r^2(1-\cos t)^2 + r^2\sin^2 t}\,dt =$$
$$= r\int_0^{2\pi} \sqrt{2-2\cos t}\,dt = r\int_0^{2\pi} \sqrt{4\sin^2\frac{t}{2}}\,dt =$$
$$= 2r\int_0^{2\pi} \sin\frac{t}{2}\,dt = 4r\left[-\cos\frac{t}{2}\right]_0^{2\pi} = 8r.$$

10.2 Skalár-, és vektormezők, differenciáloperátorok

10.35. Legyen például

$$f(x,y) = \cos(2\pi x)\cdot\mathbf{i} + \sin(2\pi x)\cdot\mathbf{j},$$
$$(x,y) \in H = \{(x,y) : 0 < x \le 1, y = 0\}.$$

Ekkor $R_f = K = \{(x,y) : x^2 + y^2 = 1\}$.

10.39. $f(x,y) = x^4 - 6x^2y^2 + y^4$,

$$\operatorname{grad} f = \frac{\partial}{\partial x}f\cdot\mathbf{i} + \frac{\partial}{\partial y}f\cdot\mathbf{j} = (4x^3 - 12xy^2)\cdot\mathbf{i} + (4y^3 - 12x^2y)\cdot\mathbf{j}$$

10.43. $f(x,y,z) = x + xy^2 + x^2z^3, \quad \mathbf{p} = (2,-1,1)$

$$\operatorname{grad} f(x,y,z) = (1 + y^2 + 2xz^3)\cdot\mathbf{i} + 2xy\cdot\mathbf{j} + 3x^2z^2\cdot\mathbf{k}$$
$$\operatorname{grad} f(2,-1,1) = 6\mathbf{i} - 4\mathbf{j} + 12\mathbf{k}$$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

10.47.

$$\operatorname{grad} U(\mathbf{r}) = \nabla U(\mathbf{r}) = \nabla\left(\mathbf{r}^2 + \frac{1}{\mathbf{r}^2}\right) = 2\left(1 - \frac{1}{\mathbf{r}^4}\right)\mathbf{r}$$

10.50. A $z = f(x,y) = x^2 + y^2$ függvény grafikonjának érintősíkja az $x = 1$, $y = 2$ pont felett

$$z = f(x_0,y_0)+f'_x(x_0,y_0)(x-x_0)+f'_y(x_0,y_0)(y-y_0) = 5+2(x-1)+4(y-2)$$

10.51.

$$\mathbf{r} = u\cos v\cdot\mathbf{i} + u\sin v\cdot\mathbf{j} + u\cdot\mathbf{k}, \qquad A = [0,1]\times[0,\pi]$$

$$\mathbf{r}'_u = \cos v\cdot\mathbf{i} + \sin v\cdot\mathbf{j} + \mathbf{k}, \qquad \mathbf{r}'_v = -u\sin v\cdot\mathbf{i} + u\cos v\cdot\mathbf{j}$$

$$\mathbf{r}'_u\times\mathbf{r}'_v = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \cos v & \sin v & 1 \\ -u\sin v & u\cos v & 0 \end{vmatrix} = -u\cos v\cdot\mathbf{i} - u\sin v\cdot\mathbf{j} + u\cdot\mathbf{k}$$

$$|\mathbf{r}'_u\times\mathbf{r}'_v| = \sqrt{u^2\cos^2 v + u^2\sin^2 v + u^2} = u\sqrt{2}$$

A felszín kiszámolásáról szóló tétel szerint

$$S = \iint\limits_A |\mathbf{r}'_u\times\mathbf{r}'_v|\,du\,dv = \sqrt{2}\int\limits_0^\pi\left(\int\limits_0^1 u\,du\right)dv = \frac{\sqrt{2}}{2}\pi.$$

10.3 Vonalintegrál

10.55. A vonalintegrál kiszámolásáról szóló tétel szerint

$$\int\limits_\Gamma (x+y)\,dx + (x-y)\,dy =$$

$$= \int\limits_0^\pi [(\cos t+\sin t)(-\sin t) + (\cos t-\sin t)\cos t]\,dt =$$

$$= \int\limits_0^\pi (\cos 2t - \sin 2t)\,dt = \left[\frac{\sin 2t}{2} + \frac{\cos 2t}{2}\right]_0^\pi = 0$$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

Megjegyzés:

Mivel a $\mathbf{v} = (x+y)\cdot\mathbf{i} + (x-y)\cdot\mathbf{j}$ vektormező egy primitív függvénye $U(x,y) = \frac{x^2}{2} + xy - \frac{y^2}{2}$, ezért a konzervatív erőtér integrálja a primitív függvény megváltozása:

$$\int_\Gamma \mathbf{v}\, d\mathbf{r} = U(-1,0) - U(1,0) = 0$$

10.61. A Γ_1 görbe egy parametrizálása $x = t,\ y = t$, a Γ_2 görbének pedig $x = t,\ y = t^2$, ahol $0 \le t \le 1$. A $\mathbf{v} = y\cdot\mathbf{i} + x\cdot\mathbf{j}$ vektormező integráljai

$$\int_{\Gamma_1} y\,dx + x\,dy = \int_0^1 2t\,dt = 1, \qquad \int_{\Gamma_2} y\,dx + x\,dy = \int_0^1 3t^2\,dt = 1.$$

Megjegyzés:

A $\mathbf{v} = y\cdot\mathbf{i} + x\cdot\mathbf{j}$ vektormező konzervatív $U(x,y) = xy$ primitív függvénnyel.

10.67. A vonalintegrál nem létezik, mert $\mathbf{v}$ nincs értelmezve az origóban, a Γ görbe pedig átmegy az origón.

10.70.

$$\begin{aligned}
&\int_\Gamma (x+y)\,dx + (y+z)\,dy + (z+x)\,dz = \\
&= \int_0^\pi \left[(\cos t + \sin t)(-\sin t) + (\sin t + t)\cos t + (t + \cos t)\right] dt = \\
&= \int_0^\pi (-\sin^2 t + t\cos t + t + \cos t)\,dt = \\
&= \left[-\frac{t}{2} + \frac{\cos 2t}{4} + t\sin t + \cos t + \frac{t^2}{2} + \sin t\right]_0^\pi = \\
&= -\frac{\pi}{2} + 0 + 0 - 2 + \frac{\pi^2}{2} + 0 = \frac{\pi^2}{2} - \frac{\pi}{2} - 2
\end{aligned}$$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

10.77. A Γ görbe paraméteres alakja:

$$\mathbf{r}\,(t) = t \cdot \mathbf{i} + t^2 \cdot \mathbf{j}\,, \quad -1 \le t \le 1$$

azaz

$$x = t,\ y = t^2, \qquad dx = \dot{x}(t) = 1,\ dy = \dot{y}(t) = 2t, \quad -1 \le t \le 1.$$

A vonalintegrál kiszámolásáról szóló képlet szerint

$$\int_\Gamma (x^2 - 2xy)\,dx + (y^2 - 2xy)\,dy =$$

$$= \int_{-1}^{1} \left[(t^2 - 2t^3) \cdot 1 + (t^4 - 2t^3) \cdot 2t\right]\,dt =$$

$$= \int_{-1}^{1} (t^2 - 2t^3 - 4t^4 + 2t^5)\,dt = \left[\frac{t^3}{3} - \frac{2t^4}{4} - \frac{4t^5}{5} + \frac{2t^6}{6}\right]_{t=-1}^{1} =$$

$$= \frac{2}{3} - \frac{8}{5} = -\frac{14}{15}$$

10.78. Az ellipszis természetes paraméterezéseként válasszuk az

$$x = a\cos t,\ y = b\sin t, \quad 0 \le t \le 2\pi$$

paraméterezést. Ekkor dx, illetve dy helyébe

$$dx = -a\sin t,\ dy = b\cos t$$

kerül. Így az integrál visszavezethető egyváltozós Riemann-integrálra:

$$\oint_\Gamma (x + y)\,dx + (x - y)\,dy =$$

$$= \int_0^{2\pi} [-a(a\cos t + b\sin t)\sin t + b(a\cos t - b\sin t)\cos t]\,dt =$$

$$= \int_0^{2\pi} (-ab\sin^2 t + ab\cos^2 t - a^2\sin t\cos t - b^2\sin t\cos t)\,dt =$$

$$= \int_0^{2\pi} (ab\cos 2t - \frac{a^2 + b^2}{2}\sin 2t)\,dt = 0$$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

Megjegyzés:

Könnyen látható, hogy az $U(x,y)=\dfrac{x^2}{2}+xy-\dfrac{y^2}{2}$ függvény primitív függvénye az integrandusnak, ezért a körintegrál értéke 0.

10.84. Igen, a $\mathbf{v}=(x+y)\cdot\mathbf{i}+(x-y)\cdot\mathbf{j}$ vektormező primitív függvényei:

$$U(x,y)=\frac{x^2}{2}+xy-\frac{y^2}{2}+C.$$

10.90. Nincs primitív függvény, mivel a keresztbe vett deriváltak nem egyeznek meg:

$$\frac{\partial}{\partial y}(\cos xy)=-x\sin xy\neq\frac{\partial}{\partial x}(\sin xy)=y\cos xy$$

10.95. A $\mathbf{v}=\dfrac{y}{x^2+y^2}\cdot\mathbf{i}-\dfrac{x}{x^2+y^2}\cdot\mathbf{j}$ vektormező keresztbe vett deriváltjai megegyeznek:

$$\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{y}{x^2+y^2}\right)=\frac{x^2-y^2}{(x^2+y^2)^2},\qquad\frac{\partial}{\partial x}\left(-\frac{x}{x^2+y^2}\right)=\frac{x^2-y^2}{(x^2+y^2)^2}.$$

Mégsincs primitív függvény, mert ha $\Gamma: x=\cos t,\ y=\sin t,\ 0\le t\le 2\pi$ a zárt egység-körvonal, akkor

$$\oint_\Gamma \frac{y}{x^2+y^2}\,dx-\frac{x}{x^2+y^2}\,dy=\int_0^{2\pi}(-\sin^2 t-\cos^2 t)\,dt=-2\pi\neq 0.$$

A problémát az okozza, hogy $\mathbf{v}$ nincs értelmezve az origóban, a Γ görbe pedig megkerüli az origót.

10.101. Az $\mathbf{E}=(y+x)\cdot\mathbf{i}+x\cdot\mathbf{j}$ erőtér konzervatív, primitív függvénye

$$U(x,y)=\frac{x^2}{2}+xy,\ \text{potenciálja}\ \Phi(x,y)=-U(x,y)=-\frac{x^2}{2}-xy.$$

10.107. Mivel nincs értelmezve az origóban, ezért nincs potenciálfüggvénye az egész síkon. Viszont a pontozott síkon, $\mathbb{R}^2\setminus\{\mathbf{0}\}$-n már van:

$$\Phi(x,y)=\frac{1}{(x^2+y^2)^{1/2}}.$$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

10.108. A $\mathbf{v} = yz \cdot \mathbf{i} + xz \cdot \mathbf{j} + xy \cdot \mathbf{k}$ vektormező rotációja nulla a tér minden pontjában,

$$\frac{\partial}{\partial y}(yz) = \frac{\partial}{\partial x}(xz) = z,\ \frac{\partial}{\partial z}(yz) = \frac{\partial}{\partial x}(xy) = y,\ \frac{\partial}{\partial z}(xz) = \frac{\partial}{\partial y}(xy) = x,$$

ezért van primitív függvénye, $U(x, y, z)$. Mivel $U'_x = yz$, ezért

$$U(x, y, z) = \int yz\, dx = xyz + f(y, z).$$

$$U'_y = \frac{\partial}{\partial y}(xyz + f(y, z)) = xz + f'_y(y, z) = xz.$$

Innen $f'_y(y, z) = 0$, azaz $f(y, z)$ nem függ y-tól, $f(y, z) = g(z)$.

$$U'_z = \frac{\partial}{\partial z}(xyz + g(z)) = xy + g'(z) = xy,$$

és így $g'(z) = 0$, azaz a g függvény konstans. Tehát $U(x, y, z) = xyz + C$, ahol C tetszőleges konstans lehet.

Persze az xyz primitív függvényt minden számolás nélkül is elég könnyű megtalálni.

10.113. A $\mathbf{v} = 3xy^3z^4 \cdot \mathbf{i} + 3x^2y^2z^4 \cdot \mathbf{j} + x^2y^3z^3 \cdot \mathbf{k}$ vektormezőnek nincs primitív függvénye, mivel például

$$\frac{\partial}{\partial y}(3xy^3z^4) = 9xy^2z^4 \neq \frac{\partial}{\partial x}(3x^2y^2z^4) = 6xy^2z^4.$$

10.118. Keressünk egy olyan $z(x, y)$ kétváltozós függvényt, amelyre

$$z'_x(x, y) = p(x, y) = x^2 + 2xy - y^2, \quad z'_y(x, y) = q(x, y) = x^2 - 2xy - y^2$$

$$z(x, y) = \int p(x, y)\, dx = \int (x^2 + 2xy - y^2)\, dx = \frac{x^3}{3} + x^2y - xy^2 + g(y)$$

Itt $g(y)$ egyelőre ismeretlen (deriválható) függvénye y-nak. Erre a $z(x, y)$ függvényre teljesülnie kell, hogy

$$z'_y(x, y) = x^2 - 2xy + g'(y) = q(x, y) = x^2 - 2xy - y^2.$$

Ebből az egyenletből

$$g'(y) = -y^2, \text{ ezért } g(y) = -\frac{y^3}{3} + C.$$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

Így tehát az összes primitív függvény

$$z(x,y) = \frac{x^3}{3} + x^2y - xy^2 - \frac{y^3}{3} + C.$$

10.123.

$$u'_x(x,y,z) = \frac{x+y}{x^2+y^2+z^2+2xy},$$

$$u(x,y,z) = \int \frac{x+y}{x^2+y^2+z^2+2xy}\,dx = \\ = \frac{1}{2}\ln\left|x^2+y^2+z^2+2xy\right| + f(y,z)$$

$$u'_y(x,y,z) = \frac{x+y}{x^2+y^2+z^2+2xy} + f'_y(y,z) = \frac{x+y}{x^2+y^2+z^2+2xy},$$

tehát $f(y,z) = g(z)$.

$$u'_z(x,y,z) = \frac{z}{x^2+y^2+z^2+2xy} + g'(z) = \frac{z}{x^2+y^2+z^2+2xy},$$

ezért $g'(z) = 0$, g konstans.

$$u(x,y,z) = \frac{1}{2}\ln\left|x^2+y^2+z^2+2xy\right| + C$$

az összes primitív függvény.

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

Komplex függvények

11.3. $z^2 = (x^2 - y^2) + 2xyi$, tehát $u_x = v_y = 2x$ és $v_x = -u_y = 2y$.

11.6.

$$\frac{1}{z^2+1} = \frac{1}{x^2-y^2+1+2xyi} = \frac{x^2-y^2+1-2xyi}{(x^2-y^2+1)^2+4x^2y^2} = \\ = \frac{x^2-y^2+1-2xyi}{(x^2-y^2+1)^2+4x^2y^2}.$$

$$u(x,y) = \frac{x^2-y^2+1}{(x^2-y^2+1)^2+4x^2y^2}, \quad v(x,y) = -\frac{2xy}{(x^2-y^2+1)^2+4x^2y^2}$$

A parciális deriváltak kiszámolása után látható, hogy teljesülnek a Cauchy-Riemann differenciálegyenletek, ha $z^2+1 \neq 0$.

11.7.

$$\operatorname{Re} f(z) = u(x,y) = \sqrt{|xy|}, \qquad \operatorname{Im} f(z) = v(x,y) = 0$$

Mivel $u(x,0) = 0 = v(0,y)$ és $u(0,y) = 0 = v(x,0)$, ezért $u'_x(0,0) = 0 = v'_y(0,0)$ és $u'_y(0,0) = 0 = v'_x(0,0)$, ezért $u_x(0,0) = u_y(0,0) = 0$, tehát a Cauchy-Riemann differenciálegyenletek teljesülnek $z = 0$-ban. Ugyanakkor az $y = x$ egyenes mentén $f(z) = (|x|)^2$, tehát az $f(z)$ függvény az origóban nem differenciálható.

11.8.

$$u(x,y) = 2x^2 + 3y^2 + xy + 2x, \qquad v(x,y) = 4xy + 5y.$$

A Cauchy-Riemann differenciálegyenletek szerint

$$4x + y + 2 = 4x + 5, \text{ és } 6y + x = -4y$$

minden olyan pontban, ahol f deriválható. Az egyenletrendszer csak $x = -30,\ y = 3$ esetén teljesül, tehát a függvény máshol nem differenciálható.

11.9.

$$\frac{\partial}{\partial x}(xy) = y, \qquad \frac{\partial}{\partial y}(y) = 1, \qquad \frac{\partial}{\partial y}(xy) = x, \qquad \frac{\partial}{\partial x}(y) = 0$$

Ezért a Cauchy-Riemann differenciálegyenletek csak a $z = i$ pontban teljesülnek.

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

11.10. Írjuk fel a Cauchy-Riemann differenciálegyenleteket:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 4x = 2y = \frac{\partial v}{\partial y}$$

pontosan akkor, ha $y = 2x$, továbbá

$$\frac{\partial u}{\partial y} = -1 = -2x = -\frac{\partial v}{\partial x}$$

pontosan akkor, ha $x = \frac{1}{2}$. Ezért a függvény egyedül az $\frac{1}{2} + i$ pontban differenciálható.

11.11. A Cauchy-Riemann differenciálegyenleteknek teljesülniük kell, ezért

$$v'_y(x,y) = u'_x(x,y) = 2x+y, \quad v(x,y) = \int (2x+y)\,dy = 2xy + \frac{y^2}{2} + g(x)$$

$$v'_x(x,y) = 2y + g'(x) = -u'_y(x,y) = 2y - x,$$

$$g'(x) = -x, \qquad g(x) = -\frac{x^2}{2} + C$$

$$f(z) = (x^2 - y^2 + xy) + i\left(2xy - \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2} + C\right)$$

Mivel $f(0) = 0$, ezért $C = 0$

$$f(z) = (x^2 - y^2 + xy) + i\left(2xy - \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2}\right)$$

11.13. $R = 1$

11.14. $R = \frac{1}{2}$

11.15. $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{n^2} = 1$, így $R = 1$

11.20. A gyökkritérium felhasználásával:

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{\left|\left(\frac{in}{n+1}\right)^{n^2}\right|} = \lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{-n} = \frac{1}{e}, \text{ így } R = e.$$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

11.21. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} z^n = \frac{z}{1-z}, \quad R=1$

11.22. A gyökkritérium felhasználásával: $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{|i^n|} = 1$, így $R=1$.

$$\sum_{n=0}^{\infty} i^n z^n = \sum_{n=0}^{\infty} (iz)^n = \frac{1}{1-iz}$$

11.23. $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)z^n = \left(\frac{1}{1-z}\right)' = \frac{1}{(1-z)^2}, \quad R=1$

11.24. $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}(n+2)(n+1)z^n = \left(\frac{1}{1-z}\right)'' = \frac{2}{(1-z)^3}, \quad R=1$

11.29. Használjuk fel az $e^{x+iy} = e^x \cdot e^{iy} = e^x \cdot (\cos y + i \sin y)$ összefüggést!

11.31. $\displaystyle\int_\Gamma f(x+iy)\,dz = i\pi$ **11.32.** $\displaystyle\int_\Gamma f(x+iy)\,dz = -\pi$

11.33. $\displaystyle\int_\Gamma f(x+iy)\,dz = 2i\pi$ **11.34.** $\displaystyle\int_\Gamma f(x+iy)\,dz = 0$

11.35. Paraméterezzük a görbét: $z(t) = e^{it}, t \in [0, 2\pi]$. Ekkor $\dfrac{dz}{dt} = ie^{it}$. Így

$$\int_\Gamma \frac{1}{z}\,dz = \int_0^{2\pi} \frac{ie^{it}}{e^{it}}\,dt = i\int_0^{2\pi} dt = 2\pi i$$

11.36.

$$\int_\Gamma \frac{1}{z^2}\,dz = \int_0^{2\pi} \frac{ie^{it}}{e^{2it}}\,dt = \int_0^{2\pi} ie^{-it}\,dt = \left[-e^{-it}\right]_0^{2\pi} = -1-(-1) = 0$$

11.37. $\displaystyle\int_\pi^{3\pi/2} \left|e^{-it}\right| (-i)e^{-it}\,dt = i$ **11.38.** $\displaystyle\int_{-1}^{0} |t|\,dt + \int_0^1 |it|\,dt = 0$

11.39. $\displaystyle\int_{(1,1)}^{(3,2)} (x^2-y^2)\,dx - 2xy\,dy = \left[\frac{x^3}{3} - xy^2\right]_{(1,1)}^{(3,2)} = -\frac{7}{3}$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

11.40. $\int\limits_{1+i}^{3+2i} (x^2-y^2)\,dx-2xy\,dy = \operatorname{Re}\int\limits_{1+i}^{3+2i} z^2\,dz = \operatorname{Re}\left(\frac{(3+2i)^3}{3}-\frac{(1+i)^3}{3}\right) = -\frac{7}{3}$

11.41. $\int\limits_{\Gamma} 3z^2\,dz = \left[z^3\right]_1^{1+i} = -3$

11.42. $\int\limits_{1}^{1+i} \frac{1}{z}\,dz = \left[\operatorname{Log} z\right]_1^{1+i} = \frac{1}{2}\ln 2+i\frac{\pi}{4}$

11.43. $\int\limits_{1}^{1+i} e^z\,dz = \left[e^z\right]_1^{1+i}$

11.44. $\int\limits_{1}^{1+i} ze^{z^2}\,dz = \left[\frac{e^{z^2}}{2}\right]_1^{1+i}$

11.65. Alkalmazzuk a reziduumtételt: $\oint\limits_{|z|=4} f(z)\,dz = 2\pi\cdot i\cdot\operatorname{Res}\left(\frac{e^z\cos z}{z-\pi},\pi\right) = 2\pi\cdot i\cdot e^{\pi}\cos\pi.$

11.67. $\int\limits_{\Gamma} z^2\,dz = \left[\frac{z^3}{3}\right]_0^{1+i} = \frac{(1+i)^3}{3}$

11.68. $\int\limits_{0}^{1+i} e^z\,dz = \left[e^z\right]_0^{1+i} = e^{1+i}-1$

11.73. Legyen $g(z)=10-6z$, $f(z)=z^6-6z+10$. Ha z az egységkörvonal tetszőleges pontja, azaz $|z|=1$, akkor

$$|f(z)-g(z)| = \left|z^6\right| = 1, \qquad |g(z)| = |10-6z| \geq 10-6 = 4,$$

teljesülnek a Rouché tétel feltételei. Mivel a $g(z)=10-6z$ függvénynek nincs gyöke az egységkörben, ezért az $f(z)=z^6-6z+10$ függvénynek sincs.

11.75. A keresett $\int\limits_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\left(x^2+1\right)^2}\,dx$ konvergens, ezért

$$\int\limits_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\left(x^2+1\right)^2}\,dx = \lim_{R\to\infty}\int\limits_{-R}^{R} \frac{1}{\left(x^2+1\right)^2}\,dx.$$

Legyen $\Gamma_R = \Phi_R + \Psi_R$ az a zárt görbe, amelyre Φ_R a valós tengely $[-R,R]$ szakasza, Ψ_R pedig az R sugarú, origó középpontú körvonal

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

felső félsíkba eső része. Ha $f(z) = \dfrac{1}{(z^2+1)^2}$, akkor a residuum tétel szerint

$$\oint_{\Gamma_R} f(z)\,dz = \oint_{\Gamma_R} \frac{dz}{(z^2+1)^2} = 2\pi i \operatorname{Res}(f,i) = \oint_{|z-i|=1} \frac{dz}{(z^2+1)^2} =$$

$$= \oint_{|z-i|=1} \frac{1}{(z+i)^2}\cdot\frac{dz}{(z-i)^2} = 2\pi i \cdot g'(i) = -4\pi i \frac{1}{(2i)^3} = \frac{\pi}{2}.$$

Itt a Cauchy integrálformulát használtuk az i-ben reguláris $g(z) = \dfrac{1}{(z+i)^2}$ függvényre. A felső félkörön $|f(z)| < \dfrac{1}{R^2}$, ha R elég nagy, ezért $\lim\limits_{R\to\infty} \int\limits_{\Psi_R} \dfrac{1}{(z^2+1)^2}\,dz = 0$.

$$\frac{\pi}{2} = \lim_{R\to\infty} \int_{\Gamma_R} \frac{dz}{(z^2+1)^2} = \lim_{R\to\infty} \int_{\Phi_R} \frac{dz}{(z^2+1)^2} + \lim_{R\to\infty} \int_{\Psi_R} \frac{dz}{(z^2+1)^2} =$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{(x^2+1)^2}\,dx$$

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán

© Typotex Kiadó

Ajánlott irodalom

Laczkovich Miklós – T. Sós Vera: *Analízis I. és II.*, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2007.

Laczkovich Miklós – T. Sós Vera: *Valós Analízis*, TypoTex Kiadó, 2012–2013.

Urbán János: *Matematikai logika*, Műszaki Kiadó Kft., 2006.

Urbán János: *Határértékszámítás*, Műszaki Kiadó Kft., 2009.

Gyemidovics: *Matematikai analízis*, Tankönyvkiadó Vállalat, 1974. – TypoTex Kiadó (reprint)

Thomas-féle kalkulus I., II., III., TypoTex Kiadó, 2008.

Bárczy Barnabás: *Differenciálszámítás*, Műszaki Kiadó, 2005.

Bárczy Barnabás: *Integrálszámítás*, Műszaki Kiadó, 2003.

www.interkonyv.hu © Gémes Margit, Szentmiklóssy Zoltán